

《医学三基》高频考点

参考答案及解析

 **展鸿医考**
ZHANHONG YIKAO

扫码对答案

2021年湖北基层医疗笔试



扫码回复
“估分”
在线对答案



- 1.有人说：“医务工作枯燥繁琐，不需要有很强的个人特色。”你怎么看？你觉得自己适合吗？
2.患者突然晕倒，你是值班医生，怎么处理？
3.某市食品安全办打算搞一次食品安全的宣传。你作为本次的宣传负责人，你打算做哪些准备工作？
- 1.你认为疾病是什么？
2.你觉得医患矛盾严重，医务人员存在那些因素？
3.你在值班时，手里已经有很多事务，护士长又交给你一件重要的事。你怎么办？
- 1.发热病人处理流程？
2.过敏性休克的抢救措施？
3.输血的目的什么？当患者出现溶血反映，你该怎么处理？

想上岸，疯狂撩：辰风老师 131 9728 3172

分校地址（十堰市茅箭区北京南路全兴广场写字楼20层）



第一篇 医学基本理论

1. 【答案】B。解析：心动周期中，等容舒张期、心室充盈期、房缩期时主动脉瓣处于关闭状态；心室射血期主动脉瓣处于开放，房室瓣处于关闭状态。故本题选 B。

2. 【答案】D。解析：胸骨角为胸骨柄与胸骨体相接处的一向前突出的横行隆起，是计数肋骨的重要标志，两侧平对第二肋，第四胸椎的下缘正对胸骨角的水平。故本题选 D。

3. 【答案】C。解析：顶骨位于颅顶中部，左右各一，外隆内凹，呈四边形。故本题选 C。

4. 【答案】C。解析：这些生理弯曲适合人在直立时重心稳定的需要。而且人在走、跑、跳时产生的震动，能通过它减弱和消失，从而使脑和心、肝、肾等重要内脏得到保护。故本题选 C。

5. 【答案】D。解析：肺动脉是运送血液进行气体交换的功能性血管，其分支在肺门先位于支气管前方，后转向后方，在肺内的分支与支气管的分支伴行，直至分支进入肺泡膈，包绕肺泡壁形成肺泡毛细血管网。故本题选 D。

6. 【答案】A。解析：胸导管是全身最大的淋巴管，是收集淋巴液进入淋巴循环的重要器官。故本题选 A。

7. 【答案】D。解析：腹股沟管深环的体表投影位于腹股沟韧带中点上方 2cm。故本题选 D。

8. 【答案】D。(1)稽留热：指体温在 39~40℃ 左右，达数天或数月，24 小时波动范围不超过 1℃。(2)弛张热：指体温在 39℃ 以上，24 小时波动范围达 1℃ 以上，体温最低时仍高于正常。(3)间歇热：指体温骤升至 39℃ 以上，达数小时或更长，然后下降至正常或正常以下，经过一个周期，又反复发作。(4)不规则热：指发热的体温曲线无规律，且持续时间不定。故本题选 D。

9. 【答案】A。解析：因酶的化学本质是蛋白质，故易被高温、强酸、强碱等破坏，具有不稳定性。故本题选 A。

10. 【答案】C。解析：tRNA 是具有携带并转运氨基酸功能的一类小分子核糖核酸，而蛋白质生物合成的模板是 mRNA。故本题选 C。

11. 【答案】C。解析：树突状细胞(DC)是目前所知的功能最强的抗原提呈细胞，因其成熟时伸出许多树突样或伪足样突起而得名。故本题选 C。

12. 【答案】D。解析：神经垂体激素是由神经垂体分泌的激素，以升压素和催产素为主。故本题选 D。

13. 【答案】A。解析：维生素 E 是一种脂溶性维生素，其水解产物为生育酚，是最主要的抗氧化剂之一。故本题选 A。

14. 【答案】A。解析：肌糖原是肌肉中糖的储存形式，在剧烈运动消耗大量血糖时，肌糖原分解供能。故本题选 A。

15. 【答案】D。解析：细胞膜的结构主要由脂质和蛋白质组成，含有少量糖类。故本题选 D。

16. 【答案】D。解析：基础代谢率的测定需满足的条件包括：清晨、清醒、静卧；未做肌肉活动；前夜睡眠良好；测定时无精神紧张；测定前至少禁食 12 小时；室温保持在 20~25℃。故本题选 D。

17. 【答案】B。解析：体内甘油酯类的生理功能包括：储能和供能；构成生物膜；促进脂溶性维生素的吸收；维持体温和保护器官；参与组织细胞间信息传递等。传递电子的载体本质是酶、辅酶、辅基或辅因子。故本题选 B。

18. 【答案】B。解析：风湿病是一组侵犯关节、骨骼、肌肉、血管及有关软组织或结缔组织为主的

疾病，本病主要侵犯全身结缔组织，常累及心脏和关节，以形成风湿小体为其病理特征。故本题选 B。

19. 【答案】C。解析：当呼吸道黏膜柱状上皮化生为鳞状上皮后，可增强局部的抵抗力，但同时也失去了原有上皮的功能，黏膜自净能力减弱。故本题选 C。

20. 【答案】C。解析：坏死组织经腐败菌作用因产生硫化亚铁致使组织发臭变黑。故本题选 C。

21. 【答案】B。解析：绒毛心以纤维蛋白原渗出为主，由于心脏的不断搏动，心包脏壁两层发生不断的摩擦，使渗出在心外膜上的纤维素在心包上呈绒毛状，属于心包的纤维素性炎。故本题选 B。

22. 【答案】B。解析：肿瘤细胞 MHC I 类分子表达低下，可使肿瘤细胞内抗原无法提呈，从而导致 CD8⁺CTL 无法识别和杀伤肿瘤细胞。故本题选 B。

23. 【答案】E。解析：血栓的结局包括溶解、软化、再通、机化和钙化。故本题选 E。

24. 【答案】B。解析：中央型肺癌首先发生于肺门处，多为鳞癌，可迅速发生转移，导致肺门及纵隔淋巴结肿大。故本题选 B。

25. 【答案】D。解析：乳腺小管癌是一种预后极好、由高分化小管结构所组成的特殊类型的乳腺癌。故本题选 D。

26. 【答案】B。解析：副作用是在正常治疗剂量范围内出现的与用药目的无关的作用，一般停药后可消失。故本题选 B。

27. 【答案】C。解析：拉贝洛尔是一种甲型肾上腺受体阻断剂和乙型肾上腺受体阻滞剂，用于治疗高血压。原理是阻断肾上腺素受体，放缓窦性心律，减少外周血管阻力，兼有 α 受体及 β 受体阻滞剂作用。故本题选 C。

28. 【答案】A。解析： H_1 受体拮抗剂对属于 I 型变态反应的荨麻疹、过敏性鼻炎等皮肤黏膜的超敏反应效果较好，可作为首选药。故本题选 A。

29. 【答案】C。解析：激动药为既有亲和力又有内在活性的药物，它们能与受体结合并激动受体而产生效应。故本题选 C。

30. 【答案】C。解析：药物消除半衰期是指血浆药物浓度下降一半所需要的时间。故本题选 C。

31. 【答案】A。解析：钙通道阻滞剂能松弛血管平滑肌，具有降低食管括约肌压力的作用。故本题选 A。

32. 【答案】D。解析：肿瘤的异型性是判断良、恶性肿瘤的重要组织学依据。故本题选 D。

33. 【答案】D。解析：最能有效地判断椎体新鲜压缩性骨折的是 CT 平扫+三维重建。故本题选 D。

34. 【答案】D。解析：问诊时要避免暗示性语言，如“您上腹痛时向右肩放射吗”，暗示病人腹痛向右肩放射，会诱导病人错误回答，导致病情掩盖。故本题选 D。

35. 【答案】C。解析：幽门梗阻患者清晨空腹时，叩诊上腹鼓音、振水音明显。故本题选 C。

36. 【答案】D。解析：弥漫性肺泡出血可用弥漫性肺泡灌洗术确诊，支气管镜检查对弥漫性肺泡出血诊断意义不大。故本题选 D。

37. 【答案】A。解析：空气中粉尘的化学成分和浓度是直接决定其对人体危害性质和严重程度的重要因素。故本题选 A。

38. 【答案】C。解析：统计学常用的基本概念包括：总体、样本、同质、变异、参数、统计量、误差、概率和变量及变量值。故本题选 C。

39. 【答案】D。解析：婚前医学检查服务的内容是对严重遗传疾病、指定传染病和有关精神病的检查。故本题选 D。

40. 【答案】A。解析：白化病属于家庭遗传性疾病，为常染色体隐性遗传。题干中夫妇表型正常，但是生育有一白化病患儿，故可设父亲的遗传基因为 Aa，母亲的遗传基因为 Bb，A、B 为显性基因，A、a、B、b 交叉配对，一共有四种可能结果，分别为 AB、Ab、Ba、ab，其二胎发生白化病的概率是 1/4。故本题选 A。

41. 【答案】A。解析：人体内缺乏维生素 A 可引起眼睛干燥不适、暗适应能力下降，可通过食动物肝脏、鱼肝油、全奶等补充维生素 A。故本题选 A。

42. 【答案】C。解析：麻醉药品和精神药品处方至少保存 3 年。故本题选 C。

43. 【答案】A。解析：副溶血弧菌是一种嗜盐性的革兰氏阴性菌，在无盐培养基上不能生长。故本题选 A。

44. 【答案】C。解析：低热能饮食指的是一日三餐的普通饮食中减少糖类和脂肪的含量，又要保证蛋白质和维生素的需要量。故本题选 C。

45. 【答案】C。解析：结核分枝杆菌致病主要与细菌在组织内大量繁殖引起炎症反应、菌体化学成分和代谢产物的毒性作用以及机体产生的超敏反应有关。故本题选 C。

46. 【答案】B。解析：医务人员特别是护理人员经常被临床上应用的针、刀等利器刺伤、划伤，是最常见的安全事件。故本题选 B。

47. 【答案】E。解析：患者已经对自己的病人角色产生认识并且进入到病人角色中，这个过程成为角色行为适应。故本题选 E。

48. 【答案】B。解析：医学伦理学中尊重原则所涵盖的权力包括患者生命和生命价值、人格隐私权、选择权、知情同意权等。不包括社会免责权。故本题选 B。

49. 【答案】D。解析：医学心理学对于健康和疾病的基本观点包括：心身统一的观点、社会影响的观点、认知评价的观点、主动适应和调节的观点、情绪作用的观点、个性特征的观点。故本题选 D。

50. 【答案】B。解析：效果指数是对照组的发病率/接种组的发病率，一般大于 1，是鉴定疫苗保护作用的一个指标，可评价其流行病学预防效果。故本题选 B。

第二篇 医学基础知识

1. 【答案】B。解析：呼吸困难、心绞痛、晕厥是主动脉瓣狭窄的临床“三联征”。故本题选 B。

2. 【答案】B。解析：房颤时心房丧失收缩功能，血液容易在心房内淤滞而形成血栓，血栓脱落后可随着血液至全身各处，导致脑栓塞、肢体动脉栓塞等。故本题选 B。

3. 【答案】C。解析：急性心肌梗死的定位主要依据是病理性 Q 波出现的导联。前间壁心肌梗死：V1、V2、(V3) 导联；前壁心肌梗死：V3、V4、(V5) 导联；广泛前壁：V1~V6 导联；前侧壁：V5、V6、(I、aVL) 导联；高侧壁：I、aVL、(V5、V6) 导联；下壁：II、III、aVF 导联；后壁：V7~V9 导联；右室：V3R~V5R 导联。故本题选 C。

4. 【答案】D。解析：贫血是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限的一种常见的临床症状。由于红细胞容量测定较复杂，临床上常以血红蛋白 (Hb) 浓度来代替。故本题选 D。

5. 【答案】A。解析：甲型 H1N1 传染病属于呼吸道传染病，传播的途径是通过空气和飞沫传播。故本题选 A。

6. 【答案】C。解析：有机磷农药中毒呼吸为大蒜味；酮症酸中毒呼吸为烂苹果味；尿毒症呼吸为尿味；肺癌晚期呼吸为腥臭味。故本题选 C。

7. 【答案】D。解析：M 样症状（毒蕈碱样症状）：交感神经兴奋引起平滑肌痉挛、外分泌腺分泌增强，重者发生肺水肿或呼吸衰竭死亡。N 样症状（烟碱样症状）：横纹肌-肌内接头处乙酰胆碱蓄积，横纹肌纤维束颤动（面、眼、舌、四肢、全身）；肌力降低和瘫痪，呼吸肌麻痹致呼吸衰竭。故本题选 D。

8. 【答案】B。解析：左心衰竭表现主要是由于肺淤血及肺水肿导致，所以会出现呼吸困难，咳痰带血等症状。故本题选 B。

9. 【答案】C。解析：慢性肝炎患者可根据具体情况采用综合性治疗方案，包括合理的休息和营养、心理平衡、改善和恢复肝功能、调节机体免疫、抗病毒、抗纤维化等治疗。可适当进食高蛋白、高热量、高维生素等易消化食物，有利于肝脏修复，避免过分强调高营养，以防发生脂肪肝，避免饮酒。故本题选 C。

10. 【答案】B。解析：变异型心绞痛主要是由于冠状动脉痉挛所致，因钙通道阻滞剂能阻断血管平滑肌细胞钙离子内流，扩张冠状动脉，解除冠状动脉痉挛，故临床上将其作为变异型心绞痛患者的首选药物。故本题选 B。

11. 【答案】C。解析：（1）嗜睡：意识障碍的早期表现，患者经常入睡，能被唤醒，醒来后意识基本正常，停止刺激后继续入睡。（2）意识模糊：患者的时间、空间及人物定向明显障碍，思维不连贯，常答非所问，错觉可为突出表现，幻觉少见，情感淡漠。（3）昏睡：患者处于较深睡眠，一般外界刺激不能被唤醒，不能对答，较强烈刺激可有短暂意识清醒，醒后可简短回答提问，当刺激减弱后很快进入睡眠状态。（4）昏迷：意识活动完全丧失，对外界各种刺激或自身内部的需要不能感知。可有无意识的活动，任何刺激均不能被唤醒。可分为浅昏迷、中昏迷和深昏迷。（5）谵妄：对客观环境的认识能力及反应能力均有所下降，注意力涣散，定向障碍，言语增多，思维不连贯，多伴有觉醒——睡眠周期紊乱。故本题选 C。

12. 【答案】D。解析：溃疡性结肠炎常伴有阵发性结肠痉挛性疼痛，并有里急后重感，排便后可缓解。故本题选 D。

13. 【答案】E。解析：系统性红斑狼疮的发病与遗传因素、环境因素、雌激素、感染和免疫异常等因素有关。故本题选 E。

14. 【答案】B。解析：构成传染病流行过程的必备因素是传染源、传播途径、易感人群。故本题选 B。

15. 【答案】B。解析：嵌顿性疝：当腹内压突然增高，疝内容物被强行挤过狭小的疝环而被卡住从而不能还纳腹腔。绞窄性疝：指嵌顿性疝伴发血液循环障碍者。故本题选 B。

16. 【答案】D。解析：肠管损伤中以小肠损伤多见，并且往往发生在空肠上段或回肠下端，因系膜短而固定，移动性小，故易受损伤。故本题选 D。

17. 【答案】B。解析：鼻咽癌是指起源于鼻咽粘膜上皮和腺体的恶性肿瘤，常发生于鼻咽顶后壁的顶部，其次为侧壁，发生于前壁及底壁者极为少见，发病年龄大多为中年人，亦有青少年患病者。鼻咽癌的发生与高发区居民的生活环境有关，与衣、食、住、行中接触的一些致癌物质有关，也与 EB 病毒

有密切关系。早期临床症状不典型易被误诊。故本题选 B。

18. 【答案】A。解析：中性粒细胞增多见于急性和化脓性感染（疖痈、脓肿、肺炎、阑尾炎、丹毒、败血症、内脏穿孔、猩红热等），各种中毒（酸中毒、尿毒症、铅中毒、汞中毒等），组织损伤、恶性肿瘤、急性大出血、急性溶血等。故本题选 A。

19. 【答案】C。解析：脑复苏脱水以渗透性利尿为主，快速利尿药（如速尿）为辅，20%甘露醇最常选用，0.5~1.0g/kg 静滴，每天 4~6 次，必要时加用速尿 20~40mg。脱水治疗应持续 5~7 日。故本题选 C。

20. 【答案】C。解析：若持续听诊 3~5 分钟未听到肠鸣音，此时应重点听诊右下腹，并可用手指轻叩或搔弹腹部，若仍无肠鸣音，称为肠鸣音消失，见于急性腹膜炎或麻痹性肠梗阻。故本题选 C。

21. 【答案】C。解析：第 3、4 腰椎棘突间隙较宽，是脊髓马尾部位，便于穿刺成功，也不会伤及脊髓。故本题选 C。

22. 【答案】A。解析：胸膜摩擦音最常听到的部位是腋中线下侧胸壁，可随体位的变动而消失或复现。当胸腔积液较多时，因两层胸膜被分开，摩擦音可消失；在积液吸收过程中当两层胸膜又接触时，摩擦音可再出现。故本题选 A。

23. 【答案】A。解析：头痛、偏瘫或昏迷病人，若腰椎穿刺获得均匀血色脑脊液，提示为出血性脑病（脑出血或蛛网膜下腔出血），若脑脊液为无色透明提示为缺血性脑病。故本题选 A。

24. 【答案】B。解析：一般认为，择期手术患者，无论选择何种麻醉方法，术前都应禁食易消化固体食物或非人类乳至少 6h；而禁食油炸食物、富含脂肪或肉类食物至少 8h；如果对以上食物摄入量过多，胃排空时间可延长，应适当延长禁食时间。故本题选 B。

25. 【答案】A。解析：等渗性缺水患者表现为不口渴、有尿少、厌食、恶心、乏力、舌干、眼球下陷、皮肤干燥、松弛等表现。故本题选 A。

26. 【答案】B。解析：宫颈癌早期表现多为接触性出血，中晚期为不规则阴道流血。故本题选 B。

27. 【答案】B。解析：上尿路结石大而活动度小的肾结石可无痛，小而活动度大的结石疼痛较重，甚至出现肾绞痛。故本题选 B。

28. 【答案】B。解析：嵌顿性肩先露时，宫缩继续加强，子宫上段越来越厚，子宫下段被动扩张越来越薄，子宫上下段肌壁厚薄悬殊，形成环状凹陷，此环状凹陷随宫缩逐渐升高，可高达脐上，形成病理缩复环，是子宫破裂的先兆，若不及时处理，将发生子宫破裂。故本题选 B。

29. 【答案】C。解析：硫酸镁中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失，随着血镁浓度的不断增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制，严重者会出现心脏骤停。故本题选 C。

30. 【答案】D。解析：卵巢是女性生殖系统的主要性器官，产生卵细胞和分泌雌性激素。故本题选 D。

31. 【答案】D。解析：羊水栓塞多发生于分娩过程中，破膜后会出现呛咳、烦躁不安，继而出现呼吸困难、抽搐、心率加快、脉搏细数、血压下降等呼吸、循环功能障碍。度过呼吸衰竭和休克后进入凝血功能障碍阶段，表现为难以控制的出血，后期存活的患者可出现急性肾衰竭的表现。故本题选 D。

32. 【答案】D。解析：阴道内正常存在的乳酸杆菌对维持阴道正常菌群起着关键的作用，可使阴道局部形成弱酸性环境，抑制其他寄生菌的过度生长。故本题选 D。

33. 【答案】E。解析：排卵后次日，因卵巢形成黄体，分泌孕激素会使体温上升 0.6 摄氏度左右，

而使体温呈现高低两相变化。故本题选 E。

34. 【答案】C。解析：输卵管壶腹部是异位妊娠最常见的发生部位，其次为峡部，伞部和间质部最少见。故本题选 C。

35. 【答案】A。解析：孕妇首次检查一般在妊娠 6~8 周，妊娠 20~36 周每 4 周检查 1 次，妊娠 37 周以后每周检查 1 次，共行产前检查 9~11 次。高危孕妇应酌情增加检查次数。故本题选 A。

36. 【答案】A。解析：体格生长是小儿生长发育的一个重要方面，常用的形态指标有体重、身高（长）、头围、胸围等。故本题选 A。

37. 【答案】B。解析：小儿各年龄阶段需接种的疫苗：

出生：卡介苗、乙肝疫苗；2 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、乙肝疫苗；3 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、白百破混合制剂；4 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、白百破混合制剂；5 个月：百白破混合制剂；6 个月：乙肝疫苗；8 个月：麻疹活疫苗；1 岁半至 2 岁：白百破混合制剂；4 岁：脊髓灰质炎三价混合疫苗；7 岁：卡介苗、麻疹活疫苗、吸附精制白喉、破伤风二联类毒素；12 岁：卡介苗。故本题选 B。

38. 【答案】D。解析：小儿生理性腹泻镜检大便无或偶见少量白细胞。故本题选 D。

39. 【答案】A。解析：新生儿复苏方案：A：尽量吸尽呼吸道粘液，保持呼吸道通畅；B：建立呼吸，增加通气；C：维持正常循环，保证足够心搏出量；D：药物治疗；E：评价。故本题选 A。

40. 【答案】A。解析：正常足月新生儿，生后具有觅食反射、吸吮反射、握持反射、拥抱反射等原始反射，腹壁反射偶可出现。故本题选 A。

41. 【答案】B。解析：胎龄在 12 周左右时，孕妇用药能干扰胚胎和胎儿组织细胞的正常分化，导致先天畸形或遗传性疾病。故本题选 B。

42. 【答案】B。解析：先天性肥厚型幽门狭窄是由于幽门肌肥厚和水肿引起的输出道梗阻。本病多见于婴儿出生后 6 个月内，主要表现为胃蠕动波、扪及幽门肿块和喷射性呕吐。故本题选 B。

43. 【答案】E。解析：肢体震颤多见于帕金森综合征、小脑疾病、酒精戒断等，不出现在小儿缺铁性贫血中。故本题选 E。

44. 【答案】E。解析：川崎病临床表现发热为稽留热或弛张热并伴以下 5 条中的 4 条，即可确诊。（1）双侧眼结膜充血，无渗出物。（2）口腔及咽部黏膜有充血，口唇干燥皲裂，杨梅舌。（3）急性期手足红肿，亚急性期甲周脱皮。（4）出疹主要在躯干部，为斑丘疹、多形红斑样或猩红样。（5）颈部淋巴结肿大，直径超过 1.5cm。故本题选 E。

45. 【答案】B。解析：患者表现为轻微刺激即表现出强烈反应，属于感觉过敏。故本题选 B。

46. 【答案】E。解析：遗忘综合征的三大特征是近记忆障碍、虚构、定向障碍。故本题选 E。

47. 【答案】A。解析：胆汁质的气质特征是外向性、行动性和直觉性。具有强烈的兴奋过程和比较弱的抑郁过程，情绪易激动，反应迅速，行动敏捷，暴躁而有力；在语言上、表情上、姿态上都有一种强烈而迅速的情感表现。不足是缺乏自制性、粗暴和急躁、易生气、易激动，因此在耐心、沉着和自制力等方面的心理修养不够。故本题选 A。

48. 【答案】E。解析：青少年在情绪和情感上呈现成熟前动荡不定的状态，表现为情绪敏感、情绪反应强烈、情绪心境化、情感丰富等，情绪稳定不属于青少年的情绪特点。故本题选 E。

49. 【答案】C。解析：小儿初次感染结核杆菌结核菌素，实验为阳性反应的时间是 4-8 周。故本题选 C。

50. 【答案】E。解析：足月新生儿病理性黄疸的特点有：（1）黄疸出现过早，常在 24 小时内出现；（2）黄疸程度过重，血清胆红素 $>205-257\mu\text{mol/L}$ ；（3）黄疸进展过快，血清胆红素每日上升 $>85\mu\text{mol/L}$ ；（4）黄疸持续较久，足月儿 >2 周，早产儿 >4 周；（5）黄疸退而复现，或再度进行性加重；（6）血清结合胆红素 $>26\mu\text{mol/L}$ 。故本题选 E。

第三篇 医学基本技能

1. 【答案】A。解析：中心静脉压(CVP)测定对了解有效循环血容量和右心功能有重要意义。正常值为 $0.49-1.18\text{Kpa}$ ($5-12\text{cmH}_2\text{O}$)。此患者 $\text{CVP}<0.49\text{Kpa}$ ，说明有效循环血容量不足，心率快是心脏代偿性表现，应迅速补充液体。故本题选 A。

2. 【答案】B。解析：胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于抽液过多、过快，胸内压突然下降引起。故本题选 B。

3. 【答案】D。解析：骨髓穿刺禁忌严重出血的血友病病人，有出血倾向或凝血时间明显延长者不宜做骨刺；晚期妊娠的妇女慎做骨穿；小儿及不合作者不宜做胸骨穿刺。故本题选 D。

4. 【答案】D。解析：清创术操作步骤：（1）伤口周围油污应用松节油擦去，伤口周围皮肤用碘汀、乙醇消毒；（2）取出明显可见异物、血块及脱落的组织碎片，用 0.9%氯化钠注射液反复冲洗伤口；（3）常规消毒铺巾；（4）沿原伤口切除创缘皮肤 $1\sim 2\text{mm}$ ，必要时可扩大伤口；（5）切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织；（6）彻底止血；（7）再用 0.9%氯化钠注射液反复冲洗伤口，污染严重者可用 3%过氧化氢溶液冲洗伤口再以 0.9%氯化钠注射液冲洗；（8）彻底清创后，可予缝合伤口。故本题选 D。

5. 【答案】B。解析：证实胃管在胃内的方法：（1）连接注射器于胃管末端进行抽吸，抽出胃液；（2）置听诊器于病人胃区，快速经胃管向胃内注入 10ml 空气，听到气过水声；（3）将胃管末端置于盛水的治疗碗内，无气泡逸出。故本题选 B。

6. 【答案】D。解析：胃插管术禁忌鼻咽部有癌肿或急性炎症的患者；食管静脉曲张、上消化道出血、心力衰竭和重度高血压患者；吞食腐蚀性药物的患者。故本题选 D。

7. 【答案】C。解析：胸腔穿刺一定要在肋骨上缘进针，在肋骨下缘进针，会误伤沿肋骨下缘走向的血管、神经。故本题选 C。

8. 【答案】D。解析：口对口人口呼吸采用仰头举颌法是为了解除舌后坠造成的咽阻塞，打通气道，使气道通畅。故本题选 D。

9. 【答案】A。解析：胸外心脏按压法，按压部位在胸骨中下 $1/3$ 交界处及胸骨下段剑突上 $2.5\sim 5\text{cm}$ 处，按压频率至少为 100 次/分，成人按压深度至少 5cm ，不能应用冲击式猛压，下压时间与放松时间比为 $1:1$ ，放松时手掌根不能离开胸骨。故本题选 A。

10. 【答案】D。解析：开胸心脏按压术，切口取左胸乳头下一个肋间，从胸骨左缘至腋中线，用推压法或按压法按压心脏；按压频率一般为 $60\sim 70$ 次/分；可配合按压，向左心室注入肾上腺素开胸心脏。按压后心脏恢复，血压逐渐稳定后，胸壁和心包切口开始出血，应仔细结扎出血，并冲洗心包腔和胸腔，在膈神经后侧作心包引流切口，缝合心包。故本题选 D。

11. 【答案】C。解析：气管切开术的适应症有：（1）喉阻塞；（2）下呼吸道分泌物潴留；（3）预防性气管切开；（4）取气管异物；（5）颈部外伤伴有咽喉或气管、颈段食管损伤者。各种原因引起的Ⅰ度和Ⅱ度呼吸困难可行氧疗改善呼吸困难，无需气管切开。故本题选C。

12. 【答案】E。解析：由各种原因引起的下呼吸道分泌物潴留阻塞，为了吸痰，保持气道通畅，可考虑气管切开。故本题选E。

13. 【答案】C。解析：在中心静脉压测定中，医用塑料导管或硅胶管从静脉切口插至上腔静脉或下腔静脉处，一般插入深度为35~45cm。故本题选C。

14. 【答案】A。解析：术后无菌的伤口应3~5天换药一次；感染伤口分泌物较多，应每天换药一次；新鲜肉芽创面，应隔1~2天换药一次；严重感染或留置引流的伤口及粪痿，应根据引流量的多少，决定换药次数。故本题选A。

15. 【答案】E。解析：搬动脊椎骨折患者时，采取一人抬头、一人抬脚或用搂抱的搬运方法会增加脊柱的弯曲，可将碎骨片向后挤入椎管内，加重脊髓的损伤。应采用三人搬运法，担架放在伤员一侧，三人同时用手平抬伤员头颈、躯干及下肢，使伤员成一体平直托至担架上。故本题选E。

16. 【答案】A。解析：气胸作胸腔闭式引流放置引流管的部位是锁骨中线第2肋间。故本题选A。

17. 【答案】B。解析：气管切开后出现广泛皮下气肿，大量气体压迫心、肺及胸腔大血管时，可引起心、肺衰竭导致死亡，应及时予以手术减压、拆除切口缝线。故本题选B。

18. 【答案】D。解析：手术区皮肤消毒范围要包括手术切口周围15cm的区域。故本题选D。

19. 【答案】B。解析：水溶性差，相对较稳定的药物不宜用于雾化吸入疗法。故本题选B。

20. 【答案】D。解析：对病危患者应当根据患者的病情变化随时书写病程记录，每天至少1次，记录时间应当具体到分钟；对病重患者，至少2天记录一次病程记录；对病情稳定的患者，至少3天记录一次病程记录。故本题选D。

21. 【答案】E。解析：手术记录是指手术者书写的反映手术一般情况、手术经过、术中发现及处理等情况的特殊记录，应当在术后24小时内完成。特殊情况下可由第一助手书写，但应有手术者签名。故本题选E。

22. 【答案】D。解析：问诊时忌用暗示或诱导，以免查询所得资料与实际不符，如：“你心前区痛放射到左肩吗？”暗示患者心前区痛放射到左肩，易诱导患者作出错误回答。故本题选D。

23. 【答案】D。解析：中心性发绀表现为全身性，除四肢及颜面外，也累及躯干和黏膜的皮肤，常见于发绀型先天性心脏病。常出现在肢体末梢、伴有皮肤温度降低、见于右心衰和严重休克为周围性发绀的特点。故本题选D。

24. 【答案】B。解析：大叶性肺炎表现为胸部语颤增强。故本题选B。

25. 【答案】B。解析：肋下扣及肝脏有时不是由于肝大，而是由于肝位置下移，可见于经产妇女腹壁松弛者、歌唱或演奏者横膈运动过分发达、肺气肿、右胸腔大量积液、膈下脓肿者。故本题选B。

26. 【答案】C。解析：荨麻疹呈鲜红色或苍白色、皮肤色，突出于皮肤表面，常先有皮肤瘙痒，随即出现风团。故本题选C。

27. 【答案】C。解析：无菌技术操作前，个人准备时首先衣帽整齐，不得佩戴首饰，并修剪指甲、洗手，必要时穿好无菌衣，戴好无菌手套。故本题选C。

28. 【答案】E。解析：（1）无菌操作前半小时，须停止清扫地面等工作，避免不必要的人群流动，减少人员走动，以降低室内空气中的尘埃；（2）无菌包潮湿应重新进行灭菌处理；（3）无菌物品一经使用后，必须再经无菌处理后方可使用，从无菌容器中取出的物品，虽未使用，也不可放回无菌容器内；（4）治疗室每日用紫外线照射消毒一次，时间 20~30 分钟；（5）操作时手臂保持在腰部水平以上。故本题选 E。

29. 【答案】A。解析：清创时间越早越好，伤后 6~8 小时内清创一般都可达到一期愈合。故本题选 A。

30. 【答案】D。解析：张力性气胸是指较大的肺气泡破裂或较大较深的肺裂伤或支气管破裂，裂口与胸膜腔相通，且形成单向活瓣。吸气时空气从裂口进入胸膜腔内，而呼气时活瓣关闭，腔内空气不能排出，致胸膜腔内压力不断升高，压迫肺使之逐渐萎陷，并将纵隔推向健侧，挤压健侧肺，产生呼吸和循环功能的严重障碍。张力性气胸的急救治疗原则为立即排气，降低胸膜腔内压力。在紧急状况下，可用粗针头在伤侧第 2 肋间锁骨中线处刺入胸膜腔，有喷射状气体排出，即能收到排气减压效果。故本题选 D。

31. 【答案】A。解析：新生儿胸外按压应用双拇指或示中指按压胸骨体下 1/3 处，频率为 100~120 次/分（每按压 3 次，正压通气 1 次），按压深度为胸廓前后径的 1/3。故本题选 A。

32. 【答案】E。解析：输血的适应症有：（1）大量失血；（2）贫血或者低蛋白血症；（3）重症感染；（4）凝血异常。烧伤分为休克期、感染期和恢复期，在烧伤的发展过程中常有贫血、血容量不足、凝血功能异常等症状，故需要输血。B、C 都会导致失血，D 会导致贫血，故需要输血。故本题选 E。

33. 【答案】B。解析：胸内心脏挤压的适应症是：（1）胸外心脏按压无效。（2）引起心脏骤停的疾病本身需要手术，如心包填塞，心脏外伤心房粘液瘤导致心内梗阻、心室动脉瘤、大块肺动脉栓塞，以及需要迅速心脏复温（如冻伤）等。（3）胸廓畸形，如严重脊柱弯曲、鸡胸、一侧全肺切除术后的心脏移位等，不能行胸外心脏按压。（4）肥胖体质，胸外除颤无效。故本题选 B。

34. 【答案】B。解析：行上消化道内镜检查时，嘱患者取左侧卧位，颈部松弛，头垫一枕，松开领口及腰带。此种体位在进行插管时，通过贲门和幽门较方便。故本题选 B。

35. 【答案】A。解析：大叶性肺炎肺部体征呈现局部呼吸活动减弱，语音共振、语颤增强，叩诊浊音，听诊病理性支气管呼吸音。故本题选 A。

36. 【答案】C。解析：上消化道出血确诊要行急诊胃镜检查，一般应在大出血后 24-48 小时内进行，可见以多发性糜烂、出血灶和黏膜水肿为特征的急性胃黏膜损害。故本题选 C。

37. 【答案】D。解析：一般在服毒后 4~6 小时内洗胃最有效，但如果超过 6 小时，仍可考虑洗胃。故本题选 D。

38. 【答案】B。解析：肥皂水内含有氨，给肝性脑病患者灌肠或者导泻可加重肝性脑病。故本题选 B。

39. 【答案】C。解析：心室颤动时双相波电除颤能量应选择 150~200J，单相波电除颤能量应选择 360J。故本题选 C。

40. 【答案】A。解析：头痛、偏瘫或昏迷病人，若腰椎穿刺获得均匀血色脑脊液，提示为出血性脑病（脑出血或蛛网膜下腔出血），若脑脊液为无色透明提示为缺血性脑病。故本题选 A。

41. 【答案】E。解析：上臂中下 1/3 部扎止血带容易损伤桡神经，应视为禁区。故本题选 E。

42. 【答案】D。解析：开放性气胸急救原则：（1）变开放性气胸为闭合性气胸，尽快用无菌敷料严密封闭伤口，并包扎固定；（2）胸膜腔抽气减压：先穿刺抽气，清创缝合伤口后行闭式胸膜腔引流；（3）抗休克治疗：给氧、输血、补液等；（4）手术：及早清创，缝闭伤口，如疑有胸膜腔内脏器损伤或活动性出血，则需剖胸探查；（5）应用抗生素预防感染。故本题选 D。

43. 【答案】A。解析：消毒法，是指利用物理因素杀灭或消除病原微生物及其他有害微生物的方法。主要包括自然净化、机械除菌、热力消毒灭菌、电离辐射消毒、微波消毒、超声波消毒、等离子体灭菌、过滤除菌等。故本题选 A。

展鸿2021年基层医疗 面试辅导课程

研新求变 | 1:1等额招生保护 | 赠送住宿 | 协议过关再付费

课程	班次	课程特色	授课时长	课程费用及优惠
私教定制 (全程4人)	协议班 (状元或笔试分差1分内)	针对考生实际情况设计答题 极致小班，高分突破 1个老师对4名学生 从理论导实战全程1VS1指导 全程高强度军事化授课 形象 思路 答题话术 私人定制	6天5晚 (包吃住)	笔试状元优惠2000元 团报优惠1000元 可叠加
	特训班			团报及老学员 优惠1000元
名师班 (全程8-10人)	状元协议班	无面的基础学员首选 8-10人全程小班 8年以上教龄名师1VS1指导 基础理论 专项练习 套题模拟 实战演练 非套路化答题全新培训模式 确保充足模拟机会	6天5晚 (送住宿)	笔试状元优惠1000元 限时优惠1000元 可叠加
	协议B班 (笔试非状元)			
	特训班			团报及老学员 优惠800元

课程特色一

一线多年教龄资深讲师
授课：把“好老师”付诸在实际行动上，因为专注，所以更专业。

课程特色二

精致化小班教学：保障
面试实战模拟次数，1
对1过关点评，实现系
统且有效提分。

课程特色三

理论巩固+实战训练：
面试理论方法通关，新
思路+挖亮点，专项过
关+实战模拟。

课程特色四

过关再付费：无第三方
助学贷款，协议班次面
试通过后再补交尾款。

招生专线 131 9728 3172 公司地址：茅箭区北京南路
16号全兴广场写字楼20层

