

展鸿《护理学》模拟卷（一）

答题须知

1. 本试卷满分 100 分，考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前，请考生用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在试卷和专用答题卡的相应位置填写本人姓名、准考证号和科目代码，并用 2B 铅笔在专用答题卡上准确填涂准考证号码和科目代码。
3. 作答时请用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在专用答题卡指定区域作答，在草稿纸上或专用答题卡的非指定区域作答一律无效。
4. 考试结束后，请将试卷和专用答题卡一并交监考老师，严禁携带试卷和专用答题卡出考场。

一、判断题（下列各题中，正确的打“√”，错误的打“×”。本题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。）

1. 24 小时尿量少于 100ml 者为少尿。 ()
2. 上消化道出血表现为柏油样便，胆道梗阻表现为白陶土色便。 ()
3. 颅脑手术后，颅脑只能卧于健侧或平卧。 ()
4. 在进行无菌操作时，必须带无菌手套，手套外面为有菌，内侧为无菌。 ()
5. 对水肿和肥胖病人预防压疮的发生，可于易受压处垫橡胶气圈。 ()
6. 病区护理管理的核心是病人的康复。 ()
7. 前置胎盘的典型症状是无痛性阴道出血。 ()
8. 急性肾炎急性期应给予低盐（每日 3g 以下）饮食。 ()
9. 麻疹患儿高热降温禁用冷敷及乙醇擦浴。 ()
10. 新生儿具有免疫力是指胎儿期通过胎盘从母体获得免疫球蛋白 IgG。 ()
11. 严重高血糖时出现的“三多一少”症状是多饮、多食、多尿和消瘦。 ()
12. 卵巢肿瘤常见的并发症有扭转、破裂、感染和恶变。 ()
13. 医学伦理的尊重原则不包括尊重患者的一切主观意愿。 ()
14. 消化性溃疡最常见的并发症是溃疡穿孔。 ()
15. 大量快速输血每输血 50 毫升则静脉注射钙剂 1 克，目的在于预防枸橼酸毒性反应。 ()
16. 高热病人超过 38.5℃时，每 4h 测量体温一次，待体温恢复正常 3 天后可减至每日 1 次。 ()
17. 压力是生物调整自己去适应环境的能力。 ()
18. 十二指肠球部溃疡的疼痛规律为进食—疼痛—缓解。 ()
19. 高压蒸汽灭菌的纱布敷料、棉球打开未用完，最长保存期为 24 小时。 ()
20. 心功能 III 级的病人体力活动明显受限，休息时无症状，轻微的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状。 ()

二、单项选择题（下列各题中，只有一个符合题意的正确选项，请选出。本题型共 40 个小题，每小题 1.5 分，共 60 分。）

21. 护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是（ ）。

- A. 健康教育
B. 卫生指导
C. 预检分诊
D. 查阅病例

22. 护士在急诊科工作 13 年，由于工作长期处于紧张状态，在患者行动不便时还要协助搬运患者，劳动强度较大，经常感到身心疲惫。近期腰部不适加重，检查为腰椎间盘突出。导致其损伤的职业因素属于（ ）。

- A. 化学性因素
B. 生物性因素
C. 放射性因素
D. 机械性因素
E. 心理因素

23. 病室湿度过高，病人不适的表现是（ ）。

- A. 口舌干燥
B. 气闷
C. 咽痛
D. 肌肉紧张

24. 在医院的环境分类中，普通手术室、产房属于（ ）环境。

- A. I 类
B. II 类
C. III 类
D. IV 类

25. 一级护理适用于（ ）。

- A. 休克
B. 重症肺结核
C. 年老体弱
D. 发热
E. 脏器移植术后

26. 关于急诊患者的入院护理，下列说法错误的是（ ）。

- A. 接到住院处电话通知，护理人员应立即通知有关医生做抢救准备
B. 准备急救器材及药品，如急救车、氧气、吸引器、输液器具等
C. 密切观察患者病情变化，积极配合医生进行抢救，做好护理记录

D. 对于不能正常叙述病情和需求的患者，需暂留陪送人员，以便询问患者病史，意识不清和婴幼儿患者除外

27. 中凹卧位的要求是（ ）。

- A. 头胸部抬高 $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ，下肢抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
B. 头胸部抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
C. 头胸部抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，下肢抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
D. 头胸部抬高 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，下肢抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
E. 头胸部抬高 $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ ，下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

28. 浸泡法是将待消毒的物体浸泡于合适的溶液中达到消毒灭菌的方法。下列溶液中，适用于内镜消毒的是（ ）。

- A. 0.2%的戊二醛
B. 2%的戊二醛
C. 3%的过氧化氢
D. 0.3%的过氧化氢

29. 患者，女性，55 岁，因脑出血后长期卧床，护士为其翻身时发现骶尾部皮肤红肿，发热，但皮

肤表面无破损。属于压疮（ ）。

- A. 炎性浸润期 B. 淤血红润期 C. 浅度溃疡期 D. 深度溃疡期
E. 局部皮肤感染

30. 患者，女性，50岁，输液1000ml，滴速为50滴/分，计划从上午9时30分开始，估计（ ）输完。

- A. 上午11时10分 B. 上午12时30分
C. 下午1时30分 D. 下午2时10分
E. 下午2时30分

31. 尿常规标本应留取的尿量为（ ）。

- A. 30ml B. 50ml C. 60ml D. 80ml
E. 100ml

32. 在护理记录中，病人的健康问题的英文简称为（ ）。

- A. P B. I C. O D. E
E. S

33. 下列不属于试验饮食的是（ ）。

- A. 尿浓缩功能试验饮食 B. 胆囊造影饮食
C. 肌酐试验饮食 D. 低胆固醇饮食
E. 忌碘饮食

34. 患者，男性，52岁，幼时曾患百日咳，近3个月来出现咳嗽、咳痰，近2天咳大量脓痰，今晨出现咯血，最有可能的诊断是（ ）。

- A. 肺炎 B. 急性支气管炎
C. 肺结核 D. 支气管扩张
E. 肺癌

35. 周围血管征多见于（ ）。

- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全
C. 主动脉狭窄 D. 主动脉瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全

36. 某患者因消化性溃疡多年入院，今突然呕血约700ml，医嘱：全血200ml。输血过程中护士注意到其眼睑、口唇出现水肿，患者自述面部皮肤瘙痒，该患者最可能发生了（ ）。

- A. 过敏反应 B. 空气栓塞 C. 血管内溶血 D. 血管外溶血
E. 枸橼酸钠中毒

37. 下列哪种类型的水钠代谢紊乱，脑症状最早且突出（ ）。

- A. 等渗性脱水 B. 高渗性脱水
C. 急性水中毒 D. 低渗性脱水
E. 水肿

38. 患者，男性，70岁，心肺复苏过程中，医嘱给予肾上腺素静脉注射，其目的是（ ）。

- A. 增加冠状动脉血流量
- B. 纠正心律失常
- C. 降低应激反应
- D. 改善通气量
- E. 纠正酸碱失衡

39. 患者，女性，37岁，足底刺伤8天，患者自行包扎处理，未求医，1天前患者出现头痛、烦躁、张口困难、颈项强直，诊断为破伤风。护士向患者解释足底刺伤后的正确处理方法是（ ）。

- A. 清洗伤口，注射抗生素
- B. 彻底清创后注射 TAT
- C. 清除坏死组织及异物
- D. 高锰酸钾消毒包扎伤口
- E. 清创后用清洁敷料包扎伤口

40. 患者，女，6岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿、大水疱，未受伤范围包括头、面部、颈部，以及前胸、腹部约8个手掌大的皮肤，估计其烧伤面积为（ ）。

- A. 63%
- B. 67%
- C. 73%
- D. 77%
- E. 83%

41. 乳腺癌是女性发病率最高的恶性肿瘤之一，提倡早发现、早诊断、早治疗。下列不是乳房肿块的早期表现的是（ ）。

- A. 肿块在乳房内不易被推动
- B. 肿块多位于乳房外上象限
- C. 患侧乳房出现卫星结节
- D. 肿块与周围组织分解不清

42. 患者，男，65岁。发现右腹股沟内侧包块3年余。3天前腹股沟包块突然增大，变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛。8小时前疼痛有所缓解，但出现发热。患者最有可能出现了（ ）。

- A. 易复性疝
- B. 难复性疝
- C. 嵌顿性疝
- D. 绞窄性疝
- E. 急性阑尾炎

43. 腹膜炎最主要的体征是（ ）。

- A. 腹式呼吸减弱
- B. 腹膜刺激征
- C. 移动性浊音阳性
- D. 肠鸣音消失
- E. 腹部可见肠型

44. 女性生殖系统包括内、外生殖器及相关组织，下列不属于女性内生殖器的是（ ）。

- A. 阴道
- B. 前庭球
- C. 子宫
- D. 子宫附件

45. 某孕妇，G2P6。妊娠30周，规律下腹疼痛伴阴道血性分泌物6小时。查体：胎位LOA，胎心率146次/分，宫缩20秒/7~8分钟，宫缩力弱，肛查胎先露S-3，宫颈管缩短，宫口可容一指尖。目前最恰当的处理措施是（ ）。

- A. 严密观察等待自然分娩
- B. 滴注缩宫素加强宫缩
- C. 抑制宫缩保胎治疗
- D. 立即行剖宫产终止妊娠
- E. 阴道检查后确定分娩方式

46. 确诊葡萄胎最重要的辅助检查是（ ）。

- A. 血/尿 HCG 测定
- B. B 超检查
- C. 多普勒胎心听诊检查
- D. 腹部 CT 检查
- E. 腹部 X 线检查

47. 患者，女，32岁。痛经2年，呈进行性加重。子宫后倾固定，子宫后壁触及3个痛性结节，给予达那唑治疗。目前最重要的护理措施是（ ）。

- A. 保持心情愉快 B. 避免剧烈运动 C. 湿热敷下腹部 D. 指导规范用药
E. 给予清淡饮食

48. 某4个月患儿，人工喂养。近日反复出现发作性吸气困难，伴有吸气时喉鸣音，急诊入院。查血钙 1.7mmol/L ，其余正常。首先考虑该患儿出现了（ ）。

- A. 中毒性肺炎 B. 喉痉挛 C. 气管异物 D. 惊厥
E. 支气管哮喘

49. 小儿乳牙出齐的时间是（ ）。

- A. 1岁~1岁半 B. 1岁半~2岁 C. 2岁~2岁半 D. 2岁半~3岁
E. 3岁~3岁半

50. 多数化脓性细菌均可引起脑膜炎，但致病菌类型与患儿年龄有密切关系。其中，3个月至3岁患儿多由（ ）感染为主。

- A. 大肠埃希菌 B. 金黄色葡萄球菌
C. 流感嗜血杆菌 D. 脑膜炎双球菌

51. 5-羟色胺再摄取抑制剂治疗抑郁症时，起效时间是开始服药后（ ）。

- A. 1周 B. 2周 C. 3周 D. 4周
E. 5周

52. 急诊物品要做到“五定”是指（ ）。

- A. 定时更换数量和品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查
B. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查维修
C. 定数量品种、定人保管、定期消毒灭菌、定期维修、定期检查
D. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查
E. 定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期维修

53. 下列不符合肾病综合征的诊断标准是（ ）。

- A. 大量蛋白尿 ($>3.5\text{g/d}$) B. 高血压
C. 高脂血症 D. 水肿
E. 低蛋白血症

54. 系统性红斑狼疮病人应用糖皮质激素时，错误的是（ ）。

- A. 急重症狼疮患者，选用甲泼尼龙大剂量冲击，病情缓解后逐渐减量
B. 对于急性发作的患者，可选用大剂量短程服用泼尼松，后逐渐减量
C. 对于急性发作的患者，可以以小剂量长期服用（每日或隔日顿服，连续8周）
D. 一般型和维持期的患者宜于大剂量泼尼松长期服用

55. 患者，女，30岁。下肢急性蜂窝织炎伴全身感染症状，需采血做抗生素敏感试验。最佳的采血时间应是在患者（ ）。

- A. 寒战时 B. 高热时 C. 发热间歇期 D. 静脉滴注抗生素时

E. 抗生素使用后

56. 患者，男，28岁。突发胸痛2小时，以自发性气胸诊断入院。查体：T 36.8℃，P 90次/分，呼吸22次/分；右侧胸部肋间隙增宽，语颤消失，叩诊鼓音。其肝浊音界的改变是（ ）。

- A. 下移 B. 上移 C. 左移 D. 右移
E. 不变

57. 最可能发生纵膈扑动的是（ ）。

- A. 开放性气胸 B. 闭合性气胸
C. 张力性气胸 D. 损伤性气胸
E. 机化性气胸

58. 胎动减少是指胎动12小时少于（ ）。

- A. 5次 B. 10次 C. 15次 D. 20次
E. 25次

59. 患者，女性，35岁，因不洁性交后出现白带增多及外阴瘙痒。入院后诊断为滴虫性阴道炎。该疾病白带的典型特点是（ ）。

- A. 稀薄泡沫状 B. 干酪样白带
C. 豆腐渣白带 D. 稀薄，呈淡黄色
E. 白带呈脓状，有臭味

60. 新生儿娩出后1分钟内，Apgar评分为3分，该患儿为（ ）。

- A. 正常新生儿 B. 轻度窒息 C. 青紫窒息 D. 重度窒息
E. 急性窒息

三、多项选择题（下列各题中，每题均有两个或两个以上的选项符合题意，请选出，多选或少选均不得分。本题共10个小题，每小题2分，共20分。）

61. 下列属于长期医嘱的是（ ）。

- A. 安定 5mg po qn B. 青霉素 800kU im bid
C. 青霉素皮试 st D. 哌替啶 50mg im q6h prn
E. 哌替啶 50mg im sos

62. 下列抗结核药物中长期应用对肝有损害的是（ ）。

- A. 异烟肼 B. 利福平
C. 链霉素 D. 吡嗪酰胺
E. 对氨基水杨酸

63. 四人搬运适用于（ ）。

- A. 病情危重者 B. 身体胖重者
C. 体质衰弱者 D. 颈、腰椎骨折者
E. 不能自行活动者

64. 新生儿出生 24 小时内需完成的免疫接种为 ()。
- A. 乙肝疫苗
B. 百白破混合制剂
C. 卡介苗
D. 脊灰疫苗
E. 麻疹疫苗
65. 肝外胆管结石患者可表现出典型的 Charcot 三联征, 包括 ()。
- A. 腹痛
B. 寒战及高热
C. 陶土样粪便
D. 黄疸
E. 血红蛋白尿
66. 人工流产手术后宣教内容, 正确的是 ()。
- A. 术后休息两周
B. 术后仍有轻微腹痛及少量阴道流血
C. 保持外阴清洁
D. 1 个月内禁止盆浴及性生活
E. 一律半年后来医院复查
67. 颅前窝骨折可出现下列哪些表现 ()。
- A. 鼻漏
B. 耳漏
C. “熊猫眼”征
D. 耳后、乳突部淤血斑
E. 听神经损伤
68. 高血压病人做到下列几条措施可以减少并发症, 提高生命质量 ()。
- A. 限制钠摄入
B. 减轻体重
C. 运动
D. 坚持合理服药
E. 病人定时自测
69. 消化性溃疡常见的并发症有 ()。
- A. 出血
B. 急性穿孔
C. 幽门梗阻
D. 癌变
E. 感染
70. 下列哪些情况可能发生急性乳腺炎 ()。
- A. 哺乳次数过多
B. 乳头发育不良
C. 乳管不通畅
D. 乳汁分泌障碍
E. 婴儿口含乳头睡眠

展鸿《护理学》模拟卷（一）

参考答案及解析

一、判断题

1. 【答案】×。解析：24 小时尿量少于 100ml 者为无尿，24 小时尿量少于 400ml 者为少尿。故本题说法错误。
2. 【答案】√。解析：上消化道出血表现为柏油样便，胆道梗阻表现为白陶土色便。故本题说法正确。
3. 【答案】√。解析：颅脑手术后，颅脑只能卧于健侧或平卧，以防头部翻转过剧，引起脑疝。故本题说法正确。
4. 【答案】×。解析：无菌手套外面为无菌，内侧为有菌。故本题说法错误。
5. 【答案】×。解析：对水肿和肥胖病人预防压疮的发生，不可于易受压处垫橡胶气圈。过度消瘦、过度肥胖、水肿、动脉硬化均易促使褥疮形成。治疗尽可能早期开始，原则是立即使患处不再受压，促进局部血液循环，加强创面处理。故本题说法错误。
6. 【答案】×。解析：病区护理管理以病人为中心，以护理质量为核心。故本题说法错误。
7. 【答案】√。解析：无痛性阴道出血是前置胎盘的典型症状。故本题说法正确。
8. 【答案】√。解析：急性肾炎急性期应给予低盐（每日 3g 以下）饮食。故本题说法正确。
9. 【答案】√。解析：处理麻疹高热时，不宜用药物及物理方法强行降温，尤其禁用冷敷及酒精擦浴，因体温骤降可引起末梢循环障碍而使皮疹突然隐退。体温 $<39^{\circ}\text{C}$ 用湿毛巾敷于前额，温水擦浴，忌用酒精擦浴，冷敷，以免影响透疹。若体温 $>40^{\circ}\text{C}$ ，可用小剂量退热剂或温水擦浴，使体温稍降，以免引起惊厥。故本题说法正确。
10. 【答案】√。解析：新生儿具有免疫力是指胎儿期通过胎盘从母体获得免疫球蛋白 IgG。故本题说法正确。
11. 【答案】√。解析：“三多一少”是糖尿病最常见的临床表现，即多饮、多食、多尿和体重减轻。故本题说法正确。
12. 【答案】√。解析：卵巢肿瘤的常见并发症有扭转、破裂、感染和恶变。故本题说法正确。
13. 【答案】√。解析：医学伦理的尊重原则包括尊重患者及其家属的自主权或决定，治疗要获得患者的知情同意，保守患者秘密，保守患者的隐私。不包括尊重患者的一切主观意愿。故本题说法正确。
14. 【答案】×。解析：消化性溃疡最常见的并发症是上消化道出血。故本题说法错误。
15. 【答案】×。解析：常规每输库存血 1000ml，静脉注射 10%葡萄糖酸钙 10ml，即钙剂 1g，预防发生低血钙，目的在于预防枸橼酸毒性反应。故本题说法错误。
16. 【答案】×。解析：高热病人应每 4 小时测量体温一次，待体温恢复正常 3 天后，可减为每日两次，同时密切观察病人的面色、脉搏、呼吸、血压，如有异常应及时就医。故本题说法错误。

17. 【答案】×。解析：压力在生理学上是指人体对任何加诸于他的需求所作的非特异性反应。适应是生物体调整自己以适应环境的能力。故本题说法错误。

18. 【答案】×。解析：十二指肠溃疡的疼痛规律为疼痛—进食—缓解，胃溃疡的疼痛规律为进食—疼痛—缓解。故本题说法错误。

19. 【答案】√。解析：高压蒸汽灭菌的纱布敷料、棉球打开未用完，最长保存期为24小时。故本题说法正确。

20. 【答案】√。解析：心功能Ⅲ级的病人体力活动明显受限，休息时无症状，轻微的活动即可引起乏力、心悸、呼吸困难或心绞痛等症状。故本题说法正确。

二、单项选择题

21. 【答案】C。解析：护士对门诊病人预检分诊，可保证病人有序就诊，同时能节省医生诊断时间。故本题选C。

22. 【答案】D。解析：护士职业损伤的因素及其特点：(1) 生物性因素：护士工作的环境处于人类共同的自然环境、社会环境之中，又具有医务场所的特殊性，大量存在病毒、细菌。护理工作中可能通过呼吸道、血液、皮肤等途径感染护士。(2) 化学性因素：护士在日常工作中，可以通过各种途径接触到各种化学消毒剂而使自身受到不同程度的污染，长期受到低剂量药物影响，可诱发基因变性，使染色体畸变，具有致癌致畸及脏器损害等潜在危险。(3) 物理性因素：医护人员常由于负重引起脊柱损伤，腰骶部疼痛。临床护士在工作中，体力劳动多，强度大，特别是骨科、急诊科、创伤科等需要搬运患者，容易扭伤腰背，造成自身损害。(4) 心理社会因素：在工作领域中存在着很多负性因素，会直接影响到护士的心理和工作行为，严重时会导致职业倦怠。故本题选D。

23. 【答案】B。解析：病室适宜的病室湿度为50%~60%。湿度过高，空气潮湿，细菌易于繁殖，同时蒸发作用减弱，可抑制出汗，病人感到气闷不适，尿液排出量增加，加重肾脏负担，对患有心脏病、肾疾病的病人尤为不利。湿度过低，室内空气干燥，人体水分蒸发增加，可引起口渴、咽痛、鼻衄等，对呼吸道疾患或气管切开的患者尤为不利。故本题选B。

24. 【答案】B。解析：医院环境共分为四类：Ⅰ类环境：层流洁净手术室、层流洁净病房。Ⅱ类环境：普通手术室、供应室无菌区、产房、婴儿室、早产儿室、保护性隔离病室、烧伤病室、ICU室等。Ⅲ类环境：儿科病房、妇产科检查室、注射室、换药室、治疗室、供应室清洁区、急诊室、化验室、各类普通病房和房间。Ⅳ类环境：感染性疾病科。故本题选B。

25. 【答案】A。解析：一级护理适用于病情较重或较大手术后病情不稳定的患者，生活完全不能自理，护理比较繁琐，如各种大手术后、休克、昏迷、瘫痪、早产儿等患者。故本题选A。

26. 【答案】D。解析：对于不能正确叙述病情和要求的病人、意识不清病人或婴幼儿等，需暂留陪送人员，以便询问病史。故本题选D。

27. 【答案】B。解析：中凹位是指头胸抬高 $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ，以增大肺活量，改善缺氧症状；下肢抬高 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，以促进静脉血液回流，增加心排血量。故本题选B。

28. 【答案】B。解析：《内镜清洗消毒技术操作规范（2004年版）》规定内镜消毒需采用2%的戊二醛。故本题选B。

29. 【答案】B。解析：压疮分期及临床表现：(1) 淤血红润期：为压疮初期，受压的局部皮肤出现红、肿、热、麻木或触痛，但皮肤表面无破损。(2) 炎性浸润期：红肿部位继续受压，血液循环仍旧得不到改善，静脉回流受阻，受压皮肤表面颜色转为紫红，皮下产生硬结，表皮出现水疱。水疱极易破溃，显露出潮湿红润的创面，病人感觉疼痛。(3) 浅度溃疡期：表皮水疱破溃，可显露出潮湿红润的创面，有黄色渗出液，感染后表面有脓液覆盖，致使浅层组织坏死，形成溃疡，病人感觉疼痛加重。(4) 坏死溃疡期：感染向周边及深部扩展，侵入真皮下层和肌层，可达骨面。脓性分泌物增多，坏死组织发黑，有臭味，严重者细菌入血易引起败血症。故本题选 B。

30. 【答案】E。解析：根据输液时间 (h) = [液体的总量 (ml) × 点滴系数 (滴/ml)] / [每分钟滴数 (滴/分) × 60 (min)]，点滴系数为 15 滴/ml，可得出输液时间 (h) = 1000 (ml) × 15 (滴/ml) / 50 (滴/分) × 60 (min) = 5h。故本题选 E。

31. 【答案】E。解析：常规尿标本：嘱病人将晨起第一次尿液留于标本容器内，量为 100ml。故本题选 E。

32. 【答案】A。解析：护理记录单用 PIO 形式记录，P 是指病人的健康问题；I 是指针对健康问题采取的护理措施；O 代表的是护理效果。故本题选 A。

33. 【答案】D。解析：试验饮食是通过对受试者的饮食进行特定的调整，从而协助疾病的诊断和提高检验结果的正确性。包括胆囊造影饮食、潜血试验饮食、忌碘饮食（吸碘试验）、尿浓缩功能试验饮食、肌酐试验饮食等。故本题选 D。

34. 【答案】D。解析：肺结核、百日咳、腺病毒肺炎可继发支气管扩张，支气管扩张典型的症状是慢性咳嗽、咳大量脓痰和反复咯血。患者出现咳嗽，咳痰，近 2 天咳大量脓痰，今晨出现咯血，可诊断为支气管扩张。故本题选 D。

35. 【答案】D。解析：周围血管征指的是在某些疾病条件下检查周围血管时所发现的血管搏动或波形的改变，主要见于主动脉瓣关闭不全、甲亢、严重贫血等脉压增大的疾病。故本题选 D。

36. 【答案】A。解析：输血反应主要包括：(1) 溶血反应：它是输血中最严重的一种反应。通常输入 10~15ml 血后即可出现反应，表现为四肢麻木、头痛、胸闷、黄疸和血红蛋白尿（酱油色）。同时伴有寒战、发热、呼吸困难、血压下降。(2) 发热反应：多发生在输血后 1~2 小时内，患者有发冷或寒战，继而发热，体温可达 39~40℃ 以上，伴有头痛、恶心、呕吐等。(3) 过敏反应：其表现轻重不一，轻者为皮肤瘙痒，局部或全身出现荨麻疹。重者可出现血管神经性水肿（多见于颜面，如眼睑、口唇高度水肿），喉头水肿，支气管痉挛，严重者可发生过敏性休克。(4) 大量快速输血可能引起的并发症：心脏负荷过重、出血倾向、枸橼酸中毒、低血钙、高血钾、体温过低等。该患者输血后出现眼睑、口唇出现水肿，面部皮肤瘙痒，属于轻度过敏症状。故本题选 A。

37. 【答案】C。解析：急性水中毒由于发病急，细胞内外液量增多，颅腔和椎管无弹性，脑细胞水肿造成颅内压增高症状，脑症状最早且突出。故本题选 C。

38. 【答案】A。解析：肾上腺素可直接作用于冠状血管引起血管扩张，改善心脏供血。利用其兴奋心脏收缩血管及松弛支气管平滑肌等作用，可以缓解心跳微弱、血压下降、呼吸困难等症状。故本题选 A。

39. 【答案】B。解析：足底刺伤后的正确处理方法是彻底清创后注射 TAT，防止患发破伤风。故本

题选 B。

40. 【答案】D。解析：该患儿未受伤范围头、面、颈部面积为 $9 + (12 - 6) = 15\%$ ，总未烧伤面积为 $15\% + 8\% = 23\%$ ，因此烧伤面积为 $100\% - 23\% = 77\%$ 。故本题选 D。

41. 【答案】C。解析：乳房早期的临床表现是肿块多位于乳房外上象限，其次为内上象限、上方及中央区；肿块与周围组织分解不清，一般为不规则形，在乳房内不易被推动。患侧乳房出现卫星结节是乳房肿块中晚期的表现。故本题选 C。

42. 【答案】D。解析：易复性疝：指疝内容物很容易回纳入腹腔；难复性疝：指疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内；嵌顿性疝：疝环较小而腹内压突然增高时，疝内容物可强行扩张疝囊颈而进入疝囊，随后因疝囊颈的弹性收缩，将内容物卡住，使其不能回纳；绞窄性疝：嵌顿若未能及时解除，肠管及其系膜受压程度不断加重，可使动脉血流减少，最后导致全阻断。由于会发生腹膜炎，所以是缩窄性的。故本题选 D。

43. 【答案】B。解析：腹膜炎最主要的体征是腹膜刺激征，包括腹痛、腹肌紧张和反跳痛。故本题选 B。

44. 【答案】B。解析：女性外生殖器指生殖器官的外露部分，又称外阴。包括阴阜、大阴唇、小阴唇、阴蒂、前庭、前庭大腺、前庭球、尿道口，阴道口和处女膜。女性内生殖器包括卵巢、输卵管、子宫和阴道。故本题选 B。

45. 【答案】E。解析：该孕妇出现规律下腹痛伴阴道血性分泌物，胎位、心率（胎位 LOA，胎心率 146 次/分）、宫缩均正常（宫缩 20 秒/7~8 分钟），建议阴道检查后确定分娩方式。未检查时，禁止使用缩宫素等药物进行治疗或者终止妊娠等操作。由于患者宫缩力弱，因此不宜等待观察，以免发生危急情况。故本题选 E。

46. 【答案】B。解析：B 超检查是确诊葡萄胎最重要的辅助检查。故本题选 B。

47. 【答案】D。解析：根据患者痛经，进行性加重，妇科检查子宫后倾固定，子宫峡部后壁可触及多个小结节，触痛明显诊断首先考虑子宫内膜异位症。达那唑，该药副作用大，对肝肾有一定损害，长期使用会引起骨质疏松。需要指导患者规范用药。故本题选 D。

48. 【答案】B。解析：喉痉挛轻者可表现为轻微吸气性喘鸣，重者可出现完全性上呼吸道梗阻。血清离子钙降低是引起惊厥、喉痉挛、手足抽搐的直接原因。正常值为 $2.25 \sim 2.75 \text{mmol/L}$ 。故本题选 B。

49. 【答案】C。解析：小儿乳牙共 20 个，大约从 6 个月起开始萌出，2~2.5 岁出齐。故本题选 C。

50. 【答案】C。解析：流感嗜血杆菌是一种没有运动力的革兰氏阴性杆菌，大多为 3 个月至 3 岁患儿所感染。故本题选 C。

51. 【答案】B。解析：5-羟色胺再摄取抑制剂一般在服用 2 周后达到血药起效浓度。故本题选 B。

52. 【答案】B。解析：急诊物品要做到“五定”，是指定数量品种、定点安置、定人保管、定期消毒灭菌、定期检查维修。故本题选 B。

53. 【答案】B。解析：肾病综合征是一组以大量蛋白尿 ($>3.5\text{g/d}$)、低蛋白血症 ($<30\text{g/L}$)、水肿和高脂血症为表现的临床症候群。故本题选 B。

54. 【答案】D。解析：系统性红斑狼疮的激素治疗为：(1) 急重症狼疮患者，选用甲泼尼龙大剂量冲击，病情缓解后逐渐减量；(2) 对于急性发作的患者，可选用大剂量短程服用泼尼松，后逐渐减量，

或者以小剂量长期服用（每日或隔日顿服，连续8周）；（3）一般型和维持期的患者宜于小剂量泼尼松长期服用。激素的使用均应逐渐减量，而不应该加量。故本题选D。

55. 【答案】A。解析：血培养一般选择病人寒战时采血，这样可以避免应用抗生素以后出现的假阴性结果，较易发现致病菌。故本题选A。

56. 【答案】A。解析：气胸早期即可出现胸闷、胸痛、呼吸困难、心慌、大汗、脸色苍白、烦躁不安。少量气胸时体征不明显；肺压缩30%以上时，气管向健侧移位，患侧胸廓膨隆、呼吸运动减弱、叩诊呈鼓音、心浊音界消失或肝浊音界下移、呼吸音和语颤减弱或消失。故本题选A。

57. 【答案】A。解析：开放性气胸胸膜腔与外界大气直接相通，空气可随呼吸自由进出胸膜腔，因伤侧胸腔压力等于大气压，肺受压萎陷，健侧胸膜腔仍为负压，低于伤侧，使纵隔向健侧移位，发生纵膈扑动。故本题选A。

58. 【答案】D。解析：正常胎动十二小时大约超过三十次。如果十二小时小于二十次的话属于胎动减少。故本题选D。

59. 【答案】A。解析：滴虫性阴道炎白带呈稀薄泡沫状，为乳白色或黄白色，有时为黄绿色脓性泡沫白带，量多，并有臭味。故本题选A。

60. 【答案】D。解析：Apgar评分的项目包括皮肤颜色、心率、呼吸、肌张力和反射。满10分者为正常新生儿，评分7分以下的新生儿考虑患有轻度窒息，评分在4分以下考虑患有重度窒息。故本题选D。

三、多项选择题

61. 【答案】AB。解析：qn为每晚一次，bid为每天2次，st为立即执行，prn为长期备用医嘱，sos为临时备用。故本题选AB。

62. 【答案】ABD。解析：链霉素对肝脏无损害作用。对氨基水杨酸的不良反应主要是关节酸痛，皮肤瘙痒，发热和极度疲乏等症状。故本题选ABD。

63. 【答案】AD。解析：四人搬运法适用于病情危重或颈、腰椎骨折的病人。故本题选AD。

64. 【答案】AC。解析：新生儿出生时需要接种乙肝疫苗和卡介苗。故本题选AC。

65. 【答案】ABD。解析：肝外胆管结石会出现典型的夏科三联征，即腹痛、寒战及高热、黄疸；如合并发生神经精神症状和休克症状，即出现雷诺五联症。故本题选ABD。

66. 【答案】ABCD。解析：人工流产后应该休息两周，切不可过早的从事体力劳动或体育锻炼，防止劳累过度，以避免发生子宫脱垂；注意保持外阴部清洁卫生，每天用温开水清洗1-2次；1个月内禁止坐浴及性生活，避免感染；术后1-2周回医院复诊；人流后的一周左右，阴道内会有红色或淡红色分泌物，其量由多到少，无明显气味，如果出血时间超过15天，出血量大过月经量，特别是分泌物有臭味，并伴有发烧、腹痛等症状，则应及时去医院检查和治疗。故本题选ABCD。

67. 【答案】AC。解析：颅前窝骨折：鼻漏，嗅、视神经损伤，眶周皮下及球结膜下淤血斑，“熊猫眼”征、“兔眼”征；颅中窝骨折：耳、鼻、咽部漏，面、听神经损伤，耳后、乳突部淤血斑。故本题选AC。

68. 【答案】ABCDE。解析：高血压患者应保持良好的心理状态，消除紧张和压抑的心理；适当休息，

保证睡眠，安排合适的运动；对易激动的患者，做好家属工作，减少不良刺激，保证患者有安静舒适的环境；外出活动和检查时应有人陪同以防晕倒受伤；正确饮食，限制钠的摄入，可减轻心脏负荷，防止水、钠潴留，减少外周血管阻力；应遵医嘱坚持合理服药，学会自我观察及护理，出现不适症状立即就诊。故本题选 ABCDE。

69. 【答案】ABCD。解析：消化性溃疡并发症有出血(黑便、呕血、周围循环衰竭、休克)、穿孔、幽门梗阻、癌变。故本题选 ABCD。

70. 【答案】BCE。解析：急性乳腺炎病因有：(1)乳汁淤积：乳头发育不良、乳汁过多或婴儿吸入过少不能完全排空、乳管不通影响排乳。(2)细菌入侵：婴儿口含乳头睡眠易造成乳头破损或皲裂，使婴儿口腔细菌沿淋巴管入侵造成乳腺感染。故本题选 BCE。