

十堰医疗卫生系统招聘《护理学》专项训练

一、判断题（本大题共 20 个小题，每小题 1 分，共 20 分。在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

1. 肾脏疾病病人需严格控制蛋白质的摄入。（ ）
A. 正确 B. 错误
2. 断肢（指）后，应现场清洗离体断肢（指）。（ ）
A. 正确 B. 错误
3. 滴虫阴道炎治愈标准为连续 3 次月经干净后复查阴道分泌物中滴虫均为阴性。（ ）
A. 正确 B. 错误
4. 对心力衰竭病人输液，应严格限制滴速在 10~19 滴/分。（ ）
A. 正确 B. 错误
5. 子宫颈炎患者会出现腰骶部酸痛及下腹部坠胀感。（ ）
A. 正确 B. 错误
6. 内服药在瓶子上应贴的颜色标签是蓝色。（ ）
A. 正确 B. 错误
7. 子宫内膜异位症的典型表现是不孕。（ ）
A. 正确 B. 错误
8. 二甲双胍是 I 型糖尿病的首选用药，既可降低空腹血糖，又能改善人体对胰岛素的敏感性，减轻患者体重。（ ）
A. 正确 B. 错误
9. 应用多巴胺静脉滴注治疗心力衰竭，如剂量太大，有可能出现室性早搏。（ ）
A. 正确 B. 错误
10. 甲状腺次全切除术并发甲状腺危象常发生于术后 4 小时。（ ）
A. 正确 B. 错误
11. 护士在采集标本前应认真核对医师填写的检验申请单，凡有疑问，可拒不执行。（ ）
A. 正确 B. 错误
12. 吞食强酸和强碱等腐蚀性毒物应立即洗胃。（ ）
A. 正确 B. 错误
13. 尿道损伤患者，术后常规留置导尿管，移除导尿管后，应定期做尿道扩张术。（ ）
A. 正确 B. 错误
14. 男，22 岁。开水烫伤双足，局部肿胀明显，有大小不等水泡，创面红润，潮湿，诉创面剧痛，诊断为开水烫伤 7%。（ ）
15. 胸部疾病可引起放射性腹痛，如不典型心绞痛、急性心肌梗死、急性心包炎、主动脉夹层、胸

膜炎和气胸等。（ ）

- A. 正确 B. 错误

16. 羊水栓塞是指产妇在分娩过程中羊水突然进入母体血液循环引起的急性肺栓塞。（ ）

- A. 正确 B. 错误

17. 肝癌病人最常见和最主要的症状是低热。（ ）

- A. 正确 B. 错误

18. 运动障碍指运动系统的任何部位受损所致的骨骼肌活动异常，可分为瘫痪、不随意运动及共济失调等。（ ）

- A. 正确 B. 错误

19. 突然发作的吸气性呼吸困难，临床上最常见于阻塞性肺气肿。（ ）

- A. 正确 B. 错误

20. 腰椎间盘突出好发于腰 3～腰 5 及腰 5～骶 1，是因为该部位肌肉松弛。（ ）

- A. 正确 B. 错误

二、单选题（本大题共 50 小题，每小题 1 分，共 50 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

21. 用平车运送输液患者最重要的是（ ）。

- A. 上坡头在前 B. 下坡头在后
C. 做好穿刺处的固定，防针头脱出 D. 使患者躺卧在平车中间
E. 不可用车撞门

22. 戴帽子、口罩时不正确的做法是（ ）。

- A. 帽子应遮住全部头发 B. 口罩应罩住口鼻部
C. 不可用污染的手触摸口罩 D. 一次性口罩不潮湿不用更换
E. 纱布口罩使用 2～4 小时应更换

23. 患儿，男，8 月龄，因发热、呕吐、腹泻，大便为蛋花样水样便，诊断为病毒性肠炎。护士指导患儿家长暂时不能进食的食物是（ ）。

- A. 面汤 B. 米汤 C. 纯牛乳 D. 去乳糖配方乳
E. 豆制代乳品

24. 造成医院感染暴发的途径不包括（ ）。

- A. 医疗器械消毒灭菌不合格 B. 使用激素
C. 使用不合格的一次性无菌用品 D. 医务人员携带特殊耐药菌
E. 食物污染

25. 下列几种注射给药的方式吸收速率排序合理的是（ ）。

- A. 静脉注射＞腹腔注射＞肌肉注射＞皮下注射＞口服＞涂皮
B. 腹腔注射＞皮下注射＞静脉注射＞口服＞涂皮＞肌肉注射
C. 肌肉注射＞皮下注射＞静脉注射＞口服＞涂皮＞腹腔注射

D. 皮下注射>腹腔注射>肌肉注射>静脉注射>口服>涂皮

E. 静脉注射>肌内注射>腹腔注射>皮下注射>口服>涂皮

26. 患儿，女，34周，生后4小时出现呼吸困难、呻吟。查体：双肺呼吸音低，未闻及干湿啰音，胸片示双肺野可见均匀小颗粒及网状阴影。最可能的诊断是（ ）。

A. 感染性肺炎 B. 胎粪吸入综合征 C. 新生儿肺透明膜病 D. 湿肺

E. 早产儿呼吸功能衰竭

27. 护士给婴儿盆浴为防水进入耳朵的方法是（ ）。

A. 水温维持在20~25℃

B. 洗澡前用棉球塞耳孔

C. 洗澡时戴防水耳塞

D. 用左手拇指及中指将双耳廓压住耳孔

E. 左手托住小儿头颈部

28. 结核性脑膜炎的典型临床表现分为（ ）。

A. 前驱期、昏迷期及早期

B. 前驱期、脑膜刺激期、昏迷期

C. 早期、前驱期、脑膜刺激期

D. 早期、晚期、极期

E. 潜伏期、极期、晚期

29. 患者，女，28岁。孕32周，妊娠糖尿病，胰岛素治疗中，在清晨5时惊醒，心慌、出汗。此时应立即（ ）。

A. 测体温

B. 测血糖

C. 查尿糖及酮体

D. 进食

E. 开放静脉

30. 患者，女性，58岁。有慢性肝炎病史15年，患肝硬化7年，曾多次住院。此次因为出现腹水和黄疸再次入院，查体：T 36.4℃，脉搏88次/min，呼吸22次/min，血压130/80mmHg。目前该患者最主要的护理问题是（ ）。

A. 焦虑

B. 恐惧

C. 知识缺乏

D. 活动无耐力

E. 体液过多

31. 护士王某在为病人输液时，不慎将碘酊洒在工作服上，应选用何种溶液除去碘渍？（ ）

A. 过氧乙酸

B. 过氧化氢

C. 氨水

D. 碱水

E. 乙醇

32. 再生障碍性贫血治疗应选用（ ）。

A. 铁剂

B. 叶酸

C. 丙酸睾酮

D. 硫酸亚铁

E. 维生素B₆

33. 患者，男性，24岁，诊断为大叶性肺炎入院。目前病室的湿度为30%，这种环境可能使患者出现（ ）。

A. 寒冷不适

B. 闷热难受，肾脏负担加重

C. 疲惫、焦躁、头痛、耳鸣

D. 失眠、血压升高

E. 口干舌燥、咽痛、烦渴

34. 患者，男，64岁。外伤性肠穿孔修补术后2天，肛门未排气，腹胀明显，最重要的处理措施应是（ ）。

- A. 胃肠减压 B. 半卧位 C. 禁食 D. 针刺穴位
E. 肛管排气

35. 患者，女，28岁。停经40天后，腹痛伴阴道出血10天，量少。今起腹痛加重而就诊，尿妊娠试验(+)。妇检：宫颈举痛(+)，少量出血，子宫正常大小，附件区触及边界不清之肿物，压痛(+)。考虑可能的疾病是()。

- A. 难免流产 B. 附件炎 C. 流产继发感染 D. 异位妊娠
E. 卵巢囊肿继发感染

36. 昏迷病人从急诊室被送入病室后值班护士首先应()。

- A. 填写各种卡片 B. 通知医生，配合抢救，测量生命体征
C. 询问病史，评估发病过程 D. 通知营养室，准备膳食
E. 介绍医院环境

37. 目前还未发现艾滋病可以通过下列哪种方式传播?()

- A. 共用针头和注射器 B. 医务人员被含血针头刺伤
C. 应用病毒携带者的器官移植 D. 人工授精
E. 吸血昆虫

38. 急性左心衰竭患者进行乙醇湿化给氧的目的是()。

- A. 稀释痰液 B. 松弛支气管平滑肌
C. 使肺泡内泡沫破裂而改善通气 D. 加强心肌收缩力
E. 消毒氧气湿化瓶

39. 对慢性肾炎患者的饮食指导，错误的是()。

- A. 蛋白质摄入量每日每千克体重0.6~0.8g，其中60%以上为高生物效价蛋白质
B. 保证每日充足热量摄入
C. 不必限制水的摄入
D. 补充多种维生素
E. 盐的摄入量为每日1~3g

40. 青霉素引起血清病反应的临床表现是()。

- A. 胸闷、气促、发绀 B. 血压下降、四肢凉
C. 头晕眼花、四肢麻木 D. 发热、关节肿痛、淋巴肿大
E. 呕吐、便血

41. 输入低分子右旋糖酐的目的是()。

- A. 扩充血容量 B. 改善微循环 C. 增加营养 D. 增加胶体渗透压
E. 维持酸碱平衡

42. 患儿，女，14岁。1小时前误食毒蘑菇，现恶心、呕吐、神经紧张，意识清楚，立即为其洗胃，最佳方法是()。

- A. 注洗器洗胃 B. 漏斗胃管洗胃 C. 口服催吐洗胃 D. 电动吸引器洗胃
E. 自动洗胃机洗胃

43. 患者，女性，56岁。既往有糖尿病病史10余年，突发糖尿病酮症酸中毒。此时患者的呼吸气味是（ ）。

- A. 芳香味 B. 肝腥味 C. 大蒜味 D. 烂苹果味
E. 氨臭味

44. 患者，男，58岁。原有高血压、糖尿病、高血脂。近日出现右侧肢体麻木及活动无力。昨夜睡眠好，但今晨起床时突然跌倒，家人扶起后发现其口眼歪斜，右侧上、下肢瘫痪，但神志清醒。应考虑是（ ）。

- A. 脑血栓形成 B. 脑出血 C. 脑梗死 D. 蛛网膜下腔出血
E. 短暂脑缺血

45. 患者，男性，56岁，胃癌术后化疗，静脉输液过程中出现液体不滴，且穿刺部位出现疼痛感，此时应立即采取的措施是（ ）。

- A. 局部冷敷 B. 硫酸镁湿敷
C. 用注射器将肝素盐水冲入针头 D. 停止给药，用注射器回抽
E. 抽出输液管回血后继续输注

46. 大咯血病人有窒息先兆，应立即采取的抢救措施是（ ）。

- A. 做气管插管 B. 用导管吸出血块 C. 进行气管切开 D. 加压吸氧
E. 应用呼吸兴奋剂

47. 胎儿与母体进行气体交换的器官是（ ）。

- A. 脐带 B. 子宫 C. 输卵管 D. 胎盘
E. 胎膜

48. 以下哪些情况测出的血压值偏高？（ ）

- A. 夜间测血压 B. 测量下肢血压 C. 平卧位 D. 外界气温升高
E. 袖带缠得过紧

49. 小儿发育成熟最晚的系统是（ ）。

- A. 神经系统 B. 淋巴系统 C. 消化系统 D. 呼吸系统
E. 生殖系统

50. 发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，一般由医疗机构所在地的（ ）受理。

- A. 县卫生局 B. 市卫生局 C. 省卫生厅 D. 卫生部
E. 乡镇卫生院

51. 血液系统疾病患者发生继发感染最常见的症状是（ ）。

- A. 咳嗽 B. 咳痰 C. 发热 D. 咯血
E. 腹痛

52. 采集咽拭子的做法正确的是（ ）。

- A. 患者用无菌生理盐水漱口，取出拭子蘸取少量温水湿润
B. 用压舌板轻压舌部，迅速擦拭患者口腔两侧腭弓、喉、扁桃体分泌物
C. 在进食后1h内留取咽拭子

- D. 采集后的咽拭子插入普通试管内塞紧
E. 咽拭子不可接触口腔及舌部黏膜
53. 用于限制病人下肢活动的约束方法是（ ）。
- A. 约束手腕 B. 约束肩部 C. 约束膝部 D. 约束踝部
E. 固定一侧肢体
54. 间歇性、便后无痛性出血是以下何种大肠肛管疾患的临床特点？（ ）
- A. 结肠癌 B. 肛瘘 C. 肛裂 D. 痔
E. 直肠癌
55. 肺心病急性加重期的治疗关键是（ ）。
- A. 低流量吸氧 B. 利用呼吸机改善呼吸功能
C. 强心、利尿 D. 积极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能
E. 纠正电解质紊乱
56. 为高热患者酒精擦浴降温，其散热方式为（ ）。
- A. 辐射 B. 传导 C. 对流 D. 蒸发
E. 辐射+对流
57. 2 岁以下的婴幼儿进行肌肉注射时，不宜选择（ ）进行注射，以防止损伤坐骨神经。
- A. 臀大肌 B. 臀中肌 C. 臀小肌 D. 股外侧肌
E. 上臂三角肌
58. 慢性心脏病患者，休息时无不适，但日常活动时会出现疲乏、心悸、呼吸困难等不适，按 NYHA 心功能分级属于的级别是（ ）。
- A. I 级 B. II 级 C. III 级 D. IV 级
E. V 级
59. 患者，女，53 岁，支气管哮喘急性发作，经口气管插管术后 3 日，目前病情平稳，有拔管指征，给予拔除气管，拔管后突然出现血氧饱和度下降，以下做法不正确的是（ ）。
- A. 立即通知医生 B. 检查吸氧装置
C. 检查血氧饱和度测定装置 D. 准备简易呼吸器
E. 立即行气管插管
60. 患者，女，50 岁。肝硬化十余年伴大量腹水，近日出现意识障碍，血氨增高，肝肾功能减退，下列治疗哪项不妥？（ ）
- A. 大量放腹水
B. 精氨酸静脉滴注
C. 口服乳果糖，降低肠腔 pH，减少氨形成和吸收
D. 静脉注射支链氨基酸补充能量，降低血氨
E. 忌用一切对肝肾功能损害的药物
61. 护士为便秘患者进行健康指导，内容不妥的是（ ）。
- A. 建立规律的排便习惯 B. 选择食用富含纤维素的食物

- C. 定时使用简便通便法
D. 进行增强腹肌和盆底肌肉的运动，促进排便
E. 多饮水
62. 女，6个月，接种乙肝疫苗6小时后出现低热，食欲减退，正确处理方法是（ ）。
- A. 适当休息，多饮水 B. 物理降温 C. 服用退烧药 D. 立即到医院就医
E. 无需处理，等待自行退热
63. 关于传染病患者尸体处置的叙述，错误的是（ ）。
- A. 处置中，应适当遮盖尸体 B. 注意安抚家属
C. 对尸体进行消毒 D. 焚烧患者所有遗物、遗嘱
E. 及时填写尸体鉴别牌
64. 腹外疝的发病基础是（ ）。
- A. 腹壁有先天性或后天性薄弱或缺损 B. 营养不良
C. 腹腔压力增加 D. 腹部穿透伤
E. 继发于腹腔内脏器的损伤
65. 氧气筒内的氧不可用尽，压力表指针降至下列哪项时不可再用？（ ）
- A. 0.1MPa (1kg/cm²) B. 0.3MPa (3kg/cm²) C. 0.5MPa (5kg/cm²) D. 0.7MPa (7kg/cm²)
E. 1MPa (10kg/cm²)
66. 孕妇，28岁。孕36周。因阴道大量出血就诊，确诊胎盘早剥，现进入产程，治疗原则是（ ）。
- A. 清洁灌肠 B. 期待疗法 C. 抑制宫缩 D. 终止妊娠
E. 禁止人工破膜
67. 心绞痛疼痛发作时典型心电图表现是（ ）。
- A. ST段弓背抬高 B. PR间期延长
C. T波高尖 D. 出现宽大畸形的病理性Q波
E. ST段压低，T波低平或倒置
68. 有关会阴冲洗的目的，须除外（ ）。
- A. 保持伤口、会阴部清洁 B. 适用于长期卧床者
C. 妇科术后留置尿管者 D. 使妇女养成良好的卫生习惯
E. 会阴部手术后的患者
69. 腹部扪不到子宫底约在产后（ ）。
- A. 7天 B. 8天 C. 9天 D. 10天
E. 12天
70. 关于宫缩乏力性产后出血临床表现的描述，正确的是（ ）。
- A. 胎盘娩出后的出血较多 B. 血色暗红无凝块
C. 宫缩时出血量增多 D. 胎盘娩出后，子宫收缩呈球状、质硬
E. 胎盘未剥离前即出血不止，多伴有第三产程延长

三、多选题（本大题共 15 题，每小题 2 分，共 30 分。以下每一道考题下面有几个备选答案。其中有两个或两个以上正确答案。请从中选择所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。正确答案错选、多选或未选均不得分。）

71. 为一呼吸微弱、左半身偏瘫的昏迷病人测生命体征，正确的方法是（ ）。
A. 测口温、右上肢血压和脉搏
B. 测腋温、左上肢血压和脉搏
C. 测腋温、右上肢血压和脉搏
D. 看胸腹起伏观察呼吸
E. 置少许棉花置鼻孔前观察呼吸
72. 下列关于病毒性肝炎患者的预防指导正确的是（ ）。
A. 甲型肝炎预防时重点在于预防消化道传播
B. 甲肝可以和丙肝患者共用牙具
C. 性伴侣为 HBsAg 阳性者，应接种乙肝疫苗
D. 重复使用的医疗器械要严格消毒灭菌
E. 使用过的食具应进行消毒
73. 可出现柏油样便的疾病有（ ）。
A. 食管静脉曲张破裂
B. 消化性溃疡
C. 支气管扩张
D. 糜烂性胃炎
E. 慢性胰腺炎
74. 对于处于愤怒期的临终患者该如何护理？（ ）。
A. 置之不理
B. 给患者提供发泄内心情绪的适宜环境
C. 做好患者家属的工作，给予患者关爱
D. 注意预防意外事件的发生
E. 让患者尽量克制自己的情绪
75. 妊娠 24 周后听胎心部位正确的选项有（ ）。
A. 骶右前位，在母体脐上右侧听
B. 枕左前位，胎心在母体右下腹听
C. 肩先露在母体脐附近听
D. 枕右前位在母体右侧听最响
E. 骶左前在母体脐上左侧
76. 卫生法的基本原则是（ ）。
A. 卫生保护原则
B. 预防为主原则
C. 公平原则
D. 保障社会健康原则
E. 患者自主原则
77. 关于贫血与妊娠的相互影响，下列说法正确的是（ ）。
A. 妊娠可使原有贫血病情减轻
B. 重度贫血可导致产后出血
C. 胎儿组织摄取母体血清铁能力低于孕妇骨髓
D. 孕妇贫血时胎儿缺铁更严重
E. 孕妇重度贫血可导致胎儿宫内窘迫
78. 骨盆是生殖器官所在，也是胎儿娩出的通道，骨盆的组成部分包括（ ）。

- A. 髌骨 B. 骶骨 C. 尾骨 D. 股骨
E. 胫骨

79. 患者，男，50 岁。左下肢静脉曲张 20 余年，给患者左大腿根部扎压脉带，其下蹲 10 次后，自诉左小腿胀痛加重，检查曲张浅静脉仍较明显，如患者行手术治疗，术后护理应包括（ ）。

- A. 抬高患肢 B. 做患肢功能锻炼 C. 观察伤口渗血情况 D. 患肢绷带加压包扎
E. 避免过早下床站立、行走

80. 大量快速输库存血引起出血倾向的原因是（ ）。

- A. 库存血中血小板低 B. 库存血温度低
C. 库存血中凝血因子低 D. 库存血中枸橼酸钠高
E. 库存血中红细胞破坏

81. 为患者做口腔护理时应注意的是（ ）。

- A. 动作要轻，防止碰伤黏膜 B. 昏迷患者应夹紧棉球
C. 如有活动义齿应先取下 D. 昏迷患者义齿应浸泡于漱口液中
E. 传染患者应注意隔离

82. 少尿症状主要见于（ ）。

- A. 急性膀胱炎病人 B. 慢性肾衰竭病人 C. 心力衰竭病人 D. 休克病人
E. 慢性膀胱炎病人

83. 膀胱癌术后灌注化疗药物时错误的是（ ）。

- A. 每次用量 > 100ml B. 严格无菌操作
C. 吸出的液体可回注 D. 注药前应先排尽尿液
E. 灌注后暂不排尿

84. 羊水过少可见于下列哪些情况？（ ）

- A. 过期妊娠 B. 胎儿消化系统畸形 C. 胎盘绒毛血管瘤 D. 胎儿生长受限
E. 妊娠期高血压疾病

85. 前列腺切除术后正确的护理措施是（ ）。

- A. 采用肛管排气，避免腹胀 B. 术后平卧 2d 后改半卧位
C. 禁止灌肠 D. 生理盐水持续膀胱冲洗
E. 术后立即下床活动，以免便秘

十堰医疗卫生系统招聘《护理学》专项训练

参考答案及解析

一、判断题

1. 【答案】B。解析：对于肾功能正常的患者，可进正常优质蛋白饮食；对于肾功能不良的患者，应限制蛋白质摄入，进优质低蛋白饮食。故本题说法错误。
2. 【答案】B。解析：完全离断的肢体，原则上不做任何无菌处理，禁忌用任何液体冲洗、浸泡或涂药，在保存上视运送距离而定。不完全离断的肢体，包扎止血后，用夹板固定。到达医院后进行进一步处理。故本题说法错误。
3. 【答案】A。解析：滴虫阴道炎治愈标准为连续 3 次月经干净后复查阴道分泌物中滴虫均为阴性。故本题说法正确。
4. 【答案】B。解析：对心力衰竭病人输液，应严格限制滴速在 20~30 滴/分。故本题说法错误。
5. 【答案】A。解析：宫颈炎最常见的病理改变为宫颈糜烂，急性宫颈炎的临床表现为大量脓性白带、腰酸、下腹坠痛、尿频、尿急、体温升高，体检见宫颈充血、肿大、有脓性白带从宫口流出。故本题说法正确。
6. 【答案】A。解析：内服药为蓝色标签，外用药为红色标签，剧毒药和麻醉药为黑色标签。故本题说法正确。
7. 【答案】B。解析：子宫内膜异位症的典型症状是继发性渐进性痛经，常于月经前 1~2 天开始，经期第一天最为剧烈，逐渐减轻。故本题说法错误。
8. 【答案】B。解析：二甲双胍片是 II 型糖尿病病人控制高血糖的一线药物和药物联合中的基本用药。故本题说法错误。
9. 【答案】A。解析：多巴胺不宜长期大量使用，如剂量太大，有可能出现室性早搏。故本题说法正确。
10. 【答案】B。解析：甲状腺危象的典型临床表现：在术后 12~36 小时内出现高热、脉快而弱、烦躁、谵妄，甚至昏迷，常伴有呕吐、腹泻等。故本题说法错误。
11. 【答案】B。解析：采集各种标本均应按医嘱执行。医生填写检验申请单，字迹要清楚，目的要明确，医生应签全名。凡对检验申请单有疑问，护士应及时核准、核实后才可执行。故本题说法错误。
12. 【答案】B。解析：洗胃禁忌证：强腐蚀性毒物（如强酸、强碱）中毒、肝硬化伴食管胃底静脉曲张、胸主动脉瘤、近期内有上消化道出血及胃穿孔、胃癌等。患者吞服强酸、强碱等腐蚀性药物，禁忌洗胃，以免造成穿孔。上消化道溃疡、食管静脉曲张、胃癌等患者一般不洗胃，昏迷患者洗胃宜谨慎。故本题说法错误。
13. 【答案】B。解析：尿道挫伤及轻度裂伤者不需特殊治疗，可止血、镇痛、应用抗生素预防感染。排尿困难者，可试插导尿管，如顺利进入膀胱，可留置导尿管 2 周左右。尿道损伤后常并发尿道狭窄，狭窄轻者可定期作尿道扩张术，狭窄严重，可行内镜下尿道内冷刀切开狭窄部位、切除瘢痕组织；必要时可经会阴切除瘢痕狭窄段，行尿道端端吻合术。故本题说法错误。
14. 【答案】A。解析：烧伤面积以相对于体表面积的百分率表示，根据中国新九分法，成年男性双足占体表面积的 7%。故本题说法正确。
15. 【答案】A。解析：不典型心绞痛、急性心肌梗死：心肌缺血或坏死时，疼痛可通过迷走神经反

射放射至上腹部，表现为类似胃痛或腹痛。急性心包炎：炎症刺激膈神经时，疼痛可放射至上腹部，常伴随发热、呼吸困难等症状。主动脉夹层：夹层撕裂累及腹主动脉时，可引发剧烈腹痛，疼痛呈撕裂样并向腰背部放射。胸膜炎：炎症累及胸膜时，疼痛可沿肋间神经放射至前胸或上腹部，深呼吸时加重。自发性气胸可能通过神经反射引发胸部或腹部放射性疼痛，但较少见。故本题说法正确。

16. 【答案】B。解析：羊水栓塞是指羊水进入母体血液循环引起肺动脉高压、低氧血症、循环衰竭、弥散性血管内凝血、多器官功能衰竭等一系列病理生理变化的分娩期并发症。多发生在分娩过程中，极少数也可以发生在中期妊娠引产、羊膜腔穿刺术中和外伤时。故本题说法错误。

17. 【答案】B。解析：肝区疼痛是肝癌病人最常见和最主要的症状。故本题说法错误。

18. 【答案】A。解析：运动障碍是指运动系统的任何部位受损所导致的骨骼肌活动异常，可分为瘫痪、不自主运动及共济失调等。故本题说法正确。

19. 【答案】B。解析：呼吸困难可分为吸气性呼吸困难、呼气性呼吸困难、混合性呼吸困难。吸气性呼吸困难常见于急性喉炎、喉水肿、喉痉挛、喉癌、气管肿瘤、气管异物或气管受压等；呼气性呼吸困难常见于支气管哮喘、慢性阻塞性肺气肿等；混合性呼吸困难常见于重症肺炎、重症肺结核、大片肺不张、大量胸腔积液和气胸等。故本题说法错误。

20. 【答案】B。解析：从生物力学的角度上看，腰4~腰5及腰5~骶1椎间盘所承受的压力最大，其活动度也最大，而位于这两个节段的后纵韧带却相对较窄（只有上部宽度的1/2），因而腰4~腰5及腰5~骶1椎间盘是最容易受损的部位，临床上也是以腰4~腰5及腰5~骶1椎间盘突出最为常见。故本题说法错误。

二、单选题

21. 【答案】C。解析：用平车运送患者最重要的是保证患者的持续性治疗不受影响，对于输液患者最重要的是做好穿刺部位的固定，防止针头脱出。故本题选C。

22. 【答案】D。解析：A、B、C、E项说法均正确。D项，一次性口罩遇污染时应及时更换。故本题选D。

23. 【答案】C。解析：病毒性肠炎可能继发双糖酶（主要是乳糖酶）缺乏，应暂停乳类喂养，改为豆浆、去乳糖配方奶粉等，以减轻腹泻，缩短病程。故本题选C。

24. 【答案】B。解析：医院感染暴发主要通过以下途径传播：①医疗器械消毒灭菌不合格（如内镜、注射器等未规范消毒）；②使用不合格的一次性无菌用品（如污染的输液器、手术器械）；③医务人员携带特殊耐药菌（如MRSA）并通过手卫生不规范传播；④食物污染（如医院内食物储存不当引发消化道感染。B项，激素本身并非病原体传播的媒介，其主要用于调节患者免疫或代谢功能。虽然长期使用激素可能降低患者免疫力，增加感染风险，但行为本身并不直接导致医院感染暴发。故本题选B。

25. 【答案】A。解析：上述注射给药的方式吸收速率为静脉注射>腹腔注射>肌肉注射>皮下注射>口服>涂皮。故本题选A。

26. 【答案】C。解析：此患儿34周，为早产儿。早产儿的肺发育不成熟，表面活性物质缺乏，易发生肺透明膜病，又称新生儿呼吸窘迫综合征，指出生后不久即出现进行性呼吸困难、青紫、呼气性呻吟、吸气性三凹征和呼吸衰竭。肺部X线检查早期两肺有细小颗粒阴影，最后两肺野均呈白色，伴有黑色“支气管充气征”。实验室检查：代谢性酸中毒，血钾早期常增高。结合患儿表现，考虑发生了新生儿肺透明膜病。故本题选C。

27. 【答案】D。解析：婴儿盆浴时以左前臂托住婴儿背部，左手掌托住头颈部，拇指与中指分别将婴儿双耳廓折向前按住，防止水流入造成内耳感染。故本题选D。

28. 【答案】B。解析：本病起病缓，婴儿可骤起高热、惊厥。典型表现分为前驱期（早期）、脑膜刺激期（中期）、昏迷期（晚期）。故本题选B。

29. 【答案】D。解析：该孕妇在使用胰岛素治疗中已发生低血糖反应，应立即进食。故本题选 D。
30. 【答案】E。解析：患者有腹水和黄疸入院，腹水表示体液过多。题干没有其他异常提示。因此最主要的护理问题是体液过多。故本题选 E。
31. 【答案】E。解析：酒精可以脱碘，这是因为酒精和碘之间存在一种化学反应。在这个反应中，酒精和碘的化学性质都发生了变化。酒精被氧化成了乙醛，而碘被还原成了碘离子。故本题选 E。
32. 【答案】C。解析：再生障碍性贫血治疗首选雄激素，其作用机制是刺激肾脏产生促红细胞生成素，并直接作用于骨髓，促进红细胞生成，常用药物有司坦唑醇、丙酸睾酮、安雄等。故本题选 C。
33. 【答案】E。解析：病室相对湿度以 50%~60%为宜。湿度过高时，潮湿的空气利于细菌的繁殖，可增加医院感染的发生率；同时，机体蒸发作用减弱，出汗受到抑制，病人感觉闷热，尿液排出增多，加重了肾脏的负担。湿度过低时，空气干燥，水分大量蒸发，可致口干舌燥、咽痛、烦渴等，对气管切开、呼吸道感染、急性喉炎的病人尤为不利。故本题选 E。
34. 【答案】A。解析：术后患者肛门未排气，腹胀明显，应进行胃肠减压，持续引流胃肠内容物，降低肠腔内压力，减轻腹胀，促进肠道功能恢复。故本题选 A。
35. 【答案】D。解析：异位妊娠在流产或破裂前往往无明显症状，也可有停经、腹痛、少量阴道出血。破裂后表现为急性剧烈腹痛，反复发作，阴道出血，以至休克。检查常有腹腔内出血体征，子宫旁有包块，超声检查可助诊。盆腔检查可有宫颈抬举痛或摇摆痛。结合患者表现，考虑发生了异位妊娠。故本题选 D。
36. 【答案】B。解析：危重病人病情变化快，应当严密监测，并做好配合抢救的打算。故本题选 B。
37. 【答案】E。解析：艾滋病的传播途径包括：①性接触传播；②经血液传播；③母婴传播；④应用 HIV 感染者的器官移植或人工授精，被 HIV 污染的针头刺伤或破损皮肤意外受感染，生活中密切接触经破损的皮肤处感染。目前还没有发现传播艾滋病病毒的吸血昆虫。故本题选 E。
38. 【答案】C。解析：急性左心衰竭患者吸氧的同时进行乙醇湿化，可使肺泡内的泡沫消失，增加气体交换面积。故本题选 C。
39. 【答案】C。解析：慢性肾炎是否限水不能一概而论，应根据病人病情，如果每天尿量达 1000ml 以上，一般不需严格限水，但不可过多饮水。若每天尿量小于 500ml 或有严重水肿者需限制水的摄入，重者应量出为入，每天液体入量不应超过前一天 24 小时尿量加上不显性失水量（约 500ml）。故本题选 C。
40. 【答案】D。解析：青霉素引起的血清样反应的临床表现与血清病相似，有发热、关节肿痛、皮肤发痒、荨麻疹、全身淋巴结肿大及腹痛等症状。故本题选 D。
41. 【答案】B。解析：中分子右旋糖酐的主要作用是提高血浆胶体渗透压和扩充血容量；低分子右旋糖酐的主要作用是降低血液粘稠度，改善微循环；血液制品能补充蛋白质和扩充血容量；晶体溶液对维持水、电解质、酸碱平衡有重要作用。故本题选 B。
42. 【答案】C。解析：急性中毒病例，应紧急采取“口服催吐法”，必要时进行洗胃，以减少毒物的吸收。由题干可知患儿意识清楚，有恶心、呕吐症状，因此最佳洗胃方法为口服催吐洗胃。故本题选 C。
43. 【答案】D。解析：烂苹果味常见于糖尿病酮症酸中毒；肝腥味常见于肝性脑病；大蒜味常见于有机磷农药中毒；氨臭味常见于慢性肾衰竭。故本题选 D。
44. 【答案】A。解析：脑梗死包括脑血栓形成和脑栓塞。脑血栓形成的临床特点：①多见于 50 岁以上有动脉粥样硬化、高血压、高血脂、糖尿病者；②安静或睡眠中发病，部分病人发病前有肢体麻木、无力等前驱症状或短暂性脑缺血（TIA）发作；③起病缓慢，症状多在发病后 10 小时或 1~2 天达高峰；④以偏瘫、失语、偏身感觉障碍和共济失调等局灶定位症状为主；⑤部分病人可有头痛、呕吐、意识障碍等全脑症状。结合患者表现，考虑为脑血栓形成。故本题选 A。
45. 【答案】D。解析：化疗药物外渗的紧急处理：①停止给药；②回抽：不要拔针，尽量回抽渗入皮下的药液；③评估：评估并记录外渗的穿刺部位、面积，外渗药液的量，皮肤的颜色、温度，疼痛的性质；④解毒：局部滴入生理盐水以稀释药液或用解毒剂；⑤封闭：利多卡因局部封闭；⑥涂抹：可用 50%硫酸镁直接涂在患处并用棉签以旋转方式向周围涂抹，范围大于肿胀部位；⑦冷敷与热敷：局部 24

小时冰袋间断冷敷，但植物碱类化疗药除外，例如长春新碱、长春碱、依托泊苷（足叶乙苷）等化疗药不宜冰敷，宜局部间断热敷 24 小时；⑧抬高：药液外渗 48 小时内，应抬高受累部位，以促进局部外渗药液的吸收。故本题选 D。

46. 【答案】B。解析：大咯血窒息最重要的护理措施是保持呼吸道通畅，有窒息先兆应立即清除呼吸道异物、血块。故本题选 B。

47. 【答案】D。解析：胎盘主要功能包括气体交换、营养物质供应、排出胎儿代谢产物、防御、合成及免疫。故本题选 D。

48. 【答案】B。解析：A 项错误，血压呈明显的昼夜波动，夜间血压最低，晨起活动后血压迅速升高，上午 6~10 时和下午 4~8 时各有一个高峰，晚上 8 点后血压缓慢下降。B 项正确，由于股动脉的管径较肱动脉粗，血流量大，下肢血压高于上肢血压。C 项错误，测血压时可取坐位或平卧位。D 项错误，寒冷环境，末梢血管收缩，血压可略升高；高温环境，皮肤血管扩张，血压略下降。E 项错误，袖带缠得过紧可使血压降低。故本题选 B。

49. 【答案】E。解析：小儿各系统器官发育具有不平衡性，生殖系统发育最晚，神经系统发育最早，尤其是脑的发育最为迅速。故本题选 E。

50. 【答案】A。解析：发生医疗事故争议，当事人申请卫生行政部门处理的，由医疗机构所在地的县级人民政府卫生行政部门受理。故本题选 A。

51. 【答案】C。解析：发热是继发感染最常见的症状。血液病病人容易发生感染，多由于成熟的粒细胞减少、营养不良以及机体免疫力降低而引起。故本题选 C。

52. 【答案】E。解析：A 项错误，患者不需要漱口，取出拭子放入无菌生理盐水中湿润。B 项错误、E 项正确，采取口咽拭子时，用压舌板轻压舌部，将拭子越过舌根到咽后壁及扁桃体隐窝、侧壁等处，反复擦拭收集黏膜细胞，避免触及舌头、悬垂体、口腔黏膜和唾液。C 项错误，避免在进食后 2h 内留取标本，以防呕吐。D 项错误，采集后的咽拭子置于转运培养基中。故本题选 E。

53. 【答案】C。解析：约束手腕可以限制患者手腕活动；约束肩部可以限制患者坐起；约束膝部可以限制患者下肢活动；约束踝部可以限制踝关节活动；固定一侧肢体可以限制该侧肢体活动。故本题选 C。

54. 【答案】D。解析：A 项，结肠癌多表现为排便次数增加、粪便不成形或稀便、便秘与腹泻交替出现、粪便中带脓血或黏液。B 项，肛瘘表现为肛门周围外口有脓性分泌物排出，自觉有粪便及气泡逸出，反复形成脓肿。C 项，肛裂患者以排便时及便后肛门剧烈疼痛为特点。D 项，内痔为排便时无痛性出血和痔块脱出；外痔为肛门不适、潮湿、有时伴有局部瘙痒。E 项，直肠癌早期主要表现为排便习惯改变和少量便血；后期患者出现便意频繁、肛门下坠感、里急后重、排便不尽感等，出现黏液血便，大便变形、变细，严重时出现脓血便。故本题选 D。

55. 【答案】D。解析：肺心病的治疗以“治肺为本，治心为辅”，急性期以积极控制感染、缓解气道痉挛、改善通气功能为主。故本题选 D。

56. 【答案】D。解析：人体散热方式有 4 种：辐射、对流、蒸发、传导。乙醇（酒精）是一种挥发性的液体，拭浴时在皮肤上迅速蒸发，吸收和带走机体大量的热，而且乙醇又具有刺激皮肤使血管扩张的作用，散热能力较强。所以乙醇擦浴主要的散热方式是蒸发。故本题选 D。

57. 【答案】A。解析：对 2 岁以下婴幼儿不宜选用臀大肌注射，因其臀大肌尚未发育好，注射时有损伤坐骨神经的危险，最好选择股外侧肌、臀中肌和臀小肌注射。故本题选 A。

58. 【答案】B。解析：① I 级：病人患有心脏病，但日常活动量不受限制，一般活动不引起乏力、呼吸困难等心衰症状。② II 级：体力活动轻度受限。休息时无自觉症状，但平时一般活动可出现疲乏、心悸、呼吸困难等不适，休息后很快缓解。③ III 级：体力活动明显受限。休息时无症状，低于平时一般活动量时即可引起上述症状，休息较长时间后症状方可缓解。④ IV 级：任何体力活动均会引起不适。休息时亦有心衰的症状，稍有体力活动后症状即加重。结合患者表现，考虑为心功能 II 级。故本题选 B。

59. 【答案】E。解析：气管插管拔管后需要注意口、鼻、咽腔内的分泌物清理，使用负压引流装置将分泌物吸尽，以避免出现误吸、窒息的情况，同时鼓励患者咳嗽、咳痰，尽量排出痰液、分泌物。还

要密切观察呼吸道是否通畅，血氧饱和度是否正常，如果呼吸道不通畅、氧饱和度过低，则需要采取吸氧等措施，必要时再次气管切开，改善患者通气功能。故本题选 E。

60. 【答案】A。解析：肝性脑病的治疗包括：①选用谷氨酸钾，降低血氨；②精氨酸静脉滴注：精氨酸可促进尿素合成，促进体内氨的清除；③口服乳果糖，降低肠腔 pH，减少氨的形成和吸收；④静脉注射支链氨基酸补充能量，降低血氨；⑤忌用一切对肝肾功能有损害的药物。肝性脑病患者应避免大量放腹水，以防止有效循环血量减少、大量蛋白质丢失及低钾血症，从而加重病情。故本题选 A。

61. 【答案】C。解析：护士为便秘患者进行健康指导时，应向病人及家属宣教有关排便的知识，养成合理膳食结构。建立并维持正常排便习惯，防止便秘发生。非必要情况，不使用灌肠等通便方法。故本题选 C。

62. 【答案】A。解析：疫苗接种的一般反应是指由疫苗本身所引起的反应，大多为一过性，在 24 小时内出现，主要表现为发热和局部红肿、疼痛，可伴有食欲减退、全身不适、乏力等。多数儿童的反应是轻微的，一般持续 2~3 天自行消退，无须特殊处理，适当休息，多饮水即可。反应较重者，可对症处理，如物理降温、局部热敷等；反应严重者，如局部红肿持续扩大，高热不退，应到医院就诊。故本题选 A。

63. 【答案】D。解析：A 项正确，处置中，应适当遮盖尸体，维护死者隐私，防止体液或分泌物外泄。B 项正确，做好死者家属的心理疏导和支持工作。C 项正确、D 项错误，尸体需进行卫生处理（如消毒、火化或深埋），但遗物（如衣物、个人物品）和具有法律效力的遗嘱需按规范消毒后妥善保存或移交家属。E 项正确，及时填写尸体鉴别牌，确保尸体身份准确，是解剖查验和后续处理的关键步骤。故本题选 D。

64. 【答案】A。解析：腹外疝的发病基础是腹壁有先天性或后天性薄弱或缺损。故本题选 A。

65. 【答案】C。解析：使用氧气筒时，筒内氧气勿用尽，应至少保留 0.5MPa (5kg/cm²)，以免灰尘进入筒内，再充气时引起爆炸。故本题选 C。

66. 【答案】D。解析：胎盘早剥一旦确诊，必须及时剖宫产或经阴道分娩终止妊娠。故本题选 D。

67. 【答案】E。解析：心绞痛疼痛发作时，多数病人出现暂时性心内膜下心肌缺血引起的 ST 段压低 ($\geq 0.1\text{mV}$)，T 波低平、平坦甚至倒置，在平时 T 波持续倒置的病人，发作时可变为直立。故本题选 E。

68. 【答案】D。解析：会阴冲洗的目的包括：①清除会阴部分泌物，保持会阴及肛门部清洁，促进舒适和会阴伤口愈合；②防止生殖系统、泌尿系统逆行感染，适用于长期卧床、妇科腹部手术留置导尿管的患者；会阴、阴道手术后，产后一周内，而非日常卫生保健。故本题选 D。

69. 【答案】D。解析：随着肌纤维不断缩复，子宫体逐渐缩小，于产后 1 周子宫缩小至约妊娠 12 周大小，在耻骨联合上方可扪及；于产后 10 天子宫降至骨盆腔内，在腹部检查摸不到子宫底；于产后 6 周子宫恢复至孕前大小。故本题选 D。

70. 【答案】A。解析：子宫收缩乏力所致出血常表现为胎盘娩出后阴道大量出血，色暗红，子宫软，轮廓不清，宫缩时出血量减少，若有宫腔积血可表现为宫底升高。血色暗红无凝块为凝血功能障碍的表现。故本题选 A。

三、多选题

71. 【答案】CE。解析：昏迷患者禁忌口温测量。腋下有创伤、手术、炎症，腋下出汗较多者，肩关节受伤或消瘦夹不紧体温计者禁忌腋温测量。因此该患者可测腋温；对于偏瘫患者，应测量健侧血压及脉搏；对于呼吸微弱的患者，可用少许棉花置于患者鼻孔前，观察棉花被吹动的次数，计时应 1 分钟。故本题选 CE。

72. 【答案】ACDE。解析：甲型、戊型肝炎主要通过粪-口途径传播，应指导甲型和戊型肝炎患者应预防消化道传播，重点在于加强粪便管理，保护水源，严格饮用水的消毒，加强食品卫生和食具消毒，

乙、丙、丁型肝炎预防重点在于防止通过血液和体液传播。对供血者进行严格筛查，做好血源监测。推广一次性注射用具，重复使用的医疗器械要严格消毒灭菌。注意个人卫生，不和任何人共用剃须刀和牙具等用品。若性伴侣为 HBsAg 阳性者，应接种乙型肝炎疫苗或采用安全套；在性伴侣健康状况不明的情况下，一定要使用安全套以预防乙型肝炎及其他血源性或性传播疾病。故本题选 ACDE。

73. 【答案】ABD。解析：柏油样便见于上消化道疾病（如食管、胃、十二指肠、胆和某些胰腺疾病）或全身性疾病导致的上消化道出血，常见病因为消化道溃疡、急性糜烂型出血性胃炎、食管胃底静脉曲张破裂和胃癌。支气管扩张出现咯血，无柏油样便；慢性胰腺炎无柏油样便，而急性胰腺炎可出现出血，出现柏油样便。故本题选 ABD。

74. 【答案】BCD。解析：愤怒期患者的护理：①护理人员此期一定要有爱心、耐心，认真地倾听患者的倾诉，应将患者的发怒看成是一种有益健康的正常行为，允许患者以发怒、抱怨、不合作行为来宣泄其内心的不满、恐惧，同时应注意预防意外事件的发生。②给患者提供表达或发泄内心情感的适宜环境，并加以必要的心理疏导，帮助其渡过心理难关，避免其过久地停留于否认阶段而延误必要的治疗。③做好患者家属和朋友的工作，给予患者关爱、理解、同情和宽容。故本题选 BCD。

75. 【答案】ACDE。解析：A、C、D、E 四项均正确，B 项错误，胎心听诊应该在靠近胎儿背部稍靠上方的孕妇腹壁上听得最清楚，枕左前位时胎儿背应在母体的左侧，所以应该在母体左侧听诊胎心音最清楚，而不是母体右侧。故本题选 ACDE。

76. 【答案】ABCDE。解析：卫生法包括由国家立法机关正式颁布的规范性文件，以及由非正式立法机关颁布发行的在其所辖范围内普遍有效的规范性决定、条例、办法等。基本原则有：①卫生保护原则；②预防为主原则；③公平原则；④保障社会健康原则；⑤病人自主原则。故本题选 ABCDE。

77. 【答案】BE。解析：A 项错误，妊娠可使原有贫血的病情加重，而贫血则使妊娠风险增加。B 项正确，重度贫血可导致贫血性心脏病、产后出血、失血性休克、产褥感染等并发症的发生，危及孕妇生命。C 项错误，孕妇骨髓与胎儿竞争摄取母体血清铁的过程中，一般以胎儿组织占优势。D 项错误，由于铁通过胎盘的转运为单向运输，所以孕妇贫血时胎儿缺铁不会严重。E 项正确，孕妇发生重度贫血时，会缺乏胎儿生长所需的营养物质和胎盘养分，可造成胎儿生长受限、胎儿宫内窘迫、早产、死胎或者死产等不良后果。故本题选 BE。

78. 【答案】ABC。解析：骨盆由左右 2 块髋骨和 1 块骶骨及 1 块尾骨组成。故本题选 ABC。

79. 【答案】ABCD。解析：A 项正确，静脉曲张患者术后可适当抬高患肢，促进静脉回流；B 项正确，患者术后可进行踝泵运动，进行患肢的功能锻炼；C 项正确，术后应观察患者伤口情况及皮下渗血，发现异常应及时报告医师；D 项正确，术后应每日穿着弹力袜或弹力绷带 12h，坚持使用半年以上，预防术后深静脉血栓的形成；E 项错误，为避免深静脉血栓的形成，促进静脉回流，术后应鼓励患者早期下床行走，但 3 个月内禁止剧烈运动。故本题选 ABCD。

80. 【答案】AC。解析：长期反复输血或超过患者原血液总量的输血，由于库存血中的血小板破坏较多，使凝血因子减少而引起出血。故本题选 AC。

81. 【答案】ABCE。解析：口腔护理时，动作要轻，避免碰伤黏膜和牙龈；有活动义齿者，取下义齿并用冷水刷洗，浸于冷水中备用；擦拭口腔时，止血钳须夹紧棉球，防止棉球遗留在口腔内；传染病患者的用物需按消毒隔离原则进行处理。故本题选 ABCE。

82. 【答案】BCD。解析：少尿是指 24 小时尿量少于 400ml 或每小时尿量少于 17ml，常见于发热、液体摄入过少、休克等患者体内血液循环不足，心脏、肾脏、肝脏功能衰竭患者。故本题选 BCD。

83. 【答案】AC。解析：A 项错误，膀胱癌时，每种药物的用量不同，如卡介苗，一般在行灌注化疗时每次灌注卡介苗用量约为 60~120mg，用 40~50ml 生理盐水溶解；法玛新 50~80mg，用生理盐水溶解为 1mg/ml，即用量为 50~80ml。B 项正确、C 项错误，灌注时需严格无菌操作，吸出的液体不可回注，以避免感染。D 项正确，膀胱灌注药物前避免大量饮水，灌注前排空膀胱，以便使膀胱内药液达到治疗药物浓度。E 项正确，灌注后，嘱病人大量饮水，稀释尿液以降低药物浓度，减少对尿道黏膜刺激。故本题选 AC。

84. 【答案】ADE。解析：羊水过少主要与羊水产生减少或羊水外漏有关。常见原因有：①胎儿结构异常：以胎儿泌尿系统结构异常为主，染色体异常、脐膨出、膈疝、法洛四联症、甲状腺功能减低等也可引起羊水过少。②胎盘功能减退：过期妊娠、胎儿生长受限和胎盘退行性变、胎儿慢性缺氧。③母体因素：妊娠期高血压疾病。④羊膜病变：某些原因不明的羊水过少与羊膜通透性改变、炎症及宫内感染有关。胎膜破裂后羊水外漏速度超过羊水生成速度，也导致羊水过少。故本题选 ADE。

85. 【答案】BCD。解析：前列腺切除术后早期禁止灌肠或肛管排气，以免造成前列腺窝出血，且不宜过早活动，以免造成出血。故本题选 BCD。