

## 内科护理学专项训练

### 一、单选题

1. 异物及吸入性疾病如肺脓肿多发生在右侧肺部，这是因为：  
A.右主支气管较左主支气管粗、短而陡直  
B.右支气管较长  
C.左支气管黏膜较粗糙  
D.左主支气管较右主支气管粗、短而陡直  
1.【答案】A。
2. 下列属于肝脏的生理功能的是：  
A.分泌胆汁  
B.浓缩胆汁  
C.储存胆汁  
D.排出胆汁  
2.【答案】A。
3. 由于呼吸道分泌物阻塞引起患者呼吸困难，烦躁不安时，下列哪项处理措施不妥：  
A.立即给患者氧气吸入  
B.将患者半卧位协助咳嗽排痰  
C.立即肌肉注射吗啡 10mg 镇静  
D.立即鼻导管吸氧  
3.【答案】C。
4. 患者男，32岁，5年来多次因上腹部胀痛不适就诊，拟诊为胃溃疡，为明确诊断可做的辅助检查是：  
A.胃液分析  
B.血清学检查  
C.大便隐血试验  
D.纤维胃镜检查  
4.【答案】D。

5. 弛张热，易合并脓胸、脓气胸等表现多见于下列哪种类型的肺炎：
- |             |             |
|-------------|-------------|
| A.腺病毒性肺炎    | B.金黄色葡萄球菌肺炎 |
| C.呼吸道合胞病毒肺炎 | D.肺炎支原体肺炎   |

5. 【答案】B。

6. 老年糖尿病患者应用胰岛素时，更容易发生低血糖的原因是：
- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| A.对胰岛素敏感增高          | B.肾糖阈降低导致尿糖增加 |
| C.肝功能减退导致对胰岛素灭活能力降低 | D.胰岛素剂量控制不当   |

6. 【答案】C。

7. 结核病传染性最大的是：
- |              |          |
|--------------|----------|
| A.原发性肺结核     | B.浸润型肺结核 |
| C.慢性纤维空洞型肺结核 | D.活动性肺结核 |

7. 【答案】C。

8. 幽门螺杆菌感染引发慢性胃炎的机制，不包括：
- A.分泌尿素酶，破坏胃内酸性环境
  - B.产生细胞毒素，造成胃黏膜损害
  - C.诱导自身免疫反应，损伤胃上皮细胞
  - D.抑制生理性前列腺素 E 合成，降低胃黏膜保护作用

8. 【答案】D。

9. 慢性肾小球肾炎的发病机制是：
- |             |             |
|-------------|-------------|
| A.病毒感染所致    | B.细菌感染所致    |
| C.免疫介导的炎症反应 | D.高蛋白、高血压所致 |

9. 【答案】C。

10. 消化性溃疡并发幽门梗阻患者的主要临床表现为：

- A. 体重下降
- B. 食欲减退
- C. 水和电解质紊乱
- D. 呕吐大量宿食

10. 【答案】D。

11. 患者，男性，52岁，既往支气管扩张症10年，2天来出现高热、咳嗽、咳痰剧烈，其治疗原则应为：

- A. 促进排痰和控制感染
- B. 加强痰液引流
- C. 促进排痰和卧床休息
- D. 控制感染和增加营养

11. 【答案】A。

12. 慢性肾炎病人给予优质低蛋白、低磷饮食治疗的目的是：

- A. 减轻肾性水肿
- B. 降低肾性高血压
- C. 延缓肾小球硬化和肾功能减退
- D. 预防低钾血症

12. 【答案】C。

13. 患者，男性，30岁。因外出春游后出现咳嗽、咳痰伴喘息1天入院。体检：体温36.8℃，脉搏90次/分，呼吸28次/分，血压120/80mmHg，喘息貌，在肺部可闻及广泛哮鸣音。该患者最可能的诊断是：

- A. 肺炎
- B. 支气管扩张
- C. 支气管哮喘
- D. 肺心病

13. 【答案】C。

14. 下列不属于心脏传导系统的是：

- A. 窦房结
- B. 房室结
- C. 冠状窦
- D. 希氏束

14. 【答案】C。

15. 引起慢性心力衰竭最常见和最重要的诱因是：

- A. 过度劳累
- B. 心律失常
- C. 情绪激动
- D. 呼吸道感染

15. 【答案】D。

16. 服抗酸药物的注意事项不对的是：

- A. 戒烟
- B. 按疗程正规用药
- C. 应在饭前服
- D. 保持大便通畅

16. 【答案】C。

17. 右心衰竭患者常有食欲减退、恶心、呕吐、腹痛等症状，是由于：

- A. 左心室扩大压迫膈肌
- B. 迷走神经反射增强
- C. 交感神经反射增强
- D. 胃肠道淤血

17. 【答案】D。

18. 脑血管病最重要的危险因素是：

- A. 高血压
- B. 高血脂
- C. 肥胖
- D. 高盐饮食

18. 【答案】A。

19. 服用洋地黄时应：

- A. 用钾忌钙
- B. 用钙忌钾
- C. 用钙忌钠
- D. 用钠忌钙

19. 【答案】A。

20. 诊断甲状腺功能亢进症患者最可靠的指标是：

- A.基础代谢率测定  
B.甲状腺素抑制试验  
C.甲状腺吸  $^{131}\text{I}$  率测定  
D. $\text{T}_3$ 、 $\text{T}_4$  测定

20. 【答案】D。

21. 患者女性，50岁，因咳嗽、咳痰、尿少、呼吸困难加重，既往有风湿性心脏病二尖瓣狭窄、心力衰竭。医生考虑患者有急性左心衰，进行强心、利尿、扩血管治疗，利尿剂的最佳使用时间是：

- A.早晨  
B.中午  
C.下午  
D.傍晚

21. 【答案】A。

22. 蜘蛛痣形成的原因是：

- A.毛细血管脆性增加  
B.胆道感染  
C.胆红素过多  
D.血中雌激素增加

22. 【答案】D。

23. 持久性心房颤动最常见的并发症是：

- A.房室传导阻滞  
B.室性期前收缩  
C.肺感染  
D.动脉栓塞

23. 【答案】D。

24. 下列哪项为类风湿关节炎的表现：

- A.梭状指  
B.杵状指  
C.匙状指  
D.膝内翻

24. 【答案】A。

25. 患者，男性，32岁，体检发现心律失常，心电图为偶发室性期前收缩，X线胸透及超声心动图均正常。宜给予该患者的处理是：

- A.口服抗心律失常药物
- B.不需常规抗心律失常治疗
- C.服糖皮质激素
- D.卧床休息，用血管扩张药

25.【答案】B。

26. 某肝硬化病人，参加晚宴后突然大量呕血，因抢救不及时而死亡。其出血原因可能是：

- A.溃疡急性穿孔
- B.胃应激性溃疡
- C.食管及胃底静脉曲张破裂
- D.食管破裂

26.【答案】C。

27. 高血压危象药物治疗可首选：

- A.硝普钠
- B.硝酸甘油
- C.利尿剂
- D.甘露醇

27.【答案】A。

28. 患者男，35岁，肝硬化，近两天饮食不佳，少言，神志恍惚。医嘱要求检查血氨，其目的是要了解：

- A.是否出现肝性脑病
- B.胆道是否出现阻塞
- C.肝硬化是否出现好转前兆
- D.是否需要补充更多的葡萄糖

28.【答案】A。

29. 痛风首选的药物：

- A.阿司匹林
- B.吠喃西林
- C.秋水仙碱
- D.异烟肼

29.【答案】C。

30. 肝硬化病人发生食管静脉曲张，护士应掌握该病最重要的情况是：

- A.观察出血体征
- B.观察腹水增长
- C.观察吞咽困难
- D.保持病人完全卧床休息

30.【答案】A。

31. 铁的吸收部位主要在：

- A.胃
- B.十二指肠球部
- C.空肠下段
- D.十二指肠及空肠上段

31.【答案】D。

32. 由于维生素 B<sub>12</sub>、叶酸缺乏引起的贫血是：

- A.小细胞低色素性贫血
- B.大细胞性贫血
- C.正常细胞性贫血
- D.小细胞高色素性贫血

32.【答案】B。

33. 再生障碍性贫血的发病机制是：

- A.营养缺乏
- B.骨髓造血功能低下
- C.失血过多
- D.严重感染

33.【答案】B。

34. 诊断肝性脑病最具意义的体征是：

- A.巴宾斯基征阳性
- B.锥体束征阳性
- C.扑翼样震颤
- D.肌张力增高

34.【答案】C。

35. 传染病区别于其他疾病的基本特征不包括：

- A.每一种传染病都是有特异性病原体引起
- B.病原体从宿主体内排出，经一定途径传染给另一宿主
- C.传染病流行过程在自然和社会因素下，表现出统一特征
- D.人体感染病原体后均能产生针对性的特异性免疫

35. 【答案】C。

36. 肝性脑病最早出现的临床表现是：

- A.昏睡，呼之不应
- B.锥体束征阳性
- C.视物模糊
- D.性格和行为改变

36. 【答案】D。

37. 急性黄疸型肝炎黄疸前期最突出的表现是：

- A.消化道症状
- B.呼吸道症状
- C.全身中毒症状
- D.循环系统症状

37. 【答案】A。

38. 对肝昏迷患者，以下护理措施错误的是：

- A.高蛋白饮食
- B.暂停蛋白质摄入
- C.清除肠内积血
- D.米醋加生理盐水灌肠

38. 【答案】A。

39. 消化道大出血患者，不正确的护理措施是：

- A.安静卧床休息
- B.可进流质或无渣饮食
- C.定时测量脉搏、血压
- D.做好术前常规准备

39. 【答案】B。

40. 上消化道出血特征性表现是：



- A.发热  
B.呕血与黑便  
C.失血性周围循环衰竭  
D.氮质血症

40. 【答案】B。

41. 有利于口服铁剂吸收的维生素是：

- A.维生素 B<sub>12</sub>  
B.维生素 E  
C.维生素 K  
D.维生素 C

41. 【答案】D。

42. 粪便隐血实验呈阳性时，上消化道出血量至少为：

- A.30ml  
B.20ml  
C.10ml  
D.5ml

42. 【答案】D。

43. 急性白血病患者化疗期间，由于大量白血病细胞被杀灭，血液中尿酸浓度明显增高。

一旦发生尿酸性结石时，护理人员可直接观察到的征象是：

- A.肉眼血尿  
B.高度浮肿  
C.少尿或无尿  
D.大量混浊尿

43. 【答案】A。

44. 诊断支气管哮喘持续状态的主要依据是：

- A.哮喘并有严重感染  
B.严重哮喘持续 24h 以上  
C.哮喘伴有低氧血症  
D.哮喘伴有酸中毒

44. 【答案】B。

45. 患者男性，30岁，支气管哮喘病史3年余，近日在给宠物犬洗澡时出现咳嗽、哮喘发作。护士为其进行健康教育时，应指出其可能的过敏原是：

- A.花粉  
B.病毒  
C.动物毛屑  
D.粉尘

45. 【答案】C。

46. 患者男，48岁，上消化道出血，该患者粪便可呈：  
A.脓血样  
B.果酱样  
C.柏油样  
D.米泔水样

46. 【答案】C。

47. 慢性阻塞性肺气肿病人最突出的护理诊断是：  
A.体温升高  
B.清理呼吸道无效  
C.气体交换受损  
D.自理能力缺陷

47. 【答案】C。

48. 胃壁中哪一层有非常丰富的腺体：  
A.浆膜层  
B.肌层  
C.黏膜层  
D.黏膜下层

48. 【答案】C。

49. 林先生，62岁，患慢性阻塞性肺气肿，经治疗后缓解，肺功能逐渐恢复。此时护士为其选择改善肺功能的最佳方法是：  
A.有效咳嗽  
B.机械吸痰  
C.雾化吸入  
D.缩唇、腹式呼吸

49. 【答案】D。

50. 原发性肾病综合征的最主要病理生理改变是：  
A.高胆固醇血症  
B.低蛋白血症

C.全身性水肿

D.大量蛋白尿

50. 【答案】D。

51. 慢性肺源性心脏病患者发病的关键环节是：

A.气管阻塞

B.肺泡膨大

C.右心室肥大

D.肺动脉高压

51. 【答案】D。

52. 患者女性，25岁，面部有蝶形红斑，严重关节疼痛，最近查Hb96g/L。乏力，抗Sm抗体阳性，抗双链DNA抗体阳性，需要首先解决的护理问题是：

A.乏力

B.疼痛

C.皮肤完整性受损

D.有感染的危险

52. 【答案】B。

53. 女性65岁，慢性支气管炎10年，当晚出现呼吸急促，面部紫绀，急诊入院诊断为肺源性心脏病，急测血氧分压6.0kPa，病人精神十分紧张，此时最有效的护理措施是：

A.有针对性的进行心理护理

B.稳定病人情绪

C.调节室内温湿度

D.氧气吸入

53. 【答案】D。

54. 严重的II型呼吸衰竭患者，不能吸入高浓度氧，主要是因为：

A.缺氧不是主要因素

B.可引起氧中毒

C.可诱发代谢性碱中毒

D.抑制了缺氧对外周化学感受器的作用

54. 【答案】D。

55. 慢性呼吸衰竭最早、最突出的临床表现是：

- A. 咳痰
- B. 咳嗽
- C. 发绀
- D. 呼吸困难

55. 【答案】D。

56. 肾病综合征病人最突出的体征是：

- A. 水肿
- B. 低蛋白血症
- C. 大量的蛋白尿
- D. 高脂血症

56. 【答案】A。

57. 镜下血尿指每高倍视野中红细胞至少：

- A. 2 个
- B. 4 个
- C. 7 个
- D. 9 个

57. 【答案】B。

58. 女，19岁，因下肢水肿，尿液有泡沫，体重增加就诊，诊断为肾病综合征。下列诊断标准不包括：

- A. 尿蛋白 $>3.5\text{g/d}$
- B. 高脂血症
- C. 继发性高血压
- D. 水肿

58. 【答案】C。

59. 二尖瓣关闭不全最有意义的体征是：

- A. 心尖部舒张期隆隆样杂音
- B. 心尖部全收缩期吹风样杂音
- C. 第一心音减弱
- D. 二尖瓣型P波

59. 【答案】B。

60. 患者女，35岁，以慢性肾小球肾炎收入院。查体：眼睑及双下肢轻度水肿，血压150/100mmHg。护士应重点关注其：

- A. 皮肤状态
- B. 心理状态
- C. 血压变化
- D. 肾功能

60. 【答案】C。

61. 二尖瓣狭窄患者的面容特征是：

- A. 两颊部蝶形红斑
- B. 午后两颊部潮红
- C. 两颊部环形红斑
- D. 两颊部紫红，口唇轻度紫绀

61. 【答案】D。

62. 上消化道出血患者进行纤维胃镜检查的时间一般是：

- A. 出血后6~8小时
- B. 出血后10~12小时
- C. 出血后12~24小时
- D. 出血后24~48小时

62. 【答案】D。

63. 纤维蛋白性心包炎的主要症状是：

- A. 心悸
- B. 心前区疼痛
- C. 呼吸困难
- D. 声音嘶哑

63. 【答案】B。

64. 患者，男性，50岁。消化性溃疡病史12年，近3个月来上腹痛呈现无规律性，患者表示疼痛减弱或者消失，伴有失眠、体重下降。提示患者其可能发生的原因是：

- A. 过度劳累
- B. 饮酒过度
- C. 癌变
- D. 饮食原因

64. 【答案】C。

65. 急性心肌梗死的特征性心电图改变不包括：

- A.病理性 Q 波
- B.T 波倒置
- C.P-R 间期延长
- D.S-T 段弓背向上抬高

65. 【答案】C。

66. 符合短暂性脑缺血发作的是：

- A.持续时间不超过 3 周
- B.持续时间不超过 1 周
- C.持续时间不超过 2 天
- D.持续时间不超过 24h

66. 【答案】D。

67. 冠心病病人行经皮穿刺冠状动脉腔内成形术治疗，关于其术后护理的描述，不正确的是：

- A.即刻做 12 导联心电图
- B.持续心电监护 24 小时
- C.每小时双下肢进行屈曲和伸直运动
- D.术后鼓励多饮水

67. 【答案】C。

68. 导致上消化道大出血最常见的疾病是：

- A.萎缩性胃炎
- B.胃癌
- C.消化性溃疡
- D.胆道结石

68. 【答案】C。

69. 再生障碍性贫血以骨髓造血细胞增生减低和外周血全血细胞减少为特征，该疾病有引起呼吸道感染的风险，为此采取的预防措施不包括：

- A.保持室内空气清新，物品清洁
- B.严格执行各项无菌操作
- C.病人粒细胞绝对值 $\leq 0.5 \times 10^9/L$ 者，应给予保护性隔离

D.鼓励病人多进行室外活动，尽量到人群聚集的地方

69.【答案】D。

70. 肝硬化病人不宜大量放腹水，因可导致：

A.肝性脑病

B.脱水

C.上消化道出血

D.电解质紊乱

70.【答案】A。

71. 急性白血病出血的主要原因是：

A.弥散性血管内凝血

B.血小板减少

C.血小板功能异常

D.凝血因子减少

71.【答案】B。

72. 急性白血病易发生感染，主要原因是：

A.白血病细胞增多

B.继发性营养不良

C.成熟粒细胞缺乏

D.总白细胞减少

72.【答案】C。

73. 类风湿关节炎病因不明，一般认为有关的因素是：

A.遗传、雌激素、阳光照射等因素

B.感染、潮湿、寒冷及创伤等

C.物理性损伤因素

D.化学性损伤因素

73.【答案】B。

74. 过敏性紫癜中最严重的临床类型是：

A.单纯型

B.腹型

C.关节型

D.肾型

74.【答案】D。

75. 伤寒的主要传播途径是：

- A. 呼吸道传播
- B. 消化道传播
- C. 接触传播
- D. 血液传播

75. 【答案】B。

76. 发生脑出血最常见的血管是：

- A. 椎动脉
- B. 大脑后动脉
- C. 大脑中动脉
- D. 基底动脉

76. 【答案】C。

77. 男，58岁，医生怀疑糖尿病，建议做葡萄糖耐量实验，护士告诉患者口服葡萄糖后需要多次采血，时间安排在口服葡萄糖后：

- A. 即刻、半小时、1小时、2小时
- B. 半小时、1小时、2小时、3小时
- C. 半小时、1小时、2小时、4小时
- D. 1小时、2小时、3小时、4小时

77. 【答案】B。

78. 脑出血急性期治疗的治疗原则是：

- A. 升高血压、止血、控制脑水肿
- B. 控制脑水肿、降颅压、防止再出血
- C. 止血、控制脑水肿、大量补液
- D. 降低血压、止血、消炎治疗

78. 【答案】B。

79. 患者男，70岁，患高血压12年。某日中午，该患者与女儿发生激烈争吵，期间突然倒地昏迷，右侧偏瘫、口眼歪斜。CT下显示高密度阴影，该患者可能出现了：

- A. 脑血栓
- B. 脑栓塞
- C. 癫痫
- D. 脑出血

79. 【答案】D。



80. 小脑病变的步态是：

- A.感觉性共济失调步态
- B.运动性共济失调步态
- C.慌张步态
- D.剪刀步态

80.【答案】B。

## 二、多选题

81. 小肠主要吸收哪些物质：

- A.蛋白质、脂肪
- B.碳水化合物
- C.脂肪、酒精
- D.胆盐和维生素

81.【答案】ABCD。

82. 患者，女，65岁，反复咳嗽，咳脓痰15年，加重伴发热5天。体位引流痰液，正确的操作为：

- A.每天1~3次，每次15~20分钟
- B.根据病变部位选择引流体位
- C.若引流过程中出现头晕、出汗可继续引流
- D.引流可配合拍背、震颤等手法治疗

82.【答案】ABD。

83. 纤维胃镜检查病人的护理正确的是：

- A.检查前禁食8小时，有幽门梗阻者，在检查前2~3天进食流质
- B.术后当天饮食以流质、半流质为宜，行活检的病人应进食温凉饮食
- C.为减少胃蠕动和胃液分泌，术前半小时遵医嘱给予阿托品0.5mg静注
- D.注意观察有无术后出血

83.【答案】ABCD。

84. 急性肺水肿的发病原因包括：

- A.左心衰
- B.心源性哮喘
- C.严重肺部感染
- D.输液速度过快

84. 【答案】ACD。

85. 下列哪些是肝硬化并发症：

- A.上消化道出血
- B.肝性脑病
- C.感染
- D.肾病综合征

85. 【答案】ABC。

86. 急性心梗病人抗凝治疗的禁忌症包括：

- A.血压过高
- B.恶性肿瘤
- C.严重肝肾功能不全
- D.有出血倾向

86. 【答案】ABCD。

87. 引起冠心病胸痛的诱发因素：

- A.过度劳累
- B.情绪激动
- C.吸烟、饮酒
- D.饱餐

87. 【答案】ABCD。

88. 蒋先生，45岁，肝硬化腹水1个月，2日来神志恍惚，答非所问，行为反常，呼吸有异味，正确的护理措施是：

- A.安排病人半卧位休息
- B.建议使用镇静剂
- C.暂时禁食蛋白质
- D.给高渗葡萄糖静滴

88. 【答案】ACD。

89. 下列关于慢性粒细胞白血病病人护理措施正确的是：

- A.采取左侧卧位

- B.化疗期间每天饮水量 1000~2000ml
- C.使用白消安时要监测骨髓象
- D.使用靛玉红时要观察患者粪便性质

89. 【答案】ACD。

90. 肝性脑病的常见诱因是：

- A.低钾血症
- B.上消化道出血
- C.便秘
- D.感染

90. 【答案】ABCD。

91. 在给一位心力衰竭的病人进行体检时发现,当你在右肋弓下进行肝脏触诊时颈静脉充盈更加明显,这表明此病人可能有：

- A.慢性左心衰竭
- B.慢性右心衰竭
- C.慢性全心衰竭
- D.急性左心衰竭

91. 【答案】BC。

92. 患者刘女士,45岁,患肝硬化6年,今日突然呕血约1000ml,现出现烦躁不安,言语不清,睡眠倒错,有扑翼样震颤,脑电图异常。对该患者护理措施正确的是：

- A.低热量饮食
- B.三腔二囊管压迫止血
- C.清除肠内积血
- D.经胃管冲洗胃腔,以清除积血

92. 【答案】BCD。

93. 急性白血病临床表现,正确的是：

- A.起病急骤,突发高热和明显出血倾向
- B.可有发热、贫血、出血三种症状
- C.有白细胞浸润表现,如肝、脾、淋巴结肿大等

D.多无胸骨下端及四肢骨骼疼痛

93.【答案】ABC。

94. 下列与慢性支气管炎发病有关的因素是：

A.吸烟

B.空气污染

C.呼吸道反复发生病毒及细菌感染

D.老年人免疫功能减退

94.【答案】ABCD。

95. 下列关于肺炎球菌肺炎的叙述正确的是：

A.居医院获得性肺炎的首位

B.居社区获得性肺炎的首位

C.应首选红霉素

D.应首选青霉素

95.【答案】BD。

96. 下列哪种情况不宜行体位引流：

A.大咯血

B.明显呼吸困难、发绀

C.严重心血管疾病

D.呼吸衰竭

96.【答案】ABCD。

97. 发生直立性低血压的药物有：

A.酚妥拉明

B.哌唑嗪

C.氢氯噻嗪

D.硝普钠

97.【答案】ABD。

98. 输液出现急性肺水肿时应采取哪些护理措施：

A.立即减慢输液速度

B.立即静脉放血 500~1000ml

C.患者取端坐位，两腿下垂

D.给予镇静剂及强心、利尿药物

98.【答案】CD。

99. 患者，男，70岁，1d来心前区疼痛持续6h不缓解，精神烦躁，恶心、呕吐1次，急送医院。测BP130/90mmHg，心电图示ST段弓背向上抬高，出现病理性Q波，确诊为急性心肌梗死。护士对患者情况进行评估后，认为主要的护理问题是：

- A.潜在并发症：室速、室颤  
B.组织灌注量异常  
C.气体交换受损  
D.疼痛

99.【答案】AD。

100. 女性，32岁，酒后突然尖叫，跌倒在地两眼上翻，牙关紧闭，口吐泡沫，不断抽搐，护理正确的是：

- A.防止外伤  
B.按压抽搐肢体  
C.解松衣领，保持呼吸道畅通  
D.酒精湿化吸氧

100.【答案】AC。

### 三、判断题

101. 慢性呼吸衰竭最常见的病因是慢性阻塞性肺疾病。

101.【答案】√。

102. 细菌性肺炎是最常见的肺炎。

102.【答案】√。

103. 抢救急性肺水肿给患者吸氧时，常在湿化瓶中加入20%~30%的酒精以降低肺泡表面张力。

103.【答案】×。

104. 消化性溃疡的最主要病因是精神紧张。

104.【答案】×。

105. 心包穿刺抽液时第一次抽液不超过 500ml。

105.【答案】×。

106. 心绞痛是主动脉供血不足，心肌暂时缺血缺氧所引起的临床症候群。

106.【答案】×。

107. 三腔二囊管压迫止血时，先向食管气囊注气，再向胃气囊注气。

107.【答案】×。

108. 急性肾小球肾炎是由链球菌感染后引起的自身免疫性疾病。

108.【答案】√。

109. 窦性心动过缓可选用药物治疗或者心脏起搏治疗。

109.【答案】√。

110. 由慢性再障演变成的急性型再障又称为非重型再障。

110.【答案】×。

**四、案例分析题（请仔细阅读下面的给定材料，根据所提供的信息，回答 111 至 120 题。题中的选项至少有一项是符合题意的，请找出恰当的选项）**

王先生，60 岁，因呕血 4 小时来诊，门诊以急性上消化道大出血收入院。患者 7 年前诊断为慢性肝炎，5 年前诊断为肝硬化，3 个月前因呕血、腹水于当地医院住院治疗。查体：面色苍白，四肢冰冷。体温 36.7℃，呼吸 22 次/分，脉搏 120 次/分，血压 75/60mmHg。血常规检查：白细胞  $3.0 \times 10^9/L$ ，血小板  $80 \times 10^9/L$ ，血红蛋白 70g/L，超声检查：脾大。

根据以上材料，回答下列问题：

111. 上消化道出血的概念是：

- A. 屈氏韧带以上的消化道出血  
B. 食管和胃的出血  
C. 胃和十二指肠的出血  
D. 胰胆病和胃空肠吻合术后空肠出血

111. 【答案】 A。

112. 急性上消化道大出血一般是指：

- A. 数小时内失血量超过 500ml  
B. 数小时内失血量超过 800ml  
C. 数小时内失血量超过 1000ml  
D. 数小时内失血量超过循环血量的 20%

112. 【答案】 CD。

113. 家属咨询护士该患者的诊断是什么？ 正确回答包括：

- A. 肝炎后肝硬化失代偿期  
B. 急性上消化道大出血  
C. 门静脉高压症  
D. 急性贫血，失血性休克

113. 【答案】 ABCD。

114. 遵医嘱进行快速补液、输血，静脉点滴奥曲肽、垂体加压素等治疗，密切观察病情。

下列选项中提示出血继续或再次出血的是：

- A. 反复呕血，呕血呈鲜红色，周围静脉瘪陷加重  
B. 经充分补液、输血休克改善不明显，血压和 CVP 不稳定  
C. 黑粪次数减少，大便变稠，呈柏油样  
D. 贫血加重，肿大的脾脏出血后有缩小，经治疗后未恢复

114. 【答案】 ABD。

115. 患者出现腹水现象，护士正确护理措施有：

- A. 每天记录出入液量

- B.安置患者卧床休息，大量腹水时可取半卧位
- C.限制食盐摄入，切实控制钠和水的摄入量
- D.定期测量腹围和体重

115.【答案】ABCD。

张某，女，27岁。原因不明地反复皮肤紫癜伴月经量明显增多半年，症状加剧4天，门诊以“ITP”收住入院。身体评估：体温36.8℃，脉搏100次/分，呼吸22次/分，血压100/60mmHg；神志清，精神较弱，中度贫血貌；全身皮肤可见散在、大小不一的紫癜、瘀斑，以四肢为甚。全身浅表淋巴结未及，胸骨无压痛，肝脾肋下未及。血象：红细胞 $2.8 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白85g/L，白细胞 $5.0 \times 10^9/L$ ，血小板 $1.6 \times 10^9/L$ 。

根据以上材料，回答下列问题：

116. 本病的相关因素有：

- A.感染
- B.免疫因素
- C.肝、脾与骨髓因素
- D.雌激素

116.【答案】ABCD。

117. 治疗该病的首选药物是：

- A.抗生素
- B.糖皮质激素
- C.雄激素
- D.环孢素

117.【答案】B。

118. 患者目前首优的护理诊断是：

- A.有感染的危险 与免疫抑制剂治疗有关
- B.恐惧 与对疾病不了解有关
- C.潜在并发症：颅内出血
- D.活动无耐力 与贫血导致机体组织缺氧有关



118. 【答案】C。

119. 入院后告知患者禁用的药物是：

- |       |        |
|-------|--------|
| A.泼尼松 | B.阿司匹林 |
| C.红霉素 | D.阿莫西林 |

119. 【答案】B。

120. 关于该患者的护理措施正确的是：

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| A.按医嘱、按时、按剂量、按疗程用药 | B.饭后服药     |
| C.定期复查血象           | D.自我监测粪便颜色 |

120. 【答案】ABCD。

## 外科护理学专项训练

### 一、单选题

1. 成年男性体内体液的含量约为体重的：

- |       |       |
|-------|-------|
| A.50% | B.60% |
| C.70% | D.80% |

1. 【答案】B。

2. 下列关于腹股沟疝的叙述，说法错误的是：

- A.直疝三角又称海氏三角
- B.直疝外侧边是腹壁下动脉
- C.疝一旦嵌顿，多数病人症状会逐渐缓解
- D.嵌顿性疝肿块紧张发硬，且有明显触痛

2. 【答案】C。

3. 患者男，50岁，反复呕吐4日，尿少，四肢厥冷，查体：BP70/40mmHg，血钠125mmol/L，血清K<sup>+</sup>3.4mmol/L。诊断为低渗性脱水，对该患者的治疗首先是：

- A.补钾
- B.给予升压药
- C.扩充血容量
- D.纠正酸中毒

3.【答案】C。

4. 低钾血症最早的表现是：

- A.呕吐
- B.心律失常
- C.多尿
- D.肌无力

4.【答案】D。

5. 以下不属于肛瘘病人临床特点的是：

- A.呈红色乳头状突起外口
- B.肛门瘙痒
- C.排便后肛门剧烈疼痛
- D.肛周外口时有少量分泌物排出

5.【答案】C。

6. 急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是：

- A.胆总管结石
- B.胆总管末端狭窄
- C.胆道出血继发感染
- D.胆总管癌

6.【答案】A。

7. 患者，男性，25岁，外伤后出现肘部关节肿胀，可以帮助鉴别肱骨髁上骨折和肘关节脱位的表现是：

- A.手臂功能障碍
- B.肘部剧烈疼痛
- C.是否触摸到尺骨鹰嘴
- D.肘后三角关系失常

7.【答案】D。

8. 最常见的疝内容物是：

- A.大网膜
- B.膀胱
- C.小肠
- D.乙状结肠

8.【答案】C。

9. 男性，40岁，阑尾穿孔腹膜炎术后第7天，体温39℃，伤口无红肿，大便次数增多，混有粘液，伴有里急后重，应考虑并发：

- A.盆腔脓肿
- B.膈下脓肿
- C.伤口感染
- D.肠炎

9.【答案】A。

10. 对休克患者进行生命体征检测时，\_\_\_\_\_是最常用的检测指标。

- A.脉搏
- B.血压
- C.呼吸
- D.体温

10.【答案】B。

11. 患者，女性，68岁，转移性右下腹疼痛16小时，无恶心呕吐。查体：体温38.5℃，无腹肌紧张，右下腹压痛、反跳痛不明显，结肠充气试验(+)，血常规：白细胞 $8.7 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞84%，尿常规正常，该患者首选的治疗方法是：

- A.局部理疗
- B.禁食、置胃管
- C.手术
- D.应用抗生素

11.【答案】C。

12. 患者，男性，30岁，急性阑尾炎。查体时医生嘱其取左侧卧位，然后使其右下肢向后过伸，引起右下腹疼痛，此检查称为：

- A.腰大肌试验
- B.闭孔内肌试验

C.结肠充气试验

D.波氏试验

12. 【答案】A。

13. 患者，女性，45岁，做下肢静脉瓣膜功能试验，先平卧，抬高患肢，待曲张静脉血液排空后，在大腿根部扎止血带，然后，让患者站立，如在30秒钟内静脉迅速充盈，提示：

A.交通支瓣膜功能不全

B.深静脉瓣膜功能不全

C.小隐静脉瓣膜功能不全

D.大隐静脉瓣膜功能不全

13. 【答案】D。

14. 人工肛门的护理方法正确的是：

A.禁忌扩张造口

B.定时结肠灌洗，训练排便习惯

C.造口袋内排泄物超过3/4时应更换造口袋

D.肛袋宜长期使用，少更换

14. 【答案】B。

15. 胆道蛔虫病的腹痛特点是：

A.上腹部刀割样剧痛

B.剑突下阵发性“钻顶样”绞痛

C.右下腹持续性胀痛

D.右上腹持续性疼痛

15. 【答案】B。

16. 腹股沟直疝和斜疝的共同点是：

A.都不易嵌顿

B.都应手术治疗

C.疝环都位于腹壁下动脉内侧

D.疝囊均通过腹股沟管

16. 【答案】B。

17. 患者男，56岁，肠梗阻4天入院，血压60/30mmHg，血清钠119mmol/L，血清钾3mmol/L，动脉血pH7.32。治疗时首先考虑：

- A.纠正酸中毒
- B.给予升压药
- C.补充血容量
- D.急诊手术

17.【答案】C。

18. 患者中年女性，因阑尾炎切除术后3天，肠蠕动仍未恢复，为减轻腹胀，最简单、最有效的措施是：

- A.腹部热敷
- B.胃肠减压
- C.鼓励下床活动
- D.腹部环形按摩

18.【答案】C。

19. 肠梗阻患者解除肠道梗阻最重要的方法是：

- A.解痉止痛
- B.胃肠减压
- C.应用抗生素
- D.纠正体液失调

19.【答案】B。

20. 深静脉血栓好发的肢体是：

- A.右上肢
- B.左下肢
- C.右下肢
- D.左上肢

20.【答案】B。

21. 手术后常见的并发症不包括：

- A.出血
- B.感染
- C.切口裂开
- D.疼痛

21.【答案】D。

22. 术后早期出现恶心、呕吐的最常见原因：

- A.低钾血症
- B.颅内压增高
- C.尿毒症
- D.麻醉反应

22. 【答案】D。

23. 医院以下区域中，属于III类环境的是：

- A.普通手术室
- B.产房
- C.妇产科检查室
- D.婴儿室

23. 【答案】C。

24. 器械护士和巡回护士共同的工作职责是：

- A.保持手术器械和用物整洁
- B.安置体位
- C.清点核对用物
- D.留取标本

24. 【答案】C。

25. 下列疾病不是肠内营养禁忌证的是：

- A.肠道梗阻
- B.肠道有活动性出血
- C.肠道炎症
- D.口腔手术

25. 【答案】D。

26. 女性患者，20岁，因车祸就诊，就诊时测血压60/30mmHg，脉搏120次/分，患者烦躁不安，皮肤苍白，四肢湿冷，此时应立即予以静脉输液，液体首先：

- A.生理盐水
- B.5%葡萄糖溶液
- C.平衡盐溶液
- D.5%碳酸氢钠溶液

26. 【答案】C。

27. 对高渗性脱水病人进行输液治疗时，应首先输入的液体是：

- A.0.9%生理盐水  
B.5%GS 溶液  
C.平衡液  
D.右旋糖酐

27.【答案】B。

28. 肠外营养周围静脉输注一般不超过：

- A.2 周  
B.1 周  
C.2 天  
D.3 天

28.【答案】A。

29. 面部危险三角区的部位指的是：

- A.鼻和两侧口角间  
B.口周围  
C.双眼和鼻部  
D.前额和双眼

29.【答案】A。

30. 急性阑尾炎的转归，下列哪项除外：

- A.炎症消退  
B.炎症局限  
C.炎症加重  
D.炎症扩散

30.【答案】C。

31. 孙某在近7天排便时常发现肛门无故滴血，未在意，5天后排便时发现痔块从肛门脱出，排便后可自行回纳，入院医生诊断为内痔，根据症状判断属于：

- A.I 度内痔  
B.II 度内痔  
C.III 度内痔  
D.IV 度内痔

31.【答案】B。

32. 肾挫裂伤患者早期活动最易发生：

- A.感染  
B.出血

C.疼痛

D.发热

32. 【答案】B。

33. 男，47岁，4年来大便习惯改变，伴黏液血便，直肠检查：肛门6cm处有一环形肿块，质硬，确诊为直肠癌，行直肠癌切术后第1天，护理不正确的是：

A.定时测血压、脉搏、呼吸

B.禁食、禁饮

C.病情平稳后改半卧位

D.定时少量、保留灌肠

33. 【答案】D。

34. 成人麻醉前禁食、禁饮的时间是：

A.4小时内禁食、2小时内禁饮

B.6小时内禁食、3小时内禁饮

C.8小时内禁食、6小时内禁饮

D.12小时内禁食、4小时内禁饮

34. 【答案】D。

35. 脐疝的疝环是：

A.脐环

B.腹股沟管

C.阴囊

D.外环

35. 【答案】A。

36. 肝总管探查，T型管引流术后拔管的时间通常是：

A.术后5天

B.术后7天

C.术后10天

D.术后2周

36. 【答案】D。

37. 直肠癌最主要的转移途径为：

A.直接蔓延

B.腹腔种植转移

C.血运转移

D.淋巴转移



37. 【答案】D。

38. 患者男性，35岁，右下腹突发性绞痛，右肾区酸胀，恶心、呕吐，伴肉眼血尿，诊断为肾结石，关于保守排石的陈述不正确的是：
- A.积极应用止痛剂镇痛  
B.每日饮水量 1000ml 左右  
C.加强运动，适当减少蛋白质摄入  
D.必要时使用抗生素

38. 【答案】B。

39. 肛袋护理的错误做法是：
- A.备 2 只交替使用  
B.袋内放少量活性炭  
C.使用后洗净、消毒  
D.嘱病人长期持续使用

39. 【答案】D。

40. 关于腹股沟直疝的叙述不正确的是：
- A.容易嵌顿  
B.多见于老年男性，常双侧发生  
C.疝块呈半球形  
D.绝大多数为后天性

40. 【答案】A。

41. 大面积烧伤患者 24 小时内主要的护理措施是：
- A.镇静止痛  
B.心理护理  
C.预防感染  
D.保证液体输入

41. 【答案】D。

42. 浅Ⅱ度烧伤的深度是：
- A.伤至表皮的生发层与真皮浅层  
B.伤至真皮深层  
C.伤至皮肤生发层  
D.伤至皮下组织浅层

42. 【答案】A。

43. 关节脱位的特有表现是：

- A.疼痛
- B.肿胀
- C.异常活动
- D.弹性固定

43. 【答案】D。

44. 针对痔的治疗，下列说法不正确的是：

- A.无症状痔无需治疗
- B.有症状的痔旨在减轻及消除症状
- C.首选保守治疗
- D.有症状的痔应积极手术治疗

44. 【答案】D。

45. 下列休克的治疗原则，应除外：

- A.尽早去除休克的病因
- B.尽快恢复有效血容量
- C.改善心功能
- D.及时应用血管收缩剂

45. 【答案】D。

46. 有机磷农药中毒的机制是：

- A.血氧运输障碍
- B.体温调节异常
- C.激活胆碱酯酶
- D.抑制胆碱酯酶

46. 【答案】D。

47. 治疗代谢性酸中毒的首要药物是：

- A.乳酸钠
- B.葡萄糖酸钙
- C.碳酸氢钠
- D.生理盐水

47. 【答案】C。

48. 休克时应用血管扩张药必须：

- A.与血管收缩药交替使用  
B.舒张压不低于 8kPa (60mmHg)  
C.心功能正常  
D.血容量充足

48. 【答案】D。

49. 患者女性，30岁，从事园林工作，给果树喷药时不慎将农药污染衣服，农药会通过接触皮肤黏膜吸收而发生中毒。嘱中毒者立即：

- A.现场抢救  
B.脱离现场、脱去污染衣服  
C.肥皂水清洗皮肤  
D.用热水擦洗皮肤

49. 【答案】B。

50. 一氧化碳中度中毒的典型体征是：

- A.四肢无力  
B.意识模糊  
C.口唇樱桃红色  
D.血压下降

50. 【答案】C。

51. 导致血栓闭塞性脉管炎发生的最重要因素是：

- A.吸烟  
B.寒冷的工作环境  
C.自身免疫功能紊乱  
D.前列腺素失调

51. 【答案】A。

52. 患者，女性，48岁。胆石症多年，2天前因急性腹痛、寒战、高热、黄疸门诊治疗，无好转，现神志不清，血压 10/6.7kPa (75/50mmHg)，应考虑为：

- A.急性胆管炎  
B.急性梗阻性化脓性胆管炎  
C.暴发性肝炎  
D.肝总管结石

52. 【答案】B。

53. 患者，女性，50岁，行直肠癌根治术后，护士针对造口周围皮肤的健康宣教不正确的是：

- A. 清洁后涂抹氧化锌软膏
- B. 以凡士林纱布覆盖外翻的肠黏膜
- C. 及时清洁皮肤
- D. 常规使用乙醇清洁

53. 【答案】D。

54. 男，56岁，腹痛2天。检查：腹膜刺激征明显，呼吸深而快，神志恍惚，血压下降，血  $\text{HCO}_3^-$   $7\text{mmol/L}$ ，诊断可能是：

- A. 呼吸性碱中毒
- B. 呼吸性酸中毒
- C. 中度代谢性酸中毒
- D. 重度代谢性酸中毒

54. 【答案】D。

55. 麻醉未清醒的病人，因腺体分泌物增多，为防窒息，应准备：

- A. 张口器
- B. 舌钳
- C. 治疗碗
- D. 吸痰器

55. 【答案】D。

56. 颈椎病最常见的类型为：

- A. 神经根型颈椎病
- B. 脊髓颈椎病
- C. 交感神经颈椎病
- D. 椎动脉型颈椎病

56. 【答案】A。

57. 胰头癌最主要的临床表现是：

- A. 呃逆
- B. 进行性黄疸
- C. 恶心呕吐
- D. 乏力消瘦

57. 【答案】B。

58. 哪一种疝易发生嵌顿与绞窄:

- A.腹股沟斜疝
- B.直疝
- C.股疝
- D.脐疝

58. 【答案】C。

59. 患者，女性，56岁，胰腺癌术后第一天，表情痛苦，心率加快，血压升高，多次询问后患者诉伤口疼痛严重。此时应首先给予的措施是:

- A.鼓励患者忍受疼痛
- B.立即给予止痛药
- C.给予止痛指导
- D.继续观察

59. 【答案】B。

60. 疝内容物被嵌顿时间较久，发生血液循环障碍而坏死称为:

- A.难复性疝
- B.嵌顿性疝
- C.绞窄性疝
- D.易复性疝

60. 【答案】C。

61. 库欣（Cushing）反应的表现:

- A.血压升高，脉搏慢，呼吸慢
- B.颅内压升高，脉搏慢，心率慢
- C.体温升高，脉搏慢，呼吸慢
- D.血压升高，反应慢，呼吸慢

61. 【答案】A。

62. 处理破伤风的伤口时，下列哪项是错误的:

- A.彻底清创
- B.清除坏死组织和异物
- C.反复氧化剂冲洗伤口
- D.伤口应尽量予以缝合

62. 【答案】D。

63. 颅脑外伤颅内压增高的病人宜取:

- A.头高足低位  
B.仰卧位  
C.平卧位  
D.半卧位

63.【答案】A。

64. 患者女，24岁，因大面积烧伤入院，营养输注方法为经中心静脉输入，有关此中心静脉营养管道说法正确的是：

- A.可经此管道输血  
B.可经此管道抽血  
C.可经此导管测量中心静脉压  
D.每周更换一次敷料

64.【答案】D。

65. 患者，女性，27岁，因外伤导致头皮裂伤。处理方式为清创术，护士向患者解释行清创术的时间可延长到：

- A.10小时  
B.12小时  
C.18小时  
D.24小时

65.【答案】B。

66. 张女士，50岁，因头部受伤后1小时入院，诊断为脑挫裂伤，查体：神志不清，口鼻腔出血且分泌物多，口唇发绀，呼吸困难。患者目前的首要护理诊断是：

- A.清理呼吸道无效  
B.低效性呼吸型态  
C.体温过高  
D.有受伤的危险

66.【答案】A。

67. B超检查胆囊前多久应常规禁食水：

- A.3h  
B.4h  
C.6h  
D.8h

67.【答案】D。

68. 女，26岁，从二楼上掉下，后枕部着地，有意识障碍约20分钟并有呕吐，清醒后有逆行性遗忘。此病人可能的情况是：

- A.脑裂伤
- B.脑震荡
- C.硬膜下血肿
- D.颅内血肿

68.【答案】B。

69. 尿路感染是指：

- A.肾盂、肾小管、输尿管、膀胱的炎症
- B.肾盂、输尿管、膀胱、尿道的炎症
- C.肾盂、肾盏、输尿管、膀胱、尿道的炎症
- D.肾盂、肾盏、肾小管、输尿管的炎症

69.【答案】C。

70. 患者，男性，65岁，颅内压升高，医嘱给予输注20%甘露醇250ml，输注时间至多：

- A.10分钟
- B.30分钟
- C.60分钟
- D.90分钟

70.【答案】B。

71. 患者，男性，41岁，右上腹疼痛2天。查体：体温40℃，皮肤、巩膜黄染；B超示胆总管结石。为警惕发生重症胆管炎，护士应重点观察的内容是：

- A.体温、脉搏
- B.腹膜刺激征
- C.恶心、呕吐
- D.血压、神志

71.【答案】D。

72. 男性患者，股骨干骨折行持续牵引，错误的是：

- A.抬高床头 15~30cm  
B.每天用酒精滴牵引针孔  
C.保持有效的牵引作用  
D.定时测量肢体长度

72. 【答案】A。

73. 关于关节脱位的说法，正确的是：

- A.多见青壮年和儿童  
B.以膝关节最常见  
C.以腕关节最常见  
D.以髌关节最常见

73. 【答案】A。

74. 绞窄性疝的处理原则主要是：

- A.手术治疗  
B.手法复位  
C.镇静止痛  
D.不做治疗

74. 【答案】A。

75. 男，全身烧伤 59%。其中 I 度烧伤 10%，无 III 度烧伤，抗休克补液额外丧失量胶体与电解质的比例应是：

- A.2 : 1  
B.1 : 2  
C.1 : 1  
D.3 : 1

75. 【答案】B。

76. 在腹外疝发病的诸多因素中，最重要的因素是：

- A.妊娠  
B.举重  
C.腹壁强度降低  
D.慢性咳嗽

76. 【答案】C。

77. 下列关节脱位的治疗，不正确的是：

- A.早期手法复位  
B.手法复位失败者采用手术复位



C.复位后石膏固定为 6~8 周

D.早期活动患部周围肌肉

77. 【答案】C。

78. 急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压的主要目的是：

A.防止感染蔓延

B.减少胃酸分泌

C.减少胰液分泌

D.减轻腹痛

78. 【答案】C。

79. 因腰椎间盘突出症接受椎间盘摘除术，手术后 1 周护士指导其进行直腿抬高练习，目的是为了预防：

A.神经根粘连

B.血肿形成

C.骨质疏松

D.伤口感染

79. 【答案】A。

80. 患者，男性，55 岁，患右侧腹股沟斜疝，1 小时前背重物时疝块突然增大、不能回纳，疝块紧张发硬伴疼痛和压痛。考虑其可能是：

A.易复性疝

B.难复性疝

C.绞窄性疝

D.嵌顿性疝

80. 【答案】D。

## 二、多选题

81. 移植按供、受体种系和基因关系可分为：

A.同种异体移植

B.同系移植

C.异种移植

D.结构移植

81. 【答案】ABC。

82. 关于乳房检查，下列哪些是对的：

- A. 两侧乳房对比检查
- B. 先查患侧，后查健侧
- C. 触诊时采用手指掌面
- D. 不要用手指握乳房组织

82. 【答案】ACD。

83. 下列哪项符合晚期食管癌的临床表现：

- A. 声音嘶哑
- B. 进食时呛咳
- C. 胸骨后烧灼感
- D. 持续胸背痛

83. 【答案】ABD。

84. 肺结核行肺切除术的常见并发症有：

- A. 支气管胸膜瘘
- B. 顽固性含气残腔
- C. 脓胸
- D. 结核播散

84. 【答案】ABCD。

85. 胸外伤病人发生休克的原因有：

- A. 肋骨骨折
- B. 血胸
- C. 气胸
- D. 立即清创

85. 【答案】ABC。

86. 下列哪些因素与大肠癌的发生有密切关系：

- A. 家族史
- B. 高脂肪饮食
- C. 大肠息肉
- D. 溃疡性结肠炎

86. 【答案】ABCD。

87. 急性阑尾炎是最常见的外科急腹症之一，下列属于其症状的是：

- A. 腹痛
- B. 早期有轻度厌食、恶心或呕吐

- C.早期有乏力  
D.炎症重时出现中毒症状

87.【答案】ABCD。

88. 患者肛周脓肿术后 20 小时，发生尿潴留，护理措施中正确的是：

- A.听流水声  
B.导尿  
C.热敷膀胱部位  
D.扶患者至卫生间排尿

88.【答案】ABC。

89. 可以用于胆石症患者镇痛的药物有：

- A.阿托品  
B.解热镇痛药  
C.吗啡  
D.山莨菪碱

89.【答案】ABD。

90. 下列腹股沟疝的术后主要护理措施正确的有：

- A.预防便秘  
B.术后应用丁字带将阴囊托起  
C.伤口不可加压，以利于血液循环  
D.血压平稳后半卧位

90.【答案】ABD。

91. 烧伤的严重程度的判断标准是：

- A.烧伤的总面积  
B.烧伤的深度  
C.烧伤的温度  
D.烧伤的颜色

91.【答案】AB。

92. 患者双下肢长时间受重物挤压，导致肌肉组织缺血性坏死，可继发：

- A.急性肾衰竭  
B.急性肝衰竭  
C.高血钾  
D.高血钙

92.【答案】AC。

93. 电凝止血的优点有:

- A.止血迅速
- B.减少切口内线结
- C.适用于较大血管出血
- D.用于不易结扎的渗血

93.【答案】ABD。

94. 关于脑损伤患者的护理,下列哪些叙述是正确的:

- A.必须对患者行动及病情观察,以鉴别原发性和继发性脑损伤
- B.Glasgow 昏迷评分法主要是评定睁眼、语言和肢体运动反应
- C.伤后一侧瞳孔进行性散大、对侧肢体瘫痪、意识障碍,提示原发性脑干损伤
- D.伤后立即出现一侧肢体运动障碍且相对稳定,多系对侧大脑皮层运动区损伤所致

94.【答案】ABD。

95. 乳腺癌病人术后进行功能锻炼的方法错误的是:

- A.术后第 2~3 天活动手部
- B.术后第 3~5 天活动肘部
- C.术后第 5 天进行肩关节活动
- D.术后第 10 天进行上肢外展活动

95.【答案】ABD。

96. 前列腺切除术后正确的护理措施是:

- A.采用肛管排气,避免腹胀
- B.术后平卧 2d 后改半卧位
- C.禁止灌肠
- D.生理盐水持续膀胱冲洗

96.【答案】BCD。

97. 患者男,45岁,诊断为腰椎间盘突出症,行手术治疗后,病人宜早期进行功能锻炼,下列对该患者的功能锻炼的指导说法正确的是:

- A.卧床期间坚持定时活动四肢关节
- B.术后第 1 日开始进行直腿抬高锻炼

C.术后第7日开始进行腰背肌锻炼

D.术后第10日开始进行下床活动

97.【答案】ABC。

98. 手术中的无菌操作是预防感染、保护病人安全的关键，下列有关手术室无菌操作技术的说法正确的是：

A.1份无菌物品可供2个病人使用

B.传递手术用品时，应由器械护士从器械升降台侧正面方向递给

C.每个手术间参观人数不超过3人

D.手术因故暂停时，切口应用无菌巾覆盖

98.【答案】BD。

99. 肠梗阻病人施行胃肠减压的目的在于：

A.改善肠道内血液供应

B.减轻腹胀

C.改善呼吸状况

D.减轻肠壁水肿

99.【答案】ABCD。

100. 易造成桡神经损伤的骨折是：

A.桡骨骨折

B.肱骨干骨折

C.肱骨髁上骨折

D.尺骨骨折

100.【答案】BC。

### 三、判断题

101. 急性阑尾炎的最常见最重要体征为结肠充气试验阳性。

101.【答案】×。

102. 休克病人扩容首选平衡盐液，既能补充血容量，也有利于恢复组织间液。

102.【答案】√。

103. 骶髂关节是强直性脊柱炎患者最早受累关节之一。

103.【答案】√。

104. 男性，18岁，颈部蜂窝织炎入院，病人颈部肿胀明显。护理过程中应特别注意观察的是体温。

104.【答案】×。

105. 颅中窝骨折病人可以出现嗅觉减退。

105.【答案】×。

106. 腰椎间盘突出好发于腰3~腰5及腰5~骶1，是因为该部位肌肉松弛。

106.【答案】×。

107. 一级预防又称临床前预防，即在疾病的临床前期做好早期发现、早期诊断、早期治疗。

107.【答案】×。

108. 高钾血症病人应用钙剂的作用是防止低钙。

108.【答案】×。

109. 眼部手术的皮肤备皮范围为上自前额发际，下至鼻孔，剃眉毛，无需剪睫毛。

109.【答案】×。

110. 大肠癌分型中最常见的是隆起性，肿瘤沿肠壁各层呈浸润生长，局部肠壁增厚，表面粘膜褶皱增粗、不规则或消失变平。

110. 【答案】×。

**四、案例分析题（请仔细阅读下面的给定材料，根据所提供的信息，回答 111 至 120 题，题目中的选项至少有一项是符合题意的，请找出恰当的选项）**

患者，男，75 岁，半年前出现进硬食物时胸骨后不适，有硬噎感，偶有针刺样疼痛，一般饮水后缓解，近 3 个月出现进行性吞咽困难，干硬食物难以下咽，进而只能进食软质、半流质食物，就诊入院后进行内镜检查，发现食管周静胸段有 5.5cm 的管腔狭窄，黏膜溃烂。诊断：中胸段食管癌“溃疡浸润型”。入院后拟择期行食管-胃吻合术。入院后护士评估患者时，了解到患者有吸烟史 50 年，现每天仍吸烟 15~20 支，偶有饮酒，既往无糖尿病、冠心病、高血压病史。

根据以上材料，回答下列问题：

111. 食管癌的典型症状是：

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| A. 进食时哽噎感、胸骨后摩擦样疼痛 | B. 进行性吞咽困难  |
| C. 持续性胸背疼痛         | D. 贫血、低蛋白血症 |

111. 【答案】B。

112. 护士为患者行术前准备，不包括：

- |               |               |
|---------------|---------------|
| A. 术前 3 天每晚洗胃 | B. 肠道准备       |
| C. 放置胃管       | D. 练习深呼吸、有效咳嗽 |

112. 【答案】A。

113. 食管癌术后发生吻合口瘘，其中与解剖结构有关的因素是因为食管缺乏：

- |         |        |
|---------|--------|
| A. 黏膜下层 | B. 黏膜层 |
| C. 外膜层  | D. 浆膜层 |

113. 【答案】D。

114. 食管癌放疗后常出现:

- A.食管黏膜水肿
- B.吞咽困难
- C.放射性口腔炎
- D.食欲不振

114.【答案】ABD。

115. 手术治疗是治疗食管癌的首选方法,为防止食管癌术后病人发生呼吸困难、肺不张等,应采取护理措施不包括:

- A.密切观察呼吸型态、频率和节律,听诊双肺呼吸音是否清晰
- B.气管插管者,及时吸痰,保持气道通畅
- C.术后第一日禁止病人做深呼吸动作
- D.痰多、咳痰无力的病人若出现呼吸浅快、发绀等现象时,立即行鼻导管深部吸痰

115.【答案】C。

患者李某,男,40岁,长途运输司机。因左侧腰痛一个月,加重伴左侧腿部疼痛、无力3d入院。患者一个月前出现左侧腰痛,自贴伤风止痛膏未见好转,3d前弯腰拾重物时感腰痛加重,背不能伸直,伴左腿疼痛、无力。既往体健,开车20年,有烟酒嗜好。家中无类似病史。体检:L<sub>4</sub>~L<sub>5</sub>左侧压痛并有放射痛,左腿肌力下降,左腿直腿抬高试验45°(+)。X线正位片示腰椎轻度侧弯,侧位片示腰椎生理前凸消失,L<sub>4</sub>~L<sub>5</sub>间隙狭窄。

根据以上材料,回答下列问题:

116. 该患者考虑为何种疾病:

- A.腰肌劳损
- B.颈椎病
- C.腰椎间盘突出症
- D.脊柱结核

116.【答案】C。

117. 该患者发病相关的因素有:



- A. 椎间盘退行性变  
B. 长期震动  
C. 过度负荷  
D. 吸烟

117. 【答案】 ABD。

118. 当前患者最主要的护理问题是：

- A. 疼痛  
B. 躯体活动障碍  
C. 潜在并发症：神经根粘连  
D. 知识缺乏

118. 【答案】 A。

119. 针对该患者的护理措施，正确的有：

- A. 大多数病人可经非手术治愈  
B. 合并腰椎管狭窄症的患者，应行手术治疗  
C. 保守治疗期间，患者卧硬板床，床头抬高 40°  
D. 患者术后 2 小时可进行轴位翻身

119. 【答案】 ABD。

120. 针对该病的健康教育，说法错误的是：

- A. 坐位时，尽量使膝与髌保持同一水平  
B. 行走时利用腹肌收缩支持腰部  
C. 搬运重物时，宁拉勿推  
D. 搬台重物时，弯曲下蹲髌膝，伸直腰背，用力抬起重物后再行走

120. 【答案】 C。

## 基础护理学专项训练

### 一、单选题

1. 护理专业化开始于:

- A.中世纪
- B.文艺复兴
- C.宗教改革
- D.19 世纪中叶

1.【答案】D。

2. 患者王某术后腹胀，排尿困难，给予热敷和按摩下腹部，条件反射效果不佳，行导尿管，解除患者痛苦。其满足了:

- A.生理需要
- B.安全需要
- C.爱与归属的需要
- D.尊重的需要

2.【答案】A。

3. 病室环境中，护士“四轻”不包括:

- A.说话轻
- B.走路轻
- C.开门轻
- D.关门轻

3.【答案】C。

4. 世界卫生组织的战略目标是 2000 年:

- A.人人享有健康
- B.人人享有公费医疗
- C.人人享有卫生保健
- D.人人享有更好的营养

4.【答案】C。

5. 柏油样大便见于哪种疾病:

- A.上消化道出血
- B.下消化道出血
- C.胆道梗阻
- D.霍乱

5.【答案】A。

6. 两张病床之间的距离不小于:

- A.1m  
C.2m
- B.1.5m  
D.2.5m

6.【答案】A。

7. 以下关于温度说法不正确的是：

- A.室温过高神经系统受抑制  
C.室温过高干扰呼吸功能
- B.室温过高干扰消化功能  
D.手术室室温应在 18~20℃

7.【答案】D。

8. 人是由神经、骨骼、肌肉等要素构成的一个系统，又是构成社会大系统的一个要素，说明系统具有：

- A.整体性  
C.层次性
- B.相关性  
D.动态性

8.【答案】C。

9. 下列关于压力理论的描述，正确的是：

- A.日常生活中的压力都会损害人的身体健康  
B.压力是包括刺激、认知评价及反应的三个环节的动态过程  
C.只要有压力源就会产生压力  
D.压力源的作用是消极的

9.【答案】B。

10. 南丁格尔著有：

- A.《护理》杂志  
C.《医院札记》
- B.《中华护理》杂志  
D.《护理研究》杂志

10.【答案】C。

11. 下列不属于心理社会因素方面的压力源的是：

- A.地震
- B.搬迁
- C.丧偶
- D.妊娠

11.【答案】D。

12. 肢体可以移动，但不能抬起，属于哪一级肌力：

- A.1级
- B.2级
- C.3级
- D.4级

12.【答案】B。

13. 对于昏迷的患者适用于奥瑞姆的哪个护理系统：

- A.主动—被动系统
- B.完全补偿系统
- C.部分补偿系统
- D.共同参与系统

13.【答案】B。

14. 以下关于噪音说法不正确的是：

- A.白天病区较理想的噪声强度 45~55dB
- B.当噪声强度高达 120dB 以上时，可造成高频率听力损失，甚至永久性失聪
- C.长时间处于 90dB 以上高音量环境中，能导致耳鸣、血压升高
- D.噪声强度在 60~70dB 即能产生相当的干扰

14.【答案】A。

15. 适用于热疗的疾病是：

- A.腰肌劳损
- B.急腹症未确诊前
- C.面部危险三角区感染化脓时
- D.早期软组织损伤

15.【答案】A。

16. 我国第一所护士学校成立于:

- A.1835 年
- B.1848 年
- C.1860 年
- D.1888 年

16.【答案】D。

17. 直肠狭窄患者的大便形状是:

- A.成形软便
- B.栗子样
- C.稀水样便
- D.扁条形

17.【答案】D。

18. 护理程序的结构中, 最基本的理论框架是:

- A.系统论
- B.基本需要论
- C.信息交流论
- D.解决问题论

18.【答案】A。

19. 使用约束带错误的是:

- A.先用棉垫包裹手腕或踝部
- B.用宽绷带打成活结
- C.松紧应适宜
- D.随时放松

19.【答案】D。

20. 患者使用热水袋时, 首先应:

- A.评估病情
- B.教会使用热水袋
- C.检查热水袋
- D.防止烫伤发生

20.【答案】A。

21. 皮亚杰将认知发展过程分为四个阶段, 其中形式运思期属于:

- A.第一阶段
- B.第二阶段

C. 第三阶段

D. 第四阶段

21. 【答案】D。

22. 保留灌肠时为更好地发挥药效，下列哪项措施不妥：

A. 根据病情选择卧位

B. 臀部垫高 10cm

C. 常用量为 300~500ml

D. 压力低于 30cm

22. 【答案】C。

23. 以下取用避污纸的方法正确的是：

A. 由别人代递

B. 半页撕取

C. 须掀起页面再抓取第 2 页

D. 在页面抓取

23. 【答案】D。

24. 下列关于床上洗头说法不正确的是：

A. 取仰卧位

B. 用纱布遮盖双眼

C. 用脱脂棉球塞好双耳

D. 操作后协助采取舒适卧位

24. 【答案】C。

25. 穿隔离衣后禁止进入的区域是：

A. 走廊

B. 严密隔离病室

C. 化验室

D. 储物间

25. 【答案】D。

26. 当个体经受某种压力时，调整自己的态度去认识和处理情况属于：

A. 生理适应

B. 心理适应

C. 文化适应

D. 社会适应

26. 【答案】B。

27. 患者，李某，65岁，主诉畏寒，需热水袋保暖，护士为其灌热水袋，下列哪项操作方法不正确：

- A. 调节水温为 60~70℃
- B. 将热水灌入袋中 1/2~2/3 满
- C. 放平热水袋排尽空气
- D. 拧紧塞子，擦干

27. 【答案】A。

28. 测血压“四定”不包括：

- A. 定部位
- B. 定体位
- C. 定时间
- D. 定人

28. 【答案】D。

29. 血清标本除下列哪项外都可测定：

- A. 血清酶
- B. 脂类
- C. 电解质
- D. 血气分析

29. 【答案】D。

30. 一般临终患者的生理变化不出现：

- A. 循环衰竭
- B. 呼吸衰竭
- C. 肌肉震颤
- D. 胃肠蠕动增强

30. 【答案】D。

31. 抽取不同血标本的顺序是：

- A. 抗凝管→干燥管→血培养
- B. 血培养→抗凝管→干燥管
- C. 血培养→干燥管→抗凝管
- D. 干燥管→血培养→抗凝管

31. 【答案】B。

32. 对于心绞痛患者，他所面临的主要刺激是：

- A. 情绪变化
- B. 酗酒
- C. 心肌缺血
- D. 劳累

32. 【答案】C。

33. 保留灌肠的溶液量一般不超过：

- A. 50ml
- B. 300ml
- C. 150ml
- D. 200ml

33. 【答案】D。

34. 不宜用热疗法的患者是：

- A. 出血性疾病
- B. 肠胀气腹痛
- C. 关节扭伤 2 天后
- D. 腰肌劳损

34. 【答案】A。

35. 临终患者最早可能出现的心理反应是：

- A. 否认
- B. 愤怒
- C. 协议
- D. 忧郁

35. 【答案】A。

36. 应用奥瑞姆的自理模式护理患者时，护理系统的选择取决于：

- A. 医生医嘱
- B. 患者病情
- C. 病房护士的人员构成
- D. 患者的自理能力

36. 【答案】D。

37. 患者，刘某，男，42岁，肝昏迷，临床表现为意识错乱、睡眠障碍、行为失常，为控制其症状，宜采用酸性溶液灌肠，禁用肥皂水灌肠，其原因是：



- A.防止发生腹胀
- B.防止对肠黏膜的刺激
- C.减少氨的产生及吸收
- D.以免引起顽固性腹泻

37.【答案】C。

38. 静脉血标本最好的采集时间是：

- A.上午 7~9 点
- B.任意时刻
- C.临睡前
- D.起床后 1 小时内

38.【答案】D。

39. 为传染病病人工作后，双手刷洗方法是：

- A.由手至臂刷洗 2 遍，共 2min
- B.由臂至手刷洗 2 遍，共 2min
- C.由手至臂刷洗 3 遍，共 6min
- D.由手至臂洗 1 遍，共 2min

39.【答案】B。

40. 患者，李某，女，38 岁，护士为其灌肠时，突然出现剧烈腹痛，此时应：

- A.嘱患者张口呼吸，放松腹部
- B.降低压力，减慢流速
- C.按摩腹部，使腹肌放松
- D.停止灌肠

40.【答案】D。

41. 临终关怀的宗旨中，错误的一项是：

- A.满足临终患者的身心需要
- B.使其舒适、安详、有尊严地度过人生最后时期
- C.以治疗为主，尽量延长患者的生命
- D.注重提高生命质量

41.【答案】C。

42. 为患者测量血压时，由于血压计袖带缠得太紧，可使测得血压：

- A. 血压偏高
- B. 血压偏低
- C. 血压正常
- D. 脉压差增大

42. 【答案】B。

43. 对标本采集方法叙述不正确的是：

- A. 特殊标本注明采集时间
- B. 培养标本在患者使用抗生素前采集
- C. 采集前未使用抗生素应在检验单上注明
- D. 采集方法、采集量要正确

43. 【答案】C。

44. 某患者输液后，突然出现气促、咳嗽、咳粉红色泡沫痰，应立即：

- A. 通知医生
- B. 加压给氧
- C. 停止输液
- D. 四肢轮扎

44. 【答案】C。

45. “1、2、3”溶液的正确的配方是：

- A. 50%硫酸镁 10ml，甘油 20ml，温开水 30ml
- B. 50%硫酸镁 30ml，甘油 60ml，盐水 90ml
- C. 50%硫酸镁 10ml，甘油 20ml，盐水 30ml
- D. 50%硫酸镁 30ml，甘油 60ml，温开水 90ml

45. 【答案】D。

46. 某患者在输液中，突然感到胸部异常不适，随即出现呼吸困难和严重发绀，其处理措施正确的是：

- A. 采取平卧位
- B. 采取端坐位
- C. 采取右侧位
- D. 采取左侧头低足高位

46. 【答案】D。

47. 下列不属于临终患者循环衰竭的表现的是:

- A.心音低而无力
- B.脉搏细速而不规则
- C.血压上升
- D.皮肤苍白

47.【答案】C。

48. 护理危重病员,下列哪项措施是错误的:

- A.眼睑不能自行闭合,覆盖凡士林纱布
- B.定时帮助病员更换体位
- C.为病员定时作肢体被动运动
- D.保持病人口腔清洁,每日做口腔护理1~2次

48.【答案】D。

49. 采集血细菌培养标本时,血量一般为:

- A.2ml
- B.5ml
- C.7ml
- D.10ml

49.【答案】B。

50. 充血性心力衰竭和水钠潴留的病人,禁用以下哪种溶液灌肠:

- A.0.9%氯化钠溶液
- B.0.1%~0.2%肥皂液
- C.10%水合氯醛
- D.“1、2、3”溶液

50.【答案】A。

51. 晚间护理的目的是:

- A.提醒陪护人员离开病室
- B.保持病室美观、整洁
- C.保持患者清洁舒适
- D.进行卫生宣教

51.【答案】C。

52. 护士对于出院患者的护理不正确的是：

- A. 护送患者出院
- B. 执行出院医嘱、填写出院通知单、结账
- C. 停止各种治疗，口服药例外
- D. 进行出院健康教育

52. 【答案】C。

53. 患者，男性，75岁，蛛网膜下腔出血3天，现患者对强烈痛刺激有反应，基本生理反应存在，生命体征正常。此时患者处于：

- A. 意识模糊
- B. 昏睡
- C. 浅昏迷
- D. 嗜睡

53. 【答案】C。

54. 护士为卧床患者洗发时，以下操作不妥当是：

- A. 病室温度在24℃左右
- B. 及时询问患者的感受
- C. 用指甲揉搓患者的头发和头皮
- D. 观察患者面色及呼吸有无改变

54. 【答案】C。

55. 护士经股静脉采血，其穿刺部位是：

- A. 股动脉内侧0.5cm
- B. 股动脉外侧0.3cm
- C. 股神经内侧0.3cm
- D. 股神经外侧0.5cm

55. 【答案】A。

56. 为解除便秘进行大量不保留灌肠时，液体的温度为：

- A. 28~32℃
- B. 33~35℃
- C. 36~38℃
- D. 39~41℃

56. 【答案】D。

57. 与护理工作有关的压力源以下说法不正确的是:

- A. 护理过程中忽略与家属合作及言行不一
- B. 护理缺乏观察力和熟练的技术
- C. 患者感受到严重疾病的威胁
- D. 护理工作中对环境的安排不够妥当

57. 【答案】C。

58. 护士拟为头虱患者配制百部酊药液, 其正确的方法是:

- A. 百部 30g+50%乙醇 100ml+100%乙酸 1ml
- B. 百部 100g+50%乙醇 300ml+100%乙酸 1ml
- C. 百部 50g+50%乙醇 100ml+100%乙酸 10ml
- D. 百部 30g+50%乙醇 100ml+10%乙酸 10ml

58. 【答案】A。

59. 坐位测量血压, 应使肱动脉平:

- A. 第二肋
- B. 第三肋
- C. 第四肋
- D. 第五肋

59. 【答案】C。

60. 全血标本的测定不包括:

- A. 血糖
- B. 尿酸
- C. 尿素氮
- D. 脂类

60. 【答案】D。

61. 影响热疗法效果的因素不包括:

- A. 方法
- B. 部位

C.性别

D.环境温度

61. 【答案】C。

62. 患者输液 2000ml，须在 10 小时内输完，其输液速度应为：

A.40 滴/min

B.50 滴/min

C.60 滴/min

D.70 滴/min

62. 【答案】B。

63. 护士为一级护理患者，行晨晚间护理的适宜时间分别：

A.治疗开始前，晚间入睡前

B.治疗开始后，晚饭前

C.治疗开始后，晚饭后

D.治疗开始前，晚饭前

63. 【答案】A。

64. 护士为亚急性细菌性心内膜炎患者采集血培养标本时，最适宜的采集时间应在：

A.发热前，抗生素应用前

B.发热前，抗生素应用后

C.发热时，抗生素应用前

D.发热后，抗生素应用 1 天后

64. 【答案】A。

65. 为患者行大量不保留灌肠，当患者有便意时，处理方法为：

A.转动肛管

B.抬高灌肠筒高度

C.立即停止灌肠

D.降低灌肠筒高度

65. 【答案】D。

66. 患者，男性，24 岁，因服用敌百虫中毒，以下不宜用洗胃的溶液是：

A.1%盐水

B.1：15000~1：20000 高锰酸钾

C.1%清水

D.2%~4%碳酸氢钠

66. 【答案】D。

67. 奥瑞姆在自理缺陷结构中主要阐明了：
- A.人存在哪些自理需求
  - B.个体何时需要护理
  - C.如何评价个体自理能力
  - D.如何护理存在自理缺陷的个体

67.【答案】B。

68. 患者，女，65岁，因脑出血致右侧肢体瘫痪。护士为其梳发，错误的操作是：
- A.协助患者抬头，将治疗巾铺于枕头上
  - B.将头发从中间分为两股，分股梳理
  - C.一般梳发时先梳发梢，然后再梳发根
  - D.脱落的头发置于纸袋中

68.【答案】C。

69. 不符合血培养标本采集原则的是：
- A.标本容器外贴标签
  - B.采集量一般为3ml
  - C.在使用抗生素前采集
  - D.采集时严格执行无菌操作

69.【答案】B。

70. 以下操作内容中插管长度不正确的是：
- A.大量不保留灌肠：7~10cm
  - B.小量不保留灌肠：7~10cm
  - C.保留灌肠：15~20cm
  - D.肛管排气：15~20cm

70.【答案】D。

71. 湿热敷操作不正确的是：
- A.涂凡士林于受敷部位
  - B.盖上单层纱布
  - C.手背测试敷布温度
  - D.盖布敷于患处

71.【答案】C。

72. 排列出院病历，体温单的上面是：

- A. 检验报告单
- B. 医嘱单
- C. 病史及体格检查单
- D. 护理记录单

72. 【答案】B。

73. 采血进行哪项检查时，需用抗凝管采血：

- A. 甘油三酯的测定
- B. 肝功能检查
- C. 血清酶测定
- D. 尿素氮测定

73. 【答案】D。

74. 大量不保留灌肠的禁忌证，不包括：

- A. 妊娠
- B. 急性腹膜炎
- C. 消化道出血
- D. 外痔

74. 【答案】D。

75. 输液过程中，患者突然出现呼吸困难、气促、咳血性泡沫痰的原因是：

- A. 输入致热物质
- B. 输入速度过快
- C. 输入空气栓子
- D. 输入变质药液

75. 【答案】B。

76. 9床王大爷病愈出院，护士正给其办理出院相关事宜，下列内容中不妥的是：

- A. 将出院时间在体温单 40~42℃横线之间纵行填写
- B. 将出院记录排列在出院病历首页位置
- C. 注销诊断卡、床头（尾）卡、服药卡、治疗卡
- D. 床垫、床褥、棉胎、枕芯在日光下暴晒 6 小时

76. 【答案】B。



77. 防止血标本溶血，下列哪项是错误的：

- A. 选用干燥注射器和针头
- B. 避免过度震荡血标本
- C. 采血后带针头沿管壁将血液注入
- D. 标本应及时送检

77. 【答案】C。

78. 调节氧流量为 6 升/分（L/min），吸氧浓度需：

- A. 43%
- B. 44%
- C. 45%
- D. 46%

78. 【答案】C。

79. 一般湿热敷的持续时间是：

- A. 10~15min
- B. 15~20min
- C. 20~25min
- D. 25~30min

79. 【答案】B。

80. 患者，女性，慢性阿米巴痢疾。医嘱：2%小檗碱（黄连素）灌肠治疗。护士实施治疗时，操作不正确的是：

- A. 晚睡前于患者床旁灌肠
- B. 灌肠前患者先排便
- C. 灌肠时患者取左侧卧位
- D. 灌肠时液面距肛门<30cm

80. 【答案】C。

## 二、多选题

81. 不可做大量不保留灌肠的是：

- A. 早期妊娠
- B. 心肌梗死
- C. 急性胃穿孔
- D. 伤寒高热

81. 【答案】ABC。

82. 隔离区域以下属于半污染区的是：

- A.病区内走廊
- B.护士站
- C.医护值班室
- D.病房

82. 【答案】AB。

83. 下列哪种情况在灌肠时压力宜低：

- A.做胆囊切除术
- B.做乙状结肠检查时
- C.10%水合氯醛灌肠
- D.伤寒患者

83. 【答案】CD。

84. 肠胀气患者在饮食上应注意：

- A.勿食用豆类食物
- B.选用清淡、易消化食物
- C.进食速度宜稍快
- D.少饮汽水

84. 【答案】ABD。

85. 心肺复苏的关键起始措施是：

- A.胸外按压
- B.早期除颤
- C.人工呼吸
- D.心脏受损

85. 【答案】AB。

86. 静脉注射选择血管的标准是：

- A.较粗、较直
- B.避开关节
- C.弹性好
- D.避开静脉瓣处

86. 【答案】ABCD。

87. 患者出院当日护理正确的是:

- A. 停止一切医嘱
- B. 协助患者清理用物
- C. 铺好暂空床, 准备迎接新患者
- D. 通知患者及家属

87. 【答案】AB。

88. 下列属于流感的一级预防内容的是:

- A. 少去人多的公共场所
- B. 勤洗手
- C. 注射流感疫苗
- D. 吃感冒药

88. 【答案】ABC。

89. 小儿头皮静脉的特点是:

- A. 血管壁薄, 易被压瘪
- B. 血液呈向心方向流动
- C. 位置固定
- D. 外观呈微蓝色, 无搏动

89. 【答案】ABCD。

90. 下列关于床上梳头说法正确的是:

- A. 病情较重者, 可协助其取侧卧位
- B. 坐位患者铺治疗巾于患者肩上
- C. 遇到头发打结时, 可用 25%~35%酒精湿润
- D. 对于将发辫编成辫的患者, 每天至少将发辫松开 2 次

90. 【答案】AB。

91. 热疗的目的包括:

- A. 促进炎症的消散和局限
- B. 减轻腹痛
- C. 减轻浅表组织的充血
- D. 保暖与舒适

91. 【答案】ABD。

92. 下列属于物理性压力源的是：

- A. 温度过高
- B. 光线太暗
- C. 学习成绩不理想
- D. 人际关系紧张

92. 【答案】AB。

93. 活动受限的原因包括：

- A. 神经系统功能受损
- B. 营养状态改变
- C. 医疗护理措施的实施
- D. 精神心理因素

93. 【答案】ABCD。

94. 下列关于肠胀气患者护理正确的是：

- A. 养成良好的饮食习惯
- B. 去除病因
- C. 鼓励患者多活动
- D. 直接进行肛管排气

94. 【答案】ABC。

95. 下列关于纽曼系统模式的主要内容叙述正确的是：

- A. 人是一个开放的系统
- B. 基本结构是所有个体系统的核心
- C. 抵抗线紧贴基本结构的外围
- D. 最外层为正常防御线

95. 【答案】ABC。

96. 下列关于生物学死亡期的说法正确的是：

- A. 尸僵最早出现
- B. 尸斑出现在尸体最低部位
- C. 尸体腐败一般先在右下腹出现
- D. 尸冷在 24 小时左右降至与环境温度相同

96. 【答案】BCD。

97. 下列关于动脉血标本采集说法正确的是：

- A.用普通注射器采血时，在穿刺前先抽肝素 1ml
- B.用普通注射器采血时，血气分析采血量为 2ml
- C.进针角度为 40°
- D.用无菌纱布加压止血 5~10 分钟

97.【答案】CD。

98. 下列关于活动受限对机体的影响说法正确的是：

- A.易造成压疮
- B.可出现高血压
- C.静脉血栓形成
- D.导致坠积性肺炎的发生

98.【答案】ACD。

99. 下列关于红外线灯说法错误的是：

- A.灯距为 35~45cm
- B.时间为 15~20 分钟
- C.皮肤出现红斑说明照射时间过长
- D.每隔 5 分钟观察治疗效果

99.【答案】ABC。

100. 对于处于愤怒期的临终患者该如何护理：

- A.置之不理
- B.给患者提供发泄内心情绪的适宜环境
- C.做好患者家属的工作，给予患者关爱
- D.注意预防意外事件的发生

100.【答案】BCD。

### 三、判断题

101. 在临终关怀中，医护人员的服务对象只有患者。

101. 【答案】×。

102. 在抽取静脉血的过程中，若患者有凝血功能障碍，则拔针后按压时间应延长至 15 分钟。

102. 【答案】×。

103. 温水浸泡时配制药液于浸泡盆内 2/3 满。

103. 【答案】×。

104. 白陶土色大便见于胆道梗阻。

104. 【答案】√。

105. 输液反应中空气栓塞最常见。

105. 【答案】×。

106. 机体 0 级活动能力代表完全不能独立，不能参加活动。

106. 【答案】×。

107. 右旋糖酐是晶体溶液。

107. 【答案】×。

108. 患者出院时，在体温单 40~42℃ 横线之间，相应出院日期和时间栏内，用蓝黑钢笔纵行填写出院时间。

108. 【答案】×。

109. 为纪念南丁格尔，遂将她的逝世之日即 5 月 12 日定为护士节。

109. 【答案】×。

110. 适应模式是由美国护理理论学家罗伊提出的。

110. 【答案】√。

**四、案例分析题（请仔细阅读下面的给定材料，根据所提供的信息，回答 111 至 120 题，题目中的选项至少有一项是符合题意的，请找出恰当的选项）**

患者，女性，菲律宾人，35 岁，独自一人出国旅行。上午因剧烈的转移性右下腹痛急诊入院，诊断为“急性阑尾炎”。下午疼痛加剧，遂进行急诊手术。术后各项生命体征平稳，但看着旁边病床上的病人天天有家属探望，自己却独自一人，时常默默流泪，主述疼痛，并且说不适应当地的环境而失眠。

根据以上材料，回答下列问题：

111. 该患者的护患关系的基本模式是：

- A. 主动—被动型
- B. 指导—合作型
- C. 共同参与型
- D. 支持—教育系统

111. 【答案】B。

112. 根据马斯洛的需要层次论，该患者哭泣的主要原因是未满足什么需求：

- A. 生理需要
- B. 安全需要
- C. 爱与归属需要
- D. 尊重需要

112. 【答案】C。

113. 在马斯洛需要层次论中，最高级的需要是：

- A. 安全需要
- B. 爱与归属需要
- C. 尊重需要
- D. 自我实现的需要

113. 【答案】D。

114. 导致患者失眠的主要压力源属于哪种分类：

- A. 躯体性
- B. 心理性
- C. 社会性
- D. 文化性

114. 【答案】D。

115. 下列关于马斯洛的需要层次论正确的是：

- A. 生理需要是最重要的
- B. 各层次需要间可相互影响
- C. 层次越高的需要，满足的方式越有差异
- D. 只有当一个层次的需要被满足之后，更高一层次的需要才会出现

115. 【答案】BC。

患者，男，43岁，因头部外伤急诊入院，全麻下行“硬脑膜下血肿清除术”，同时进行气管切开。术后次日仍昏迷，遵医嘱留置胃管进行鼻饲以维持其营养需要。

根据以上材料，回答下列问题：

116. 鼻饲插胃管前，应将患者摆放为何种体位：

- A. 半坐位
- B. 右侧卧位
- C. 去枕平卧位，头向后仰
- D. 去枕平卧位，头偏一侧

116. 【答案】C。

117. 标记胃管时，插入长度如何测量：

- A. 前额发际到剑突处
- B. 前额发际到胸骨柄
- C. 鼻尖经耳垂到剑突处
- D. 鼻尖经剑突再到耳垂处

117. 【答案】AC。

118. 插管至10~15cm时，应注意什么：

- A. 嘱咐患者做吞咽动作
- B. 患者是否有呛咳



- C.将患者头部托起，使下颌靠近胸骨柄      D.插管是否受阻

118.【答案】C。

119. 灌注食物时，应将鼻饲液的温度调至多少为宜：

- A.39~41℃      B.36~37℃  
C.38~39℃      D.38~40℃

119.【答案】D。

120. 鼻饲时的注意事项有哪些：

- A.插管时动作应轻柔  
B.插管过程中出现呛咳、发绀，可嘱患者深呼吸  
C.每次鼻饲前，先用少量温水冲管再喂食  
D.每天2次进行口腔护理

120.【答案】ACD。

## 妇科护理学专项训练

### 一、单选题

1. 孕妇，29岁，妊娠32周，怀疑自身缺钙而入院，缺钙常见的症状是：

- A.尿频      B.贫血  
C.水肿      D.腓肠肌痉挛

1.【答案】D。

2. 经产妇，35岁，因停经32周出现阴道少量流血入院，pH试纸检查为蓝色，4小时后腹痛渐密，早产一活婴，既往有淋菌性宫颈炎，产妇本次早产最可能的原因是：

- A.高龄产妇      B.子宫畸形

C.胎膜感染

D.胎盘炎症

2.【答案】C。

3. 患者女，24岁，初孕妇，妊娠33周，头痛6天，经检查血压160/110mmHg，治疗3天无效果，今晨5时突然出现剧烈腹痛，检查子宫板状硬。考虑的诊断是：

A.妊娠合并急性阑尾炎

B.胎盘早剥

C.前置胎盘

D.先兆子宫破裂

3.【答案】B。

4. 对于胎盘早期剥离的处理原则是：

A.耐心观察

B.大剂量抗生素

C.卧床休息

D.迅速终止妊娠

4.【答案】D。

5. 诊断前置胎盘较为安全可靠的方法是：

A.放射线检查

B.B超检查

C.肛门指诊

D.血液检查

5.【答案】B。

6. 孕妇，30岁，34周妊娠，阴道少量流血2天，感下腹坠痛2小时，胎心150次/分。肛门检查：宫口扩张可容指尖，胎头先露，高浮。今晨发现胎膜破裂，首要处理是：

A.给予镇静药

B.加用中药保胎

C.应用激素以促胎肺成熟

D.抬高孕妇臀部

6.【答案】D。

7. 患者女, 25 岁, 先天性心脏病, 孕 1 产 1。1 小时前经阴道顺产一女婴, 体重 2500g。分娩后心功能Ⅲ级, 下列处理正确的是:
- A. 24 小时内严密监护并取仰卧位充分休息
  - B. 3 天内应用广谱抗生素预防感染
  - C. 由医护人员协助哺乳
  - D. 退奶后人工喂养新生儿

7. 【答案】D。

8. 胎膜破裂\_\_\_\_\_未分娩时, 遵医嘱应用抗生素预防感染:
- A. 6 小时
  - B. 8 小时
  - C. 10 小时
  - D. 12 小时

8. 【答案】D。

9. 目前导致我国孕妇死亡的第二位死因是:
- A. 妊娠高血压综合症
  - B. 妊娠合并心脏病
  - C. 胎盘早期剥离
  - D. 异位妊娠

9. 【答案】B。

10. 新生儿, 胎龄 35 周, 生后第一天, 生活能力尚可, 其母无乳汁分泌。为预防新生儿低血糖, 护士应进行健康教育的重点是:
- A. 可喂米汤
  - B. 及时喂糖水
  - C. 应该及时给予人工喂养
  - D. 配合给予静脉输注葡萄糖

10. 【答案】B。

11. 某孕妇, 29 岁, 妊娠 30 周, 测空腹血糖, 2 次均  $>5.8\text{mmol/L}$ , 诊断为妊娠期糖尿病。不恰当的护理措施是:

- A.监测血糖变化  
B.控制孕妇饮食  
C.指导正确的口服降糖药方法  
D.告知胰岛素治疗的注意事项

11. 【答案】C。

12. 患者，29岁，宫内妊娠38周，宫缩强，胎儿在宫缩期迅速娩出，总产程为3小时40分钟。产后有较多的持续性阴道流血，色鲜红。可能的出血原因是：
- A.胎盘剥离不全  
B.凝血功能障碍  
C.产后宫缩乏力  
D.软产道裂伤

12. 【答案】D。

13. 引起产后出血的最主要病因是：
- A.子宫收缩乏力  
B.胎盘滞留  
C.胎盘粘连  
D.急产

13. 【答案】A。

14. 有关子宫收缩乏力性产后出血，首先的处理是：
- A.乙醚刺激阴道粘膜  
B.按摩子宫并用宫缩剂  
C.双手按压腹部，按摩子宫  
D.压迫腹主动脉

14. 【答案】B。

15. 与产后出血无关的疾病：
- A.前置胎盘  
B.妊娠高血压综合症  
C.双胞胎  
D.早产

15. 【答案】D。

16. 李女士，孕37周，妊娠合并血小板减少症，血小板计数 $85 \times 10^9/L$ ，胎盘娩出后为预防产后出血对症性处理方案首选为：

- A.在产房严密观察 24h  
B.按摩子宫底部  
C.输入血小板  
D.给予抗生素防感染

16.【答案】C。

17. 患者女，26岁，剖宫产术后16天，突然出现下腹部剧烈疼痛，阴道大量出血，血压80/50mmHg，脉搏110次/分，其出血的原因最可能是：
- A.凝血功能障碍  
B.滋养细胞肿瘤  
C.子宫肌瘤  
D.子宫复旧不全

17.【答案】D。

18. 32岁，经产妇，孕38<sup>+2</sup>周，临产3小时。检查：宫缩强，宫口开大4cm，自然破膜并出现烦躁、呛咳、呼吸困难、发绀，血压60/30mmHg。最先考虑：
- A.先兆子痫  
B.子宫破裂  
C.急性左心衰竭  
D.羊水栓塞

18.【答案】D。

19. 孕妇，妊娠27周，在产前检查发现其血色素偏低，需要补充铁剂，正确的服药时间是：
- A.餐前半小时  
B.餐后20分钟  
C.空腹时  
D.睡前

19.【答案】B。

20. 患者女性，24岁，初孕妇，妊娠38周，在临产过程中，出现烦躁不安，疼痛难忍，下腹部拒按，排尿困难。考虑的诊断是：
- A.妊娠合并急性阑尾炎  
B.先兆子宫破裂  
C.前置胎盘  
D.胎盘早剥

20.【答案】B。

21. 初产妇，会阴侧切，产后第3天体温39.0℃，伴脉速、头痛。下腹疼痛，恶露有臭味。最有效的对因治疗为：

- A.鼓励产妇多饮水
- B.用敏感、足量、高效抗生素
- C.给予半流质饮食
- D.1：5000的高锰酸钾坐浴

21.【答案】B。

22. 初产妇，产后35天，发生感染性炎症，最有可能是：

- A.急性子宫内膜炎
- B.急性盆腔结缔组织炎
- C.急性输卵管炎
- D.盆腔腹膜炎

22.【答案】A。

23. 引起产褥感染最主要的病原体是：

- A.需氧菌
- B.支原体
- C.真菌
- D.厌氧菌

23.【答案】D。

24. 判断胎儿窘迫最直接的临床表现是：

- A.胎心律失常
- B.胎动异常
- C.腹部剧烈疼痛
- D.羊水胎粪污染

24.【答案】B。

25. 胎儿急性缺氧早期胎动的特点是：

- A.消失
- B.频繁
- C.不变
- D.减少

25.【答案】B。

26. 有关原发性痛经，错误的说法是：

- A.多见于未婚或未孕妇女  
B.生殖器官多有器质性病变  
C.常发生在月经初潮后6~12个月  
D.伴面色苍白出冷汗

26.【答案】B。

27. 丁某，女，52岁，因子宫肌瘤合并贫血行全子宫切除手术，术后恢复顺利，于明日拆线出院。作为责任护士，对其进行出院宣教的内容不包括：

- A.术后1个月进行盆浴和性生活  
B.出院后1个月来医院复查  
C.术后2个月内避免提重物  
D.避免久蹲久坐

27.【答案】A。

28. 患者，女性，43岁，拟在腰麻下行子宫肌瘤切除术，术前护士为其留置导尿，导尿主要目的是：

- A.避免尿中出现尿潴留  
B.避免术中出现尿失禁  
C.便于术中观察尿量  
D.避免术中误伤膀胱

28.【答案】D。

29. 下列各项肿瘤中最易导致妨碍受精、孕卵着床，造成不孕或流产的是：

- A.子宫肌瘤  
B.子宫内膜癌  
C.子宫颈癌  
D.卵巢肿瘤

29.【答案】A。

30. 子宫肌瘤的症状与下列哪项关系密切：

- A.肌瘤大小  
B.肌瘤生长部位  
C.发生年龄  
D.肌瘤是否变性

30.【答案】B。

31. 广泛子宫切除和盆腔淋巴结清除术后的患者留置尿管的时间是：

A.2~3d

B.10~14d

C.8~10d

D.6~8d

31. 【答案】B。

32. 子宫肌瘤的患者不会出现：

A.月经改变

B.接触性出血

C.白带增多

D.贫血

32. 【答案】B。

33. 子宫体部肌瘤约占：

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

33. 【答案】D。

34. 患者女，27岁，平素痛经，进行性加重，现婚后2年不孕，妇科检查子宫后位，后穹窿可触及触痛结节，为明确诊断最佳的辅助检查为：

A.腹腔镜

B.宫腔镜

C.B型超声

D.诊断性刮宫

34. 【答案】C。

35. 子宫内膜异位症常发的部位是：

A.子宫直肠窝

B.子宫膀胱反折部

C.卵巢

D.输卵管

35. 【答案】C。

36. 子宫脱垂分度是依据什么位置：

A.屏气时子宫下降的最高点

B.屏气时子宫的正中位置



- C.屏气时子宫下降的最低点  
D.坐骨棘水平

36.【答案】C。

37. 目前诊断子宫内膜异位症的最佳方法是：

- A.诊断性刮宫  
B.B 超  
C.腹腔镜检查  
D.妇科检查

37.【答案】C。

38. 关于宫颈癌的早期发现与预防，不正确的措施是：

- A.普及防癌知识  
B.积极治疗宫颈疾病  
C.每 3~5 年普查一次宫颈涂片  
D.提倡晚婚少育

38.【答案】C。

39. 全子宫切除术后应指导病人禁止性生活和盆浴：

- A.1 个月  
B.2 个月  
C.3 个月  
D.6 个月

39.【答案】C。

40. 宫颈癌早期最常见的症状是：

- A.接触性出血  
B.阴道大量排液  
C.下腹疼痛  
D.消瘦

40.【答案】A。

41. 产妇，24 岁，自然分娩一女婴，产后 5 小时出血约 800ml。为处理产后出血，使用宫腔填塞纱布条的情形是：

- A.软产道裂伤  
B.胎盘因素导致的产后出血

- C.子宫全部松弛无力，缺乏输血条件，病情危急时
- D.凝血功能障碍

41. 【答案】C。

42. 下列哪一部位正常情况下从体表不能看到：

- A.小阴唇
- B.尿道口
- C.前庭大腺
- D.阴道口

42. 【答案】C。

43. 患者 25 岁，停经 58 天，近 1 周有不规则阴道出血。检查宫底位于脐下 3 横指，质软，HCG 阳性。B 超检查子宫肌层内可见高回声团，最可能的诊断是：

- A.双胎
- B.羊水过多
- C.侵蚀性葡萄胎
- D.妊娠合并肌瘤

43. 【答案】C。

44. 孕妇的实验室检查结果中哪项数据高于正常，提示葡萄胎的可能：

- A.雌激素
- B.孕激素
- C.绒毛膜促性腺激素
- D.促卵泡素

44. 【答案】C。

45. 妊娠滋养细胞肿瘤发生转移时，各转移部位共有的临床表现是：

- A.疼痛
- B.发热
- C.局部出血
- D.白细胞降低

45. 【答案】C。

46. 关于绒毛膜癌的病理改变，正确的是：

- A.增生的滋养细胞未侵及子宫肌层
- B.不伴有远处转移

- C.不伴有滋养细胞出血、坏死  
D.绒毛结构消失

46.【答案】D。

47. 葡萄胎患者刮宫前，应准备好静脉通路并配血，其理由是：  
A.防止刮宫时大出血造成休克  
B.刮宫中要静脉给药  
C.刮宫前需要输血  
D.病人要求

47.【答案】A。

48. 张女士，术后病理检查发现子宫肌层及输卵管中有滋养细胞，并显著增生，呈团块状，细胞大小，形状均不一致，有出血及坏死，但绒毛结构完整，其最有可能的诊断为：  
A.葡萄胎  
B.侵蚀性葡萄胎  
C.绒毛膜癌  
D.子宫颈癌

48.【答案】B。

49. 下列关于绒癌脑转移的护理措施哪项是错误的：  
A.观察颅内压增高的症状，记录出入量  
B.加快脑转移患者的补液速度与补液总量  
C.脑转移患者抽搐时或昏迷时要加床挡，防止发生意外  
D.护士应严密观察病情变化，认真倾听病人主诉

49.【答案】B。

50. 葡萄胎随访，应着重哪些检查：  
A.食欲  
B.发热  
C.贫血纠正  
D.测尿绒毛膜促性腺激素

50.【答案】D。

51. 下列哪项不是侵蚀性葡萄胎临床表现:

- A. 子宫大小正常
- B. 阴道壁有紫蓝色结节
- C. 有不规则阴道流血
- D. 贫血

51. 【答案】A。

52. 卵巢肿瘤蒂扭转的主要症状:

- A. 发热
- B. 腹痛, 呕吐
- C. 白细胞升高
- D. 休克

52. 【答案】B。

53. 卵巢肿瘤最常见的并发症是:

- A. 囊肿破裂
- B. 蒂扭转
- C. 感染
- D. 出血

53. 【答案】B。

54. 60岁女性, 绝经10年, 从无不规则阴道流血。因胸闷、腹胀5个月就医。检查: 腹部膨隆, 有移动性浊音, 子宫较正常小, 右侧附件扪及拳头大实质性肿块, 有漂浮感, 左侧附件无异常。胸部X线提示双侧胸腔中量积液, 进一步的处理是:

- A. 口服抗癌药
- B. 手术为主, 综合化学药物治疗
- C. 放射治疗
- D. 免疫治疗

54. 【答案】B。

55. 患者, 女, 58岁, 绝经4年, 近一个月来发现血性或浆液性分泌物, 有时会出现脓性或脓血性分泌物, 下腹或腰骶部疼痛, 该疾病可以诊断为:

- A. 子宫肌瘤
- B. 子宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 子宫内膜异位症

55. 【答案】C。

56. 患者女，30岁，宫颈粘液分泌减少，且变得稠厚，引起此种变化的激素是：

- A.HCG
- B.泌乳素
- C.雌激素
- D.孕激素

56.【答案】D。

57. 促进子宫收缩的护理措施，下列哪项是错误的：

- A.肌内注射硫酸镁
- B.肥皂水灌肠
- C.排空膀胱
- D.刺激乳头

57.【答案】A。

58. 产科最容易发生急性心力衰竭疾病的是：

- A.高度妊娠高血压疾病
- B.羊水栓塞
- C.妊娠合并心脏病
- D.产褥感染

58.【答案】C。

59. 正常分娩的产妇，产后4~6小时应自解小便。该产妇正常分娩4小时，并出现下腹胀、痛的主诉，再结合视诊和叩诊的结果，最可能的问题是：

- A.尿潴留
- B.分娩后疼痛
- C.体液过多
- D.有子宫内膜感染的可能

59.【答案】A。

60. 先兆流产与难免流产的主要鉴别点是：

- A.阴道流血时间
- B.宫颈口是否已开
- C.妊娠反应轻重
- D.下腹疼痛程度

60.【答案】B。

61. 患有高血压的妊娠妇女在子痫前期需住院治疗,积极处理,防止发生子痫及并发症,首选:

- A.甘露醇
- B.卡托普利
- C.硫酸镁
- D.地西泮

61.【答案】C。

62. 王小姐,26岁,妊娠39周,突然发生无诱因、无痛性阴道流血,可能诊断为:

- A.前置胎盘
- B.胎盘早剥
- C.先兆流产
- D.难免流产

62.【答案】A。

63. 经产妇,28岁,刚分娩双胞胎,为了防止产后宫缩乏力,护士可以:

- A.放置新生儿在产妇的子宫底
- B.让产妇取仰卧位
- C.鼓励母乳喂养新生儿
- D.检查胎盘是否完整

63.【答案】C。

64. 马女士,妊娠30周,因羊水过少入院就诊,羊水在胎儿发育中起重要作用,下列关于羊水功能的说法,不正确的是:

- A.使胚胎在羊水中自由活动
- B.防止胎儿受直接损伤
- C.保持羊膜腔内的温度
- D.合成重要营养物质

64.【答案】D。

65. 患者,女性,临产20小时后娩出一活女婴,精疲力竭,为预防其产后出血,胎儿娩出后对产妇最重要的护理措施是:

- A.立即给予导尿
- B.立即输血
- C.立即注射缩宫素
- D.吸氧保暖

65.【答案】C。

66. 子宫颈癌较晚转移部位是：

- A.主韧带
- B.宫旁组织
- C.肝
- D.输尿管

66.【答案】C。

67. 严重的产褥感染可以形成“冰冻骨盆”的是：

- A.急性盆腔腹膜炎
- B.急性盆腔结缔组织炎
- C.急性子宫肌炎
- D.急性输卵管炎

67.【答案】B。

68. 初产妇，30岁。自然分娩。产程延长，手取胎盘。出院时，责任护士告知其预防产褥感染的措施，错误的是：

- A.加强营养
- B.不能外出
- C.注意卫生
- D.禁止盆浴

68.【答案】B。

69. 月经期是：

- A.月经的第1~4日
- B.月经的第1~14日
- C.月经周期的第5~14日
- D.月经周期的第15~24日

69.【答案】A。

70. 妊娠12周后，孕妇尿频症状消失是因为：

- A.孕妇饮水减少
- B.增大的子宫进腹腔
- C.胎位异常
- D.膀胱容量增加

70.【答案】B。

71. 妊娠期母体变化哪项不对：
- A.妊娠后卵巢不排卵  
B.妊娠末期孕妇血液处于低凝状态  
C.妊娠晚期易发生外阴及下肢静脉曲张  
D.子宫峡部在妊娠后期形成子宫下段

71. 【答案】B。

72. 确诊宫颈癌前期病变和确定宫颈癌的最可靠方法：
- A.宫颈刮片  
B.宫颈活检  
C.诊断性刮宫  
D.宫颈碘试验

72. 【答案】B。

73. 某孕妇，末次月经不详，自述停经半年多，检查发现子宫底位于脐与剑突之间，胎心 140 次/分。该孕妇可能的孕周是：
- A.24 周末  
B.28 周末  
C.30 周末  
D.32 周末

73. 【答案】D。

74. 初产妇，23 岁，妊娠 38 周，侧切自然分娩一健康女婴，胎盘正常娩出。产后 1 小时发现产妇面色苍白，出冷汗，阴道流血量较多，主诉头晕、心慌和口渴。血压 80/50mmHg，脉搏 120 次/分，既往血小板减少症，无高血压及低血压，无贫血史，最有可能的诊断是：
- A.胎膜早破  
B.贫血  
C.先兆子宫破裂  
D.产后出血

74. 【答案】D。

75. 正常枕先露的分娩机制顺序下列哪项正确：
- A.下降、衔接、内旋转、俯屈、仰伸、外旋转



- B.衔接、俯屈、内旋转、下降、仰伸、外旋转
- C.衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位、外旋转
- D.下降、俯屈、衔接、外旋转、仰伸、复位、外旋转

75. 【答案】C。

76. 临产开始的标志是：

- A.出现不规则宫缩
- B.阴道分泌物增多
- C.胎动次数减少
- D.宫颈管消失，宫口开大

76. 【答案】D。

77. 某孕妇，G<sub>4</sub>P<sub>1</sub>，孕38周，人工流产4次，产程进展顺利，胎儿娩出后40分钟，胎盘未娩出，亦无剥离征象，阴道无出血，最可能的原因是：

- A.胎盘剥离后滞留
- B.胎盘剥离不全
- C.胎盘嵌顿
- D.胎盘完全粘连

77. 【答案】D。

78. 产程进展的标志是：

- A.宫缩强度
- B.宫缩频率
- C.腹痛加剧
- D.先露下降和宫口扩张

78. 【答案】D。

79. 初孕妇，28岁，40周孕，从未进行产前检查，因“阵发性腹痛5小时”入院。产科检查发现子宫口开全，骨盆出口横径7cm，估计胎儿体重4000g，此时应采取的措施是：

- A.胎头吸引术
- B.产钳助产术
- C.剖宫产术
- D.缩宫素引产术

79. 【答案】C。

80. 急产的处理不妥的是：

A. 安慰产妇

B. 提前住院待产

C. 临产后灌肠

D. 未消毒者母子应用抗菌素

80. 【答案】C。

## 二、多选题

81. 某产妇，2日前顺产一女婴。今日查房发现其乳头皲裂，为减轻其不适，下列护理措施错误的是：

A. 哺乳后挤少量乳汁涂抹乳头

B. 先患侧喂哺后健侧喂哺

C. 哺乳前用肥皂水清洁

D. 为减轻疼痛减少哺乳次数

81. 【答案】BCD。

82. 某孕妇，32岁，妊娠24周，护士对其进行预防妊高症的健康教育，下列内容正确的是：

A. 坚持定期检查

B. 每日补充钙剂两克

C. 采取左侧卧位休息

D. 摄入高蛋白，高脂肪，高维生素饮食

82. 【答案】ABC。

83. 关于女性正常骨盆下列说法正确的是：

A. 骨盆是由骶骨、尾骨和左右两块髌骨组成

B. 骨盆以耻骨联合上缘两侧髂耻缘及骶岬上缘为界分为真假骨盆

C. 骨盆的3个假想平面中，中骨盆平面为骨盆最小平面

D. 妇女直立时，骨盆轴上端向后向下，中端向下，下端向下向前

83. 【答案】 ABCD。

84. 第一产程观察进展需要观察的指标是：
- A. 宫缩
  - B. 胎心
  - C. 宫口扩张
  - D. 胎先露下降

84. 【答案】 ABCD。

85. 关于产褥期的处理，描述正确的有：
- A. 每天清洗外阴
  - B. 产后多饮水，尽早排尿
  - C. 产后 6 周内禁止性生活
  - D. 哺乳前常规消毒乳头

85. 【答案】 ABC。

86. 关于痛经的护理措施，下列说法正确的有：
- A. 注意经期清洁卫生，加强经期保护，预防感冒
  - B. 重视精神心理护理
  - C. 腹部局部冷敷和进食冷的饮料
  - D. 增加病人的自我控制感，使其身体放松

86. 【答案】 ABD。

87. 子宫肌瘤根据发展过程中与子宫肌壁的关系分为：
- A. 肌壁间肌瘤
  - B. 宫体肌瘤
  - C. 浆膜下肌瘤
  - D. 黏膜下肌瘤

87. 【答案】 ACD。

88. 子宫内膜异位症常见的临床症状有：
- A. 下腹痛
  - B. 痛经
  - C. 月经不规则
  - D. 不孕

88. 【答案】 ABCD。

89. 下列哪些不是早期宫颈癌的临床症状：

- A. 更年期周期短的阴道流血
- B. 生育年龄月经前后的点滴出血
- C. 接触性出血
- D. 绝经后的不规则阴道出血

89. 【答案】 AB。

90. 关于宫颈癌的早期发现与预防，正确的措施有：

- A. 普及防癌知识
- B. 积极治疗宫颈疾病
- C. 每3~5年普查一次宫颈涂片
- D. 提倡晚婚少育

90. 【答案】 ABD。

91. 关于绒毛膜癌正确的是：

- A. 60%继发于葡萄胎
- B. 也可发生于流产或足月分娩后
- C. 最常见的致死原因是肺转移
- D. 最常见的转移部位为肺

91. 【答案】 ABD。

92. 妊娠滋养细胞肿瘤常见的转移部位是：

- A. 脾
- B. 肾
- C. 膀胱
- D. 消化道

92. 【答案】 ABCD。

93. 接受会阴切除缝合术的产妇若伤口肿胀，疼痛，可用以局部湿敷的是：

- A. 95%乙醇
- B. 75%乙醇
- C. 75%硫酸镁
- D. 50%硫酸镁

93. 【答案】 AD。

94. 子宫脱垂的病因:

- A.分娩损伤
- B.长期腹压增加
- C.阴道壁松弛
- D.盆腔组织发育不良

94.【答案】ABD。

95. 患者, 48岁, 宫颈重度糜烂, 应进行的检查是:

- A.宫颈刮片
- B.宫颈粘液结晶检查
- C.阴道镜检及活组织检查
- D.白带培养

95.【答案】AC。

96. 孕妇, 32岁, 孕37周, 产前检查宫高32cm、腹围90cm、胎位LOA, 腹部皮肤发亮, 胎心遥远, 考虑为羊水过多, 恰当的护理措施是:

- A.观察胎心及胎动, 防止胎儿窘迫
- B.放羊水后腹部加压包扎防发生感染
- C.减少增加腹压的活动
- D.腹腔穿刺放羊水一次不超过2000ml

96.【答案】AC。

97. 有关妊娠期糖尿病对胎、婴儿影响的叙述, 正确的是:

- A.畸形发生率增加
- B.巨大儿发生率增加
- C.易发生新生儿呼吸窘迫综合征
- D.新生儿出生后患低胰岛素血症

97.【答案】ABC。

98. 子宫收缩乏力造成的产后出血, 止血措施有:

- A.宫腔填塞纱布条
- B.按摩子宫
- C.结扎子宫动脉
- D.注射缩宫素

98.【答案】ABCD。

99. 关于协调性子宫收缩乏力，正确的描述是：

- A. 产妇自觉持续性腹痛，无间歇
- B. 可以静脉滴注缩宫素加强宫缩
- C. 潜伏期宜使用哌替啶
- D. 子宫收缩有正常节律性，极性及对称性，仅收缩力弱

99. 【答案】BD。

100. 孕妇，28岁，妊娠40周，第一胎，规律性腹痛2小时入院待产。胎方位为单臀位，估计胎儿重3000g，骨盆外测量正常。对该孕妇的处理原则，正确的是：

- A. 胎方位为臀位的初产妇一律行剖宫产
- B. 可考虑阴道助产
- C. 注意后出胎头的娩出
- D. 随时做好手术准备

100. 【答案】BCD。

### 三、判断题

101. 肾上腺是黄体的主要来源。

101. 【答案】×。

102. 妊娠期孕妇的血容量逐渐增加约35%，于妊娠32~34周达高峰。

102. 【答案】×。

103. 新生儿母乳喂养应严格按每间隔3h喂养一次。

103. 【答案】×。

104. 对功能失调性子宫出血有迅速止血效果的是诊断性刮宫。

104. 【答案】×。

105. 确诊子宫肌瘤的最佳方法是腹腔镜检查。

105. 【答案】×。

106. 宫颈癌的转移途径以直接蔓延和淋巴转移最为多见。

106. 【答案】√。

107. 我国沿用的“流产”的定义是凡妊娠不足 28 周，胎儿体重不足 500g 而终止妊娠者。

107. 【答案】×。

108. 慢性羊水过多较少见，多发生于妊娠晚期，多数孕妇不能适应。

108. 【答案】×。

109. 第二产程延长是指宫口开大 3cm 至宫口开全超过 8 小时者。

109. 【答案】×。

110. 宫外孕不包括宫颈妊娠。

110. 【答案】√。

**四、案例分析题（请仔细阅读下面的给定材料，根据所提供的信息，回答 111 至 120 题，题目中的选项至少有一项是符合题意的，请找出恰当的选项）**

患者，女。初产妇，足月妊娠，临产 16 小时，伴排尿困难。检查：宫底在脐与剑突之间，拒按。枕右前位，胎心不清，大约 80 次/分，宫口开大 4cm，胎头 S-1。宫缩间歇时，患者呼叫疼痛，并于脐下 2 横指处触及一凹陷，随宫缩有上升趋势，导尿发现为肉眼血尿，诊断为先兆子宫破裂。

根据以上材料，回答下列问题：

111. 根据以上描述，随宫缩有上升趋势的凹陷环是：

- A.生理性缩复环
- B.病理性缩复环
- C.子宫颈
- D.子宫痉挛性狭窄环

111. 【答案】B。

112. 出现先兆子宫破裂，首要的护理措施是：

- A.停止一切操作和缩宫素的使用，抑制宫缩
- B.剖宫产尽快终止妊娠
- C.应用抗生素防感染
- D.输血、输液，抗休克

112. 【答案】A。

113. 针对于先兆子宫破裂，应立即使用的药物是：

- A.哌替啶
- B.抗生素
- C.缩宫素
- D.钙剂

113. 【答案】A。

114. 预防子宫破裂，下列措施正确的是：

- A.定期做产检
- B.禁止使用缩宫素
- C.有瘢痕子宫患者，应提前入院待产
- D.纠正异常胎位

114. 【答案】ACD。

115. 若患者因子宫破裂，胎儿死亡，行子宫切除术。术后制定心理调适的护理措施，哪项不妥：

- A.允许产妇诉说内心感受
- B.适当时候向产妇解释胎儿死亡原因
- C.安排与哺乳产如同住一室
- D.鼓励家属多陪伴产妇

115. 【答案】C。



患者，女，35岁，因“停经3月余，阴道流血5天”入院，患者平素月经规则，经量正常，无痛经史，停经8周后出现不规则阴道流血，子宫异常增大变软，时常发生呕吐，还有阵发性下腹隐痛，一般不剧烈可忍受。

根据以上材料，回答下列问题：

116. 该患者的具体的临床诊断是：

- A. 葡萄胎
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 子宫肌瘤

116. 【答案】A。

117. 下列关于该患者症状描述错误的是：

- A. 最常见的症状为妊娠呕吐
- B. 腹痛一般发生在阴道流血前
- C. 病人的子宫大于停经月份，质硬
- D. 卵巢黄素化囊肿扭转或破裂时可出现急性腹痛

117. 【答案】AC。

118. 可以进行预防性化疗的是：

- A. 年龄大于30岁
- B. 葡萄胎排出前HCG值异常升高
- C. 子宫明显大于停经月份
- D. 卵巢黄素化囊肿大于6cm

118. 【答案】BCD。

119. 如果该病人需要进行手术，则术前和术后的描述正确的是：

- A. 刮宫前配血备用，建立静脉通路
- B. 缩宫素在充分扩张宫口、开始吸宫后使用
- C. 一次刮不干净，则应2周后再次刮宫

D.刮出物选取靠近宫壁的葡萄状组织送病理检查

119.【答案】ABD。

120. 对该患者进行健康教育，下列说法错误的是：

A.有 10%~25%的恶变可能，所以需定期随访，随访时间为 5 年

B.随访内容为血、尿、HCG，有无阴道异常流血等

C.清宫术后禁止性生活 3 个月

D.随访期间严格避孕 1 年，首选避孕工具为阴茎套

120.【答案】AC。

## 儿科护理学专项训练

### 一、单选题

1. 患儿四个月，夜间经常哭闹难以入睡，医疗诊断佝偻病，给予肌肉注射后出现全身抽搐两次，每次持续约 30 秒，抽搐停止后精神如常，护理体检，体重 6.1kg，体温 37.8℃，有枕秃及颅骨软化，实验室检查血清钙 1.68mmol/L，患儿抽搐最可能的原因是：

A.缺乏维生素 D

B.热惊厥

C.血清钙降低

D.癫痫发作

1.【答案】C。

2. 苯丙酮尿症患儿最突出的临床表现是：

A.头发呈黄褐色

B.皮肤白皙

C.智力低下

D.尿有鼠臭味

2.【答案】C。

3. 下列对早产儿的护理措施，不正确的一项是：

- A. 每日测体温 6 次，注意体温的变化
- B. 早产儿与足月儿不用分室居住
- C. 加强口腔、皮肤及脐部的护理
- D. 体重小于 2000g 者，应尽早置婴儿培养箱保暖

3. 【答案】B。

4. 小儿肺炎最重要的护理措施是：

- A. 保持室内空气新鲜
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 维持体温正常
- D. 密切观察病情

4. 【答案】B。

5. 足月儿生理性黄疸一般出现和消失的规律是：

- A. 出生后 1~2 天出现，3~4 天达到高峰，1 周内消退
- B. 出生后 2~3 天出现，4~5 天达到高峰，2 周内消退
- C. 出生后 3~4 天出现，7~8 天达到高峰，3 周内消退
- D. 出生后 5~6 天出现，8~9 天达到高峰，4 周内消退

5. 【答案】B。

6. 小婴儿患化脓性脑膜炎时，最应注意的体征是：

- A. 前囟隆起
- B. 克氏征
- C. 前囟凹陷
- D. 巴氏征

6. 【答案】A。

7. 细菌性肺炎的血常规检查表现为：

- A. 白细胞总数正常
- B. 白细胞总数降低

C.嗜酸性粒细胞增高

D.中性粒细胞增高

7.【答案】D。

8. 1 周岁小儿的体重为出生体重的:

A.1 倍

B.2 倍

C.3 倍

D.4 倍

8.【答案】C。

9. 大型室间隔缺损发生持续性肺动脉高压时,产生右向左分流,临床产生持续性青紫,称为:

A.大动脉转位

B.右向左分流型先心病

C.法洛三联症

D.艾森曼格综合征

9.【答案】D。

10. 小儿时期最常见的贫血是:

A.营养性缺铁性贫血

B.营养性巨幼细胞性贫血

C.溶血性贫血

D.再生障碍性贫血

10.【答案】A。

11. 麻疹早期的特征性体征是:

A.高热

B.上呼吸道炎

C.淡红色斑丘疹

D.麻疹黏膜斑

11.【答案】D。

12. 婴幼儿易患呼吸道感染,主要缺乏的免疫球蛋白是:

A.IgG

B.IgM

C.IgE

D.SIgA

12. 【答案】D。

13. 猩红热患者取咽拭子可见：

- A.多核巨细胞
- B.乙型溶血性链球菌
- C.葡萄球菌
- D.白色念珠菌

13. 【答案】B。

14. 婴幼儿在情绪急剧变化时出现的屏气发作现象属于：

- A.睡眠障碍
- B.情绪障碍
- C.品行障碍
- D.心理机能发展迟缓

14. 【答案】B。

15. 新生儿败血症主要感染途径是：

- A.脐部
- B.产道
- C.泌尿道
- D.消化道

15. 【答案】A。

16. 用甘露醇治疗新生儿颅内出血是为了：

- A.并发脑疝患者，用它达到迅速降颅压的目的
- B.预防继续出血
- C.兴奋呼吸中枢
- D.促进脑细胞代谢

16. 【答案】A。

17. 患儿，10个月，急性上呼吸道感染、高热，服用美林后体温至37.4℃。评估该患儿的首要的护理问题是：

- A.体温升高
- B.活动无耐力

C.心排血量减少

D.潜在并发症：高热抽搐

17.【答案】D。

18. 造成营养不良最常见的疾病是：

A.消化系统疾病

B.肾病综合征

C.长期发热

D.急性传染病

18.【答案】A。

19. 为了提高母乳喂养率，胎儿娩出后应：

A.尽早哺乳

B.2~4h 后哺乳

C.5~6h 后哺乳

D.24h 后哺乳

19.【答案】A。

20. 下面所述小儿的总热量中哪项所需热量是小儿最特殊的：

A.基础代谢

B.食物特殊动力作用

C.生长发育

D.运动

20.【答案】C。

21. 降低麻疹发病率，保护易感患儿的关键措施是：

A.密切监测患儿病情

B.一旦发现麻疹患者立即隔离

C.医学检疫 21 天

D.易感儿按时注射麻疹疫苗

21.【答案】D。

22. 评估小儿营养状况，首先应作下列哪项检查：

A.血常规

B.测量身高

C.测体重

D.胸部 X 线摄片

22.【答案】C。

23. 麻疹合并肺炎时，有效隔离期是出疹后：

A.3 天

B.5 天

C.8 天

D.10 天

23.【答案】D。

24. 关于小儿颅骨发育下列不正确的是：

A. 囟门早闭或过小，见于头小畸形

B. 前囟凹陷见于极度消瘦或脱水者

C. 前囟出生时大小为 1.5~2.0cm

D. 后囟最迟在 3~4 个月闭合

24.【答案】D。

25. 小儿惊厥持续状态是指持续多久以上：

A.30 分钟

B.24 小时

C.20 分钟

D.12 小时

25.【答案】A。

26. 8 个月小儿的体重按公式推算应是：

A.6.5kg

B.7.0kg

C.7.6kg

D.8.0kg

26.【答案】D。

27. 迁延性肺炎的病程为：

A.1 个月

B.2~4 周

C.1~3 个月

D.>3 个月

27.【答案】C。

28. 新生儿硬肿症常见的表现不包括：

- A. 皮肤硬、凉  
B. 反应低下  
C. 皮肤硬肿后软，中央坏死形成  
D. 不吃、不哭、不动

28. 【答案】C。

29. 患儿男，3岁，主诉因发热5天伴右膝关节疼痛1天入院，该患儿1周前有上呼吸道感染病史，查体：咽充血，双扁桃体II度大，心电图示ST波下段，T波低平，右膝关节红、肿、痛，活动受限，最可能的诊断是：

- A. 病毒性心肌炎  
B. 风湿热  
C. 化脓性关节炎  
D. 儿童类风湿关节炎

29. 【答案】B。

30. 关于儿童患病的特点，正确的是：

- A. 起病较慢  
B. 预后较差  
C. 表现较典型  
D. 感染性疾病较多

30. 【答案】D。

31. 患儿，3岁，急性上呼吸道感染，体温39.5℃，因全身抽搐就诊。为明确抽搐原因，在收集患儿健康史时应重点询问：

- A. 喂养史  
B. 生长史  
C. 既往发作史  
D. 过敏史

31. 【答案】C。

32. 关于小儿药物治疗的注意事项，正确的是：

- A. 经常更换抗生素  
B. 给药途径首选静脉点滴法  
C. 注意避免滥用糖皮质激素  
D. 感染性疾病首选抗生素治疗

32. 【答案】C。



33. 足月儿是指：

- A.胎龄>28周至40周的新生儿
- B.胎龄>28周至<37周的新生儿
- C.胎龄 $\geq$ 37周至<42周的新生儿
- D.胎龄为第37周的新生儿

33.【答案】C。

34. 先天性心脏病患儿恢复心脏功能的重要护理措施是：

- A.注意休息，保证睡眠
- B.持续给氧，改善缺氧
- C.应用洋地黄，增强心肌收缩力
- D.应用足量利尿剂，减少心脏负担

34.【答案】A。

35. 婴幼儿易患呼吸道感染的因素主要是：

- A.居室拥挤
- B.免疫特点
- C.护理不当
- D.疾病影响

35.【答案】B。

36. 新生儿败血症治疗的关键是：

- A.营养支持
- B.对症治疗
- C.病因治疗及病灶清除
- D.维持体液平衡

36.【答案】C。

37. 小儿机体能量最主要来源于：

- A.脂肪
- B.蛋白质
- C.碳水化合物
- D.维生素

37.【答案】C。

38. 关于母乳成分正确的是：

- A.含丰富的维生素，尤其是维生素K

- B.乳糖含量较高，且主要以乙型乳糖为主
- C.含蛋白质多，尤其是酪蛋白明显高于牛乳
- D.含丰富的矿物质，钙、铁、锌含量明显高于牛乳

38. 【答案】B。

39. 8%糖牛奶 100ml 能产热：

- A.100kJ
- B.200kJ
- C.100kcal
- D.200kcal

39. 【答案】C。

40. 下列哪项是维生素 D 缺乏性佝偻病骨样组织堆积的表现：

- A.鸡胸
- B.颅骨有乒乓球感
- C.手镯征
- D.肋缘外翻

40. 【答案】C。

41. 小儿易于发生营养性疾病的原因是：

- A.小儿外观和身体各部分比例都在不断变化
- B.年龄越小生长越快，所需营养物质相对较成人多
- C.小儿体液免疫和细胞免疫功能不健全
- D.小儿各脏器功能发育不成熟

41. 【答案】B。

42. 法洛四联症患者喜欢蹲踞的原因是：

- A.缓解漏斗部痉挛
- B.使心脑血管供血量增加
- C.使腔静脉回心血量增加
- D.增加体循环阻力，减少右向左分流

42. 【答案】D。

43. 属于被动免疫的措施是：

- A.口服脊髓灰质炎疫苗
- B.注射卡介苗
- C.注射丙种球蛋白
- D.注射麻疹疫苗

43.【答案】C。

44. 反映骨骼发育的重要指标是：

- A.体重
- B.身长
- C.出牙早迟
- D.囟门闭合情况

44.【答案】B。

45. 对于人工喂养的早产儿，选择配方奶粉喂养是因为：

- A.易发生呼吸暂停现象
- B.为减轻生理性黄疸
- C.肾小管排酸能力差
- D.容易发生严重感染

45.【答案】C。

46. 早产儿容易发生出血的原因之一是缺乏：

- A.维生素 A
- B.维生素 D
- C.维生素 K
- D.维生素 E

46.【答案】C。

47. 新生儿易患革兰氏阴性杆菌感染是由于缺乏：

- A.IgA
- B.IgM
- C.IgG
- D.IgE

47.【答案】B。

48. 患儿，女，4岁，从小体弱、易累、易患感冒，发育相对滞后。查体胸骨左缘第2肋间可闻及粗糙连续性机器样杂音，可见毛细血管搏动及股动脉枪击音。考虑为：

- A.法洛三联症  
B.主动脉瓣狭窄  
C.房间隔缺损  
D.动脉导管未闭

48. 【答案】D。

49. 患儿，10个月，因发热、咳嗽、气喘1天入院。查体：体温38.6℃，呼吸60次/分，心率140次/分，有呼气性呼吸困难，双肺布满哮鸣音，有少量粗湿啰音。对该患儿首先应采取的治疗措施是：

- A.给予镇咳药止咳  
B.用退热药降温  
C.氨茶碱稀释后缓慢静脉滴注  
D.给氧

49. 【答案】C。

50. 与新生儿Apgar评分标准无关的是：

- A.体温  
B.心率  
C.呼吸  
D.肌张力

50. 【答案】A。

51. 属于新生儿颅内出血的神经系统的兴奋症状是：

- A.嗜睡  
B.昏迷  
C.肌张力低下  
D.脑性尖叫

51. 【答案】D。

52. 患儿，1岁，急性上呼吸道感染、发热。服用对乙酰氨基酚后大汗淋漓，体温降至37.4摄氏度，该患儿首要的护理问题是：

- A.活动无耐力  
B.有感染的风险  
C.有体液不足的危险  
D.营养失调：低于机体需要量

52. 【答案】C。

53. 维生素 D 缺乏性佝偻病初期的主要临床表现是：

- A. 运动发育迟缓
- B. 方颅、鸡胸
- C. 肌张力低下
- D. 睡眠不安、易激惹

53. 【答案】D。

54. 母乳喂养儿肠道的主要细菌是：

- A. 链球菌
- B. 大肠杆菌
- C. 双歧杆菌
- D. 变形杆菌

54. 【答案】C。

55. 3 个月婴儿稀水便 2 天，每天约 10 余次伴呕吐尿少，前囟凹陷，精神萎靡，呼吸深快，口唇樱红。该患儿应考虑腹泻伴有：

- A. 休克
- B. 酸中毒
- C. 中毒性脑病
- D. 低钾血症

55. 【答案】B。

56. 患儿，女，7 岁，病史为法洛四联症，严重呕吐腹泻 2 天，急诊入院，候诊时，患儿突然出现头晕，右侧肢体肌力下降，考虑最可能的并发症是：

- A. 脑栓塞
- B. 脑膜脑炎
- C. 脑脓肿
- D. 感染性心内膜炎

56. 【答案】A。

57. 小儿腹泻，测得其血钠值 125mmol/L，则给该患儿补液时应给予什么张力的液体：

- A. 1/4 张
- B. 1/5 张
- C. 2/3 张
- D. 1/2 张

57. 【答案】C。

58. 小儿病房的安全措施包括:

- A.小儿床要加床栏, 窗口加防护栏                      B.暖气片加防护罩, 防止烫伤  
C.保温瓶、茶杯应放于患儿不能触及的地方      D.以上都正确

58. 【答案】D。

59. 引起婴儿维生素 D 缺乏性佝偻病的主要原因是:

- A.摄入不足    B.生长过速  
C.日照不足    D.母亲孕期缺乏维生素

59. 【答案】C。

60. 小儿腹泻重型与轻型的主要区别点是:

- A.发热、口渴    B.每日大便超过 10 次  
C.有水、电解质紊乱    D.大便有脂肪球

60. 【答案】C。

61. 不属于预防接种禁忌证的是:

- A.免疫功能缺陷者    B.明确过敏史者  
C.急性传染病患者    D.先天性心脏病患者

61. 【答案】D。

62. 前囟的正确测量方法是:

- A.对角线的距离长度    B.周边长度距离  
C.对边连线距离长度    D.对边中点连线距离长度

62. 【答案】D。

63. 新生儿寒冷损伤综合征皮肤硬肿部位发生的顺序是:

- A.下肢—臀部—躯干—上肢—面颊                              B.下肢—臀部—面颊—上肢—躯干

- C.下肢—上肢—臀部—躯干—面颊      D.腹部—躯干—臀部—四肢—面颊

63. 【答案】B。

64. 小儿易发生水、电解质、酸碱平衡紊乱最重要的原因是：

- A.肾功能不成熟      B.肺功能不成熟  
C.神经发育不成熟      D.血浆缓冲系统不成熟

64. 【答案】A。

65. 新生儿时期建立母子感情的最关键措施为：

- A.母乳喂养      B.贴身环抱  
C.经常为其洗澡      D.更换尿布

65. 【答案】A。

66. 流行性腮腺炎多发于：

- A.儿童及青少年      B.青壮年多见  
C.普遍易感      D.6岁以内者不患病

66. 【答案】A。

67. 肺泡表面活性物质迅速增加的时间是：

- A.胎龄 20~24 周      B.胎龄 24~30 周  
C.胎龄 35 周以后      D.胎龄 37 周以后

67. 【答案】C。

68. 患儿男，1岁，腹泻5天，大便4~5次/天，为黄色稀水便，含脓血及黏液。体检：体温38.7℃，皮肤弹性尚可，心肺正常。大便镜检：大量红白细胞。考虑该患儿腹泻的原因可能是：

- A.肠内细菌感染      B.轮状病毒感染

C.肠道菌群失调

D.消化酶分泌减少

68. 【答案】A。

69. 心脏形成的关键时期是胚胎发育的:

A.前 2 周

B.前 4 周

C.前 6 周

D.前 8 周

69. 【答案】D。

70. 早产儿适宜的病室温度,相对湿度是:

A.22~24℃, 50%~60%

B.22~24℃, 55%~65%

C.24~26℃, 50%~60%

D.24~26℃, 55%~65%

70. 【答案】D。

71. 一患儿以中毒性脑病入院,护士观察病情时发现呼吸不规则,意识障碍加重,瞳孔不等大,光反射减弱,护士此时应采取的首要的措施是:

A.静脉滴注抗生素

B.将患儿头部抬高 15°

C.通知医生,准备气管插管所用物品

D.加强监护,避免刺激

71. 【答案】C。

72. 右向左分流型先天性心脏病最突出的症状是:

A.面色苍白

B.活动后气促

C.呼吸困难

D.发绀

72. 【答案】D。

73. 从卵子和精子结合到胎儿出生统称为:

A.围产期

B.胎儿期

C.新生儿期

D.婴儿期



73. 【答案】B。

74. 下列辅食添加的原则应除外：

- A.从少到多
- B.从稀到稠
- C.从粗到细
- D.患病暂停

74. 【答案】C。

75. 下列不符合正常足月新生儿外观特点的是：

- A.皮肤红润，胎毛少
- B.乳晕清楚，可摸到乳房结节
- C.指（趾）甲长到或超过指端
- D.足底纹少，足跟光滑

75. 【答案】D。

76. 生长发育监测的对象主要是：

- A.3岁以下幼儿
- B.0~1岁小儿
- C.3岁以上小儿
- D.学龄前期小儿

76. 【答案】A。

77. 2岁小儿体重是其出生体重的：

- A.2倍
- B.3倍
- C.4倍
- D.5倍

77. 【答案】C。

78. 患儿，女，2岁，化脓性脑膜炎，脑脊液细菌培养为肺炎球菌，首选的治疗药物为：

- A.罗红霉素
- B.甲硝唑
- C.青霉素
- D.庆大霉素

78. 【答案】C。

79. 一小儿已经会跑，会讲2~3个字组成的句子，而且有了“自我”意识。该小儿所处的时期是：

- A. 学龄期
- B. 新生儿期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期

79. 【答案】D。

80. 下述哪项不是儿科护士角色的内容：

- A. 直接护理者
- B. 患儿及家庭的批评监督者
- C. 患儿的代言人
- D. 健康与预防的指导者

80. 【答案】B。

## 二、多选题

81. 护理新生儿时，预防感染的措施是：

- A. 新生儿室要用湿式清扫法
- B. 每护理一个新生儿后均洗手
- C. 无论脐带有无渗血，均应经常解开包扎察看
- D. 保持脐部清洁干燥

81. 【答案】ABD。

82. 患儿，3岁，惊厥反复发作入院，为防止该患儿惊厥时外伤，以下处理正确的有：

- A. 将纱布放在患儿的手中
- B. 用约束带捆绑四肢
- C. 床边设置防护栏
- D. 移开床上一切硬物

82. 【答案】ACD。

83. 新生儿期接种的疫苗有：

- A. 麻疹
- B. 卡介苗
- C. 乙肝疫苗
- D. 百白破疫苗

83. 【答案】BC。

84. 患儿，女性，3岁，体格瘦小，平常鼻尖、甲床、口唇等部位发绀，活动、哭闹时加重。活动时有蹲踞现象，胸骨左缘第2~4肋间可闻及II~III级喷射性收缩期杂音。下列哪项不属于患儿的医学诊断是：

- A. 动脉导管未闭
- B. 病毒性心肌炎
- C. 法洛四联症
- D. 房间隔缺损

84. 【答案】ABD。

85. 出现下列哪些症状，提示患儿发生了心力衰竭：

- A. 呼吸突然加快，超过60次/分
- B. 心率突然增快，超过180次/分
- C. 心音低钝、奔马律
- D. 肝脏迅速增大

85. 【答案】ABCD。

86. 下列疾病中，属于左向右分流型先心病的是：

- A. 法洛四联症
- B. 房间隔缺损
- C. 室间隔缺损
- D. 动脉导管未闭

86. 【答案】BCD。

87. 患儿发生动脉导管未闭时，哪些临床表现可以出现阳性体征：

- A. 脑膜刺激征
- B. 水冲脉
- C. 毛细血管搏动征
- D. 股动脉枪击音

87. 【答案】BCD。

88. 属于脂溶性维生素的有：

- A. VitA
- B. VitB
- C. VitC
- D. VitD

88. 【答案】AD。

89. 小儿脊髓灰质炎的感染途径有：

- A.粪一口途径
- B.飞沫传播
- C.直接接触
- D.虫媒传播

89. 【答案】AB。

90. 新生儿病理性黄疸常见的疾病有：

- A.新生儿溶血病
- B.胆道闭锁
- C.母乳性黄疸
- D.新生儿肝炎

90. 【答案】ABCD。

91. 对先天性心脏病的护理，下列何者正确：

- A.建立合理的工作制度
- B.可参加各种体育运动
- C.避免受凉、防止感冒
- D.少食多餐，给予高蛋白高热量易消化饮食

91. 【答案】ACD。

92. 下列属于轻度等渗性脱水表现的是：

- A.失水占体重的 3%~5%
- B.皮肤弹性稍差
- C.眼窝和前囟明显凹陷
- D.有休克症状

92. 【答案】AB。

93. 治疗新生儿黄疸时，使用换血疗法的目的是：

- A.换出已致敏的红细胞和血清中的免疫抗体，阻止继续溶血
- B.去除血清中的未结合胆红素，防止核黄疸的发生

C.纠正溶血导致的贫血，防止缺氧及心力衰竭

D.纠正胎儿出生时水肿

93.【答案】ABC。

94. 母乳喂养的好处包括：

A.方便经济、营养丰富

B.含钙磷比例适当，但难以吸收

C.含有丰富的抗感染物质

D.产后早期哺乳，可刺激子宫收缩引起出血

94.【答案】AC。

95. 婴儿期保健措施包括：

A.提倡母乳喂养、合理人工喂养、及时添加辅食

B.有计划地进行各种预防接种和注意预防呼吸道感染

C.做好生长发育监测

D.进行语言训练及早期教育

95.【答案】ABCD。

96. 高热惊厥的特点是：

A.年龄多在3~7岁

B.多发生于病初突然高热时

C.发作呈局限性抽搐

D.发作次数少，时间短

96.【答案】BD。

97. 小儿肺炎的护理措施有哪些：

A.保持患儿安静，减少耗氧量

B.进食避免过饱，影响呼吸

C.控制输液速度，防止肺水肿

D.观察病情变化

97.【答案】ABCD。

98. 麻疹恢复期的临床表现有：

- A. 褐色色素沉着
- B. 皮疹出现
- C. 麻疹黏膜斑
- D. 米糠样脱屑

98. 【答案】AD。

99. 新生儿颅内出血的一般护理措施正确的有：

- A. 绝对静卧
- B. 取头高位
- C. 避免头皮穿刺
- D. 保持病室安静

99. 【答案】ABCD。

100. 婴儿“生理性贫血”的原因是：

- A. 婴儿生长发育迅速增加，血液循环量迅速增加
- B. 新生儿出生后胎儿红细胞破坏较多
- C. 婴儿出生3个月体内储存铁已大量被消耗
- D. 暂时性骨髓造血功能降低，红细胞生成素不足

100. 【答案】ABD。

### 三、判断题

101. 头在胎儿期及婴儿期已领先生长，故婴儿期头长占身上比例的1/5。

101. 【答案】×。

102. 猩红热的首选治疗药物是青霉素。

102. 【答案】√。

103. 新生儿可从母体获得抗体IgG（被动免疫），但3~5个月开始逐渐消失。

103. 【答案】√。

104. 小儿麻疹最常见的并发症是肺炎和心肌炎。

104. 【答案】×。

105. 蓝光疗法若单面照射，每 2h 改变体位 1 次，双面光照可不翻身，但要避免发生压疮。

105. 【答案】√。

106. 婴幼儿呼吸时多呈腹式呼吸，7 岁后多数为胸腹式呼吸。

106. 【答案】√。

107. 法洛氏三联症患儿缺氧发作时应将患儿置于侧卧位。

107. 【答案】×。

108. 临床最常见的先天性心脏病是房间隔缺损。

108. 【答案】×。

109. 男患儿，发热、咳嗽、气促、肺部啰音、精神不振，近日来查体发现呼吸突然加快为 70 次/分，心率加快到 180 次/分，则该患儿可能发生了心力衰竭。

109. 【答案】√。

110. 引起夏季小儿腹泻的病原体主要是致病性大肠埃希菌。

110. 【答案】√。

**四、案例分析题（请仔细阅读下面的给定材料，根据所提供的信息，回答 111 至 120 题，题目中的选项至少有一项是符合题意的，请找出恰当的选项）**

患儿，男，7 岁，以“浮肿 3 天”为主诉入院。查体：患儿双眼睑浮肿，尿量减少，尿色加深呈浓茶色，述有头晕现象，BP160/110mmHg，T37.5℃，P90 次/分，R20 次/分。

尿常规显示：WBC（+），RBC（+++）。

根据上述材料，回答下列问题：

111. 该患儿最可能的诊断为：

- A.慢性肾小球肾炎
- B.肾病综合症
- C.急性肾小球肾炎
- D.泌尿系感染

111.【答案】C。

112. 与该病密切相关的致病菌为：

- A.葡萄球菌
- B.溶血性链球菌
- C.流感嗜血杆菌
- D.大肠埃希菌

112.【答案】B。

113. 现在该患儿的护理措施哪项正确：

- A.卧床多休息
- B.低盐饮食
- C.Addis 计数正常后恢复正常生活
- D.2 月内避免剧烈运动

113.【答案】ABC。

114. 本病急性期严重并发症多见：

- A.形成血栓
- B.严重循环充血
- C.高血压脑病
- D.感染

114.【答案】BC。

115. 护理该患儿时，护士需要密切观察的项目有：

- A.血压
- B.尿量、尿色
- C.体温
- D.心率、脉搏

115.【答案】ABD。



某4岁农村小儿，8月份以来1周体温一直偏高，近2天来突起高热， $T39.0^{\circ}\text{C}$ ，伴头痛、恶心、喷射状呕吐，继而出现谵妄、昏睡、定向障碍。查体：患儿呈潮式呼吸，双侧瞳孔等大，对光反射迟钝，脑膜刺激征阳性；脊髓穿刺：脑脊液微浑浊，白细胞为 $4000 \times 10^6 / \text{L}$ ，氯化物低，糖减低，蛋白增高。

根据上述材料，回答下列问题：

116. 该患儿最有可能的诊断为：

- A.病毒性脑炎
- B.化脓性脑炎
- C.结核性脑炎
- D.病毒性脑膜炎：

116. 【答案】B。

117. 脑膜刺激征是指：

- A.颅内压增高
- B.Brudzinski 征阳性
- C.颈项强直
- D.Kering 阳性

117. 【答案】BCD。

118. 若患儿出现颅内压增高的表现，可选用的药物有：

- A.普萘洛尔
- B.20%甘露醇
- C.呋塞米
- D.地塞米松

118. 【答案】BCD。

119. 患儿经治疗48小时后，体温持续不降，伴剧烈呕吐，应考虑患儿最可能并发症了：

- A.脑疝
- B.硬脑膜下积液
- C.脑室管膜炎
- D.脑积水

119. 【答案】B。

120. 该病人主要的护理措施正确的是：

A.头偏右侧卧位

B.冰帽

C.定期测生命体征

D.进食高蛋白流质饮食

120.【答案】ABCD。

## 模拟一

一、判断题（本大题共 20 个小题，每小题 0.5 分，共 10 分。在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

1. 由于右主支气管管腔短粗，与气管纵轴的角度较小，所以异物易落入右主支气管。  
( )

A. 正确                      B. 错误

1. 【答案】A。

2. 肾上腺素注射液见光易分解，故应该避光保存。( )

A. 正确                      B. 错误

2. 【答案】A。

3. 新生儿暖箱内的湿度应该为 45%~55%。( )

A. 正确                      B. 错误

3. 【答案】B。

4. 颅脑术后尿崩症患者 24h 小时尿量在 4000 毫升以上，相对密度在 1.005 以下。  
( )

A. 正确                      B. 错误

4. 【答案】A。

5. 深静脉置管护理要保持穿刺部位周围清洁干燥，敷料每周更换 1~2 次。( )

A. 正确                      B. 错误

5. 【答案】A。

6. 传染性非典型肺炎外周白细胞计数大都偏高。( )

A. 正确                      B. 错误

6. 【答案】B。

7. 十二指肠溃疡可见于老年人，胃溃疡多见于青壮年。（ ）

A. 正确                      B. 错误

7. 【答案】B。

8. 长期鼻饲患者在每次注入营养液时必须检查是否在胃内。（ ）

A. 正确                      B. 错误

8. 【答案】A。

9. 吗啡均适用于心源性哮喘和支气管哮喘。（ ）

A. 正确                      B. 错误

9. 【答案】B。

10. 脑疝晚期出现库欣综合征。（ ）

A. 正确                      B. 错误

10. 【答案】B。

11. Apgar4 分是严重窒息。（ ）

A. 正确                      B. 错误

11. 【答案】B。

12. 支气管哮喘患儿应取坐位或半坐卧位。（ ）

A. 正确                      B. 错误

12. 【答案】A。

13. 骨盆外测量最重要的径线是坐骨结节间径。（ ）

A. 正确                      B. 错误

13. 【答案】B。

14. 多根肋骨骨折易发生反常呼吸。（ ）

A. 正确                      B. 错误

14. 【答案】A。

15. 妊娠糖尿病并发高血压，高血压不易控制，对母儿极其不利。（ ）

A. 正确                      B. 错误

15. 【答案】A。

16. 患者入院之后的舒缓速度，跟医院的环境的好坏有直接关系。（ ）

A. 正确                      B. 错误

16. 【答案】A。

17. 用担架搬运患者时应先将担架稳固地放于地上，然后搬患者于其上。（ ）

A. 正确                      B. 错误

17. 【答案】B。

18. 消化性溃疡最常见的并发症是穿孔。（ ）

A. 正确                      B. 错误

18. 【答案】B。

19. 碘伏是碘和表面活性剂的不定型的络合物。（ ）

A. 正确                      B. 错误

19. 【答案】A。

20. 传染病房间空气消毒可用消毒剂喷洒、擦拭。（ ）

A. 正确                      B. 错误

20. 【答案】B。

二、单项选择题（本大题共 70 小题，每小题 1 分，共 70 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

21. 治疗糖尿病药物拜糖平的服用时间是（ ）。

A. 餐前                      B. 餐后                      C. 睡前                      D. 餐时

21. 【答案】D。

22. 下列属于心室颤动患者的脉搏特征的是（ ）。

- A. 快而规则                      B. 慢而规则                      C. 快而不规则                      D. 摸不到

22. 【答案】D。

23. 急性颅内压增高患者的典型生命体征表现为（ ）。

- A. 脉搏快，呼吸快，血压低                      B. 脉搏快，呼吸快，血压高  
C. 脉搏慢，呼吸慢，血压低                      D. 脉搏慢，呼吸慢，血压高

23. 【答案】D。

24. 关于小儿腹泻治疗措施，下列不正确的是（ ）。

- A. 调整控制饮食                      B. 立即用止泻剂  
C. 控制肠道内、外感染                      D. 调节酸碱平衡

24. 【答案】B。

25. 患儿，女，6岁。全身大面积开水烫伤送来急诊。四肢、后背大面积烫伤，创面红肿、大水疱，未受伤范围包括头、面部、颈部，以及前胸、腹部约8个手掌大的皮肤，估计其烧伤面积为（ ）。

- A. 63%                      B. 67%                      C. 73%                      D. 77%

25. 【答案】D。

26. 急诊负责预检分诊的护士突然接诊14位患者，这些患者均有恶心、呕吐、腹痛、腹泻的症状，该护士应立即（ ）。

- A. 通知医生                      B. 实施抢救  
C. 通知值班医师及抢救室护士                      D. 通知护士长和医务部门

26. 【答案】D。

27. 阿米巴痢疾患者作保留灌肠，采取右侧卧位的目的是（ ）。

- A. 提高疗效                      B. 舒适                      C. 便于操作                      D. 减轻不良反

应

27. 【答案】A。

28. 对COPD患者进行腹式呼吸和缩唇呼吸锻炼，下述说法正确的是（ ）。

- A. 由口吸气                      B. 吸气时腹肌收缩  
C. 由鼻呼气                      D. 呼气时缩拢口唇

28. 【答案】D。

29. 下列肠梗阻中不会出现肿块的是（ ）。

- A. 肠套叠                      B. 肠扭转                      C. 麻痹性肠梗阻                      D. 蛔虫性肠梗阻

阻

29. 【答案】C。

30. 下列浅表软组织感染中，哪项需要床边隔离？（ ）

- A. 疖                      B. 痈                      C. 丹毒                      D. 急性蜂窝织炎

炎

30. 【答案】C。

31. 营养性缺铁性贫血的患儿服用铁剂的同时应加用（ ）。

- A. 维生素 B<sub>12</sub>                      B. 叶酸                      C. 维生素 C                      D. 维生素 B<sub>1</sub>

31. 【答案】C。

32. 下列标准预防措施中，哪项不用洗手？（ ）

- A. 接触患者体液后                      B. 血液后                      C. 尿液后                      D. 药物后

32. 【答案】D。

33. 患者，女性，23岁，诊断为急性肠炎。按医嘱予静脉输液 1500ml，计划 6 小时滴完（点滴系数为 15）。护士应调节输液每分钟滴数为（ ）。

- A. 45 滴                      B. 63 滴                      C. 74 滴                      D. 80 滴

33. 【答案】B。

34. 患者，男性，38岁。因与朋友聚会饮酒后，被送入医院，表现为昏睡、瞳孔散大，血乙醇浓度为 300mg/dl，此时患者处于（ ）。

- A. 兴奋期                      C. 戒断综合征                      B. 嗜睡                      D. 昏迷期

34. 【答案】D。

35. 风湿热最严重的临床表现是（ ）。

- A. 关节炎                      B. 心脏炎                      C. 皮下结节                      D. 环形红斑

35. 【答案】B。

36. 患者，女，38岁，因外阴瘙痒就诊，诊断为外阴炎。建议选用 1:5000 高锰酸钾溶液坐浴，下列说法正确的是（ ）。

- A. 配制溶液水温达 45℃                      B. 如果出现头晕、心慌可以继续坐浴  
C. 病情严重配制溶液时可以提高浓度                      D. 配制溶液浓度为 0.02%

36. 【答案】D。

37. 一男子，50岁，慢性肾炎 10年，治疗后从事日常工作，最近双下肢水肿，血压

140/90mmHg, 首选治疗措施 ( )。

- A. 绝对卧床                      B. 坚持低盐饮食                      C. 利尿降压                      D. 激素治疗

37. 【答案】C。

38. 患者, 男, 40 岁, 在高空劳作时不慎跌落, 意识丧失, 心音消失, 脉搏触不到, 开放气道时应采取 ( )。

- A. 托颌法                      B. 抬颌法                      C. 仰头举颏法                      D. 举颌法

38. 【答案】A。

39. 患者胸腔闭式引流期间, 发现引流管内有血凝块堵塞, 下列护理措施正确的是 ( )。

- A. 通过引流管注入少量生理盐水                      B. 向引流管内注入少量肝素  
C. 引流管接注射器回抽                      D. 由内向外挤捏引流管

39. 【答案】D。

40. 肌内注射定位方法正确的是 ( )。

- A. 臀大肌连线法在髂前上棘与尾骨连线的内 1/3 处  
B. 臀中肌连线法为最高点与尾骨连线的 1/3 处  
C. 股外侧肌为膝关节上 10cm 处  
D. 三角肌为上臂外侧, 肩峰下 2~3 指正中处

40. 【答案】D。

41. 医院发现甲类传染病时, 错误的护理措施是 ( )。

- A. 对患者和病原携带者进行隔离治疗  
B. 对疑似病的密切接触者要在指定场所进行医学观察  
C. 隔离期限根据检查结果  
D. 患者确诊前应住医院传染病房隔离治疗

41. 【答案】D。

42. 普查原发性肝癌首选的检查是 ( )。

- A. 超声检查                      B. AFP 测定                      C. 碱性磷酸酶测定                      D.  $\gamma$ -谷胺酰

转肽酶测定

42. 【答案】B。

43. 高热患者体温超过 39.5℃时, 可采用的物理降温方法是 ( )。

- A. 退热药物                      B. 乙醇拭浴                      C. 降低室温                      D. 开窗通风

43. 【答案】B。



44. 为了保持病室安静，以下做法错误的是（ ）。

- A. 说话轻、走路轻
- B. 病室的门、窗、椅脚应钉上铁皮垫
- C. 推车的轮轴应定期注润滑油
- D. 护士向患者及家属宣传，共同保持

病室安静

44. 【答案】B。

45. 肝昏迷前驱期的主要表现是（ ）。

- A. 轻度性格和行为改变
- B. 扑翼样震颤
- C. 脑电图异常
- D. 意识错乱

45. 【答案】A。

46. 患者，男性，59岁。腹泻1天来门诊就诊。候诊时，突感腹痛难忍，护士应（ ）。

- A. 按先后次序叫号就诊
- B. 加强观察
- C. 要求家属加强照顾
- D. 立即安排提前就诊

46. 【答案】D。

47. 大肠癌术后护理错误的是（ ）。

- A. 术后密切观察生命体征
- B. 胃肠减压患者术后3天如无腹胀，胃肠蠕动恢复、肛门排气后可拔出胃管
- C. 胃管拔除后，患者即可进食少渣饮食
- D. 直肠癌根治术后骶前引流管一般放置5~7天

47. 【答案】C。

48. 患儿，女，5个月，高热伴喷射状呕吐入院。患儿烦躁不安，哭闹不止，前凶隆起，诊断为化脓性脑膜炎。下列哪项措施不妥？（ ）

- A. 保持室内安静
- B. 让患儿平卧位
- C. 护理操作应集中进行
- D. 严密观察生命体征

48. 【答案】B。

49. 患者，女性，48岁，阑尾炎术后第二天，预防术后肠粘连的最关键措施为（ ）。

- A. 给予半坐卧位
- B. 观察腹部情况
- C. 进行深呼吸运动
- D. 早期下床活

动

49. 【答案】D。

50. 不属于胎盘早期剥离的病因是（ ）。

- A. 血管病变
- B. 机械因素
- C. 受精卵游走
- D. 吸烟、吸毒

50. 【答案】C。

51. 查体：体温 39.1℃，脉搏 108 次/min，呼吸 23 次/min。可采用的最佳物理降温方式是（ ）。

- A. 冰帽头部冷敷      B. 温水拭浴      C. 冰袋冷敷      D. 乙醇拭浴

51. 【答案】C。

52. 以下哪项属于冷疗的禁忌症？（ ）

- A. 牙痛      B. 鼻出血      C. 慢性炎症      D. 扁桃体术后

52. 【答案】C。

53. 一位因车祸受伤的患者被送去医院急救，因钱款不够，医生拒绝办理住院手续，当家属拿来钱时，已错过最佳诊治时间，患者死亡。该事件违背了患者的哪一个权利？（ ）

- A. 自主权      B. 知情同意权      C. 平等医疗权      D. 诊治权

53. 【答案】C。

54. 小量咯血尤其是持续性痰中带血，可能是以下哪一种疾病的早期症状？（ ）

- A. 支气管肺癌      B. 自发性气胸      C. 支气管扩张      D. 二尖瓣狭窄

54. 【答案】A。

55. 患者脑血管昏迷，下列哪项护理措施欠妥？（ ）

- A. 密切观察患者生命体征及瞳孔变化      B. 平卧位头偏向一侧  
C. 尿失禁患者需长期留置导尿      D. 保持大便通畅，防止颅内压增高

55. 【答案】C。

56. 患者，男，70 岁，因脑出血急诊入院。目前患者各种反射消失，瞳孔散大，心跳停止，呼吸停止，脑电波平坦，目前患者处于（ ）。

- A. 生物学死亡期      B. 昏睡期      C. 濒死期      D. 临床死亡期

56. 【答案】D。

57. 有机磷农药中毒的主要死因是（ ）。

A. 休克      B. 脑水肿      C. 心力衰竭      D. 肺水肿、呼吸衰竭

57. 【答案】D。

58. 患者，男性，糖尿病，餐前突然感到饥饿难忍、全身无力、心慌、出虚汗，继而神志恍惚，护士应立即采取的措施是（ ）。

A. 协助患者饮糖水      B. 测量血压      C. 静脉取血测血糖      D. 建立静脉通路

58. 【答案】A。

59. 对于牙关紧闭抽搐患者，防舌咬伤可放牙垫于（ ）。

- A. 上、下尖牙之间
- B. 上、下白齿之间
- C. 上、下中切牙之间
- D. 上、下侧切牙之间

59. 【答案】B。

60. 诊断腹腔内脏损伤最有价值的方法是（ ）。

- A. X线
- B. B超
- C. 腹腔穿刺
- D. 腹部体检

60. 【答案】C。

61. 新生儿，女，日龄4天。出生后第三天发现乳腺肿大。目前应采取的护理措施为（ ）。

- A. 立即报告医生，及时诊疗
- B. 将内容物挤出，以免病情变化
- C. 预防性使用抗生素
- D. 无需处理，并告知家长正确认识

61. 【答案】D。

62. 空气栓塞的预防措施不包括（ ）。

- A. 加压输液时应有护士守护在旁
- B. 及时更换输液瓶
- C. 排尽输液管空气
- D. 应控制输液总量和速度

62. 【答案】D。

63. 输液时液体检查与质量无关的是（ ）。

- A. 容器瓶口无松动
- B. 输液器包装完好
- C. 检查地点光线充足
- D. 容器无裂缝

63. 【答案】C。

64. 能扶走的月龄是（ ）。

- A. 6个月
- B. 7个月
- C. 8个月
- D. 10个月

64. 【答案】D。

65. 消化管中最长的一段是（ ）。

- A. 食管
- B. 胃
- C. 十二指肠
- D. 小肠

65. 【答案】D。

66. 传染病区隔离衣的使用方法错误的是（ ）。

- A. 半污染区，清洁面向外
- B. 污染区，清洁面向内
- C. 送消毒时，清洁面向外
- D. 双手消毒后可解袖口

66. 【答案】D。

67. 患者，男，55岁，因肺心病急诊入院，急诊室给予静脉输入抗生素、吸氧，现准备用平车送入病区，护送途中下列哪项错误？（ ）

- A. 注意保暖                      B. 注意安全                      C. 暂停输液、吸氧                      D. 安置合适卧位

67. 【答案】C。

68. 属于主观资料的是（ ）。

- A. 血压 130/80mmHg                      B. 骶尾部皮肤破损 2cm×2cm  
C. 肌张力 3 级                      D. 头昏脑涨

68. 【答案】D。

69. 昏迷患者出现鼾声呼吸，属于异常呼吸中的（ ）。

- A. 深浅度异常                      B. 呼吸困难                      C. 声音异常                      D. 频率异常

69. 【答案】C。

70. 口腔真菌感染时，应用哪种漱口液？（ ）

- A. 1%~4%碳酸氢钠溶液                      B. 朵贝尔氏液  
C. 1%~3%过氧化氢溶液                      D. 2%~3%硼酸溶液

70. 【答案】A。

71. 大量不保留灌肠时，灌肠筒的液面高度应高于肛门（ ）。

- A. 10~20cm                      B. 30~50cm                      C. 30~40cm                      D. 40~60cm

71. 【答案】D。

72. 链霉素变态反应时，使用葡萄糖酸钙的目的是（ ）。

- A. 维持血压                      B. 解除支气管痉挛                      C. 使毒性症状减轻                      D. 兴奋呼吸中枢

72. 【答案】C。

73. 可以引起脉压增大的疾病（ ）。

- A. 心包积液                      B. 心包炎                      C. 主动脉关闭不全                      D. 低血压

73. 【答案】C。

74. 应给予鼻饲饮食的患者是（ ）。

- A. 婴幼儿                      B. 经常呕吐者                      C. 拒绝进食者                      D. 食欲低下者

74. 【答案】C。

75. 不能杀灭芽胞的化学消毒剂是（ ）。

- A. 环氧乙烷                      B. 新洁尔灭                      C. 过氧乙酸                      D. 甲醛

75. 【答案】B。

76. 患者处于安全的需要最希望（ ）。

- A. 由有知识、负责任护士的照顾  
B. 了解有关用药方面的知识  
C. 家属能够经常来院陪伴  
D. 尽量不要用药物治疗

76. 【答案】B。

77. 肺炎球菌肺炎患者如何吸氧？（ ）

- A. 高流量面罩吸氧  
B. 4~6L/min 经酒精湿化吸氧  
C. 2~4L/min 鼻导管吸氧  
D. 1~2L/min 持续鼻导管吸氧

77. 【答案】C。

78. 有机磷中毒所致急性肺水肿，抢救首选（ ）。

- A. 哌替啶  
B. 西地兰  
C. 氨茶碱  
D. 阿托品

78. 【答案】D。

79. 特别容易产生分离性焦虑的儿童年龄阶段是（ ）。

- A. 6个月~1岁  
B. 2~3岁  
C. 4~5岁  
D. 5~6岁

79. 【答案】A。

80. 患者出院当日的护理，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 处理床单位  
B. 通知病员在出院处办理出院手续  
C. 停止患者一切医嘱和各项记录  
D. 医疗文件立即送病案室保存

80. 【答案】D。

81. 化疗最严重的毒性反应是（ ）。

- A. 胃肠道反应  
B. 脱发  
C. 脉管炎  
D. 骨髓抑制

81. 【答案】D。

82. 患者，男，70岁。高血压治疗2周，今晨起上厕所不慎滑倒造成颈椎骨折，即转至骨科治疗。平车运送时宜采用（ ）。

- A. 一人搬运法  
B. 二人搬运法  
C. 三人搬运法  
D. 四人搬运法

82. 【答案】D。

83. 甲状腺<sup>131</sup>I试验饮食，下列说法正确的是（ ）。

- A. 协助诊断甲状腺功能  
B. 试验期前七天禁用含碘食物  
C. 试验期为1周  
D. 不需禁止局部皮肤碘消毒

83. 【答案】A。

84. 某男，被汽车撞伤30分钟后入院，神志清醒，血压140/90mmHg，诊断骨盆骨折、

左股骨骨折，据此可断定他属于（ ）。

- A. 多处伤                      B. 联合伤                      C. 复合伤                      D. 多发伤

84. 【答案】D。

85. 发热持续期患者主要表现的症状，下列叙述正确的是（ ）。

- A. 畏寒、皮肤苍白、无汗，严重者有寒战  
B. 颜面潮红、呼吸和脉搏加快、全身酸痛、乏力、食欲不振  
C. 血压下降、脉搏细数、四肢冰冷等虚脱现象  
D. 脉搏、呼吸减慢，大量出汗

85. 【答案】B。

86. 动静脉内瘘是以下哪一种血液透析通路？（ ）

- A. 临时性                      B. 永久性                      C. 非创伤性                      D. 快速性

86. 【答案】B。

87. 母乳的优点不包括（ ）。

- A. 含酪蛋白多                      B. 钙、磷比例适宜                      C. 含不饱和脂肪酸多                      D. 含乙型乳糖

87. 【答案】A。

88. 在护理躯体感觉障碍患者时，错误的措施是（ ）。

- A. 注意保暖可用热水袋                      B. 温水擦洗按摩  
C. 进行患肢被动运动                      D. 伴瘫痪时协助翻身

88. 【答案】A。

89. 疟疾患者采血的时间为（ ）。

- A. 定时                      B. 空腹                      C. 畏寒、发热时                      D. 夜间熟睡时

89. 【答案】C。

90. 弥散性血管内凝血早期最常见的临床表现是（ ）。

- A. 贫血                      B. 低血压                      C. 出血                      D. 休克  
E. 发热

90. 【答案】C。

三、多选题（本大题共 5 题，每小题 2 分，共 10 分。以下每一道考题下面有几个备选答案。其中有两个或两个以上正确答案。请从中选择所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。正确答案错选、多选或未选均不得分。）

91. 新生儿呕吐的原因有（ ）。

- A. 喂养不当                      B. 胃肠功能紊乱                      C. 感染性疾病                      D. 中枢神经系统疾病

91. 【答案】ABCD。

92. 哪种疾病患者需要专人陪护？（ ）

- A. 情绪十分消极者                      B. 司法鉴定精神患者  
C. 智能障碍患者                      D. 有意识障碍，出现幻觉者

92. 【答案】ABCD。

93. 对慢性支气管炎或慢性阻塞性肺气肿患者的护理应注意（ ）。

- A. 限制进水量，以预防心力衰竭  
B. 痰多、无力咳出者应注意防止呼吸道阻塞  
C. 预防呼吸道感染，避免呼吸道刺激  
D. 指导患者进行呼吸功能锻炼

93. 【答案】BCD。

94. 关于脑卒中后遗症期康复护理，正确的是（ ）。

- A. 心理护理                      B. 用具指导                      C. 日常生活训练指导                      D. 轮椅训练指导

94. 【答案】ABCD。

95. 妊娠合并急性病毒性肝炎使下列何项的发生率增高？（ ）

- A. 流产                      B. 死胎、死产、畸胎                      C. 早产                      D. 围生期感染

95. 【答案】ABCD。

四、案例分析（本大题共 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。请根据考题所提供的案例，在每一道考题给出的几个备选答案中选择 1 个最佳答案，在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

**案例：**章女士，50 岁。肝硬化病史 10 年，午饭后突然呕吐褐色胃内容物，量约 500ml，

来院急诊。

96. 出血部位最可能在（ ）。

- A. 食管中上段      B. 食管下段及胃底      C. 十二指肠      D. 胃体

96. 【答案】B。

97. 首选的治疗措施是（ ）。

- A. 保肝治疗      B. 静脉滴注奥曲肽  
C. 双气囊三腔管压迫止血      D. 口服去甲肾上腺素稀释液

97. 【答案】B。

**案例：**患者，女，56岁，肺结核2年，近来出现咯血，咯血部位尚未明确，晨起活动后突然出现大咯血。

98. 大咯血最易出现的并发症是（ ）。

- A. 癌变      B. 肝肾综合征      C. 肝昏迷      D. 窒息

98. 【答案】D。

99. 下列各项，肺结核大咯血时首选止血剂是（ ）。

- A. 氨基己酸      B. 氨甲苯酸      C. 垂体后叶素      D. 安络血

99. 【答案】C。

**案例：**男性，70岁，意识障碍，有时谵妄，行为失常，呼气有肝臭味，3d未排大便。

100. 患者怕羞、怕痛苦、怕感染而拒绝插导尿管时，护士采取的护理措施不妥的是（ ）。

- A. 耐心解释插管的目的      B. 插管时用屏风遮挡患者  
C. 说明留置尿管的注意事项      D. 报告医生改用其他方法

100. 【答案】D。

101. 患者严重便秘，大量不保留灌肠，禁用的溶液是（ ）。

- A. 生理盐水      B. “1、2、3”溶液      C. 肥皂水      D. 甘油加水

101. 【答案】C。

102. 禁用该灌肠液的目的是（ ）。

- A. 防止电解质失衡      B. 防止腹胀  
C. 防止肠系膜黏连      D. 减少氨的产生与吸收

102. 【答案】D。

**案例：**患者，男性，45岁，体重65kg。因结肠癌手术后发生肠痿3个月余，主诉



乏力、食欲减退、恶心呕吐。体格检查：明显消瘦、精神萎靡、反应迟钝、腹胀，肠鸣音减弱，腱反射消失。

103. 该患者可能的代谢紊乱是（ ）。

- A. 高钾血症                      B. 代谢性酸中毒                      C. 高渗性脱水                      D. 低钾血症

103. 【答案】D。

104. 应该给予补充的液体是（ ）。

- A. 5%葡萄糖溶液                      B. 5%碳酸氢钠                      C. 平衡盐溶液                      D. 10%氯化钾

加入晶体液中

104. 【答案】D。

**案例：**孕妇，29岁，孕36周。因抽搐数次急诊入院。查体：眼球固定，瞳孔散大，牙关紧闭，双手紧握，血压170/120mmHg。应考虑为（ ）。

- A. 子痫前期                      B. 子痫                      C. 癫痫                      D. 妊娠水肿

105. 【答案】B。

## 五、附加题（共15道）

1. 膝关节骨性关节炎最主要的一项症状是（ ）。

- A. 关节僵直                      B. 关节疼痛                      C. 关节绞锁                      D. 关节积液  
E. 关节红肿

1. 【答案】B。

2. 再生障碍性贫血最理想的治疗是（ ）。

- A. 雄激素                      B. 泼尼松                      C. 脾切除                      D. 免疫抑制药  
E. 同卵孪生兄弟骨髓移植

2. 【答案】E。

3. 超声波雾化吸入，不要消毒的物品是（ ）。

- A. 雾化罐                      B. 螺纹管                      C. 口含嘴                      D. 水槽  
E. 面罩

3. 【答案】D。

4. 小儿高热惊厥的紧急处理，错误的是（ ）。

- A. 惊厥发作时立即搬至抢救室进行抢救                      B. 及时清除口鼻咽分泌物，保持呼吸道通畅

- C. 密切观察生命体征、瞳孔及神志改变      D. 专人守护，防止坠床和碰伤

4. 【答案】A。

5. 导致心脏骤停的心源性原因是（ ）。

- A. 呼吸停止      B. 严重的电解质与酸碱平衡失调  
C. 主动脉疾病      D. 药物中毒或过敏  
E. 电击、雷击或溺水

5. 【答案】C。

6. 治疗冠心病、心绞痛首选（ ）。

- A. 丹参      B. 郁金      C. 延胡索      D. 益母草

6. 【答案】A。

7. 急性鼻窦炎的疼痛特点（ ）。

- A. 前额部痛，晨起轻，午后重  
B. 一般头痛较轻，局限于内眦或鼻根部，也可放射至头顶部  
C. 鼻根部疼痛，伴额顶部疼痛  
D. 前额部周期性疼痛  
E. 颅底或眼球深部钝痛，可放射至头顶、耳后

7. 【答案】D。

8. 新生儿用物准备，不正确的是（ ）。

- A. 新生儿衣物宜柔软宽大  
B. 衣缝在正面防止摩擦新生儿的皮肤  
C. 尿布宜用质地柔软吸水透气性好的纯棉织品  
D. 均需准备奶瓶、奶粉  
E. 洗涤用品要求柔和无刺激性

8. 【答案】D。

9. 对术者的下列行为，护士需要提醒其纠正的是（ ）。

- A. 术者双手保持在无菌台面以上      B. 术者面对面更换位置  
C. 术者肘部接触有菌区后戴无菌袖套      D. 手术区无菌巾浸湿后立即加盖无菌

巾

- E. 胃肠切开前垫好纱垫

9. 【答案】B。

10. 霍乱患者由于下列哪项，临床上会出现剧烈水样腹泻？（ ）

- A. 细菌的内毒素引起肠细胞分泌功能增加
- B. 细菌的外毒素激活环磷腺苷介导系统引起小肠过度分泌
- C. 活菌产生的酶引起黏膜损害和炎症
- D. 弧菌溶血引起自主神经系统失调
- E. 胆汁分泌减少引起肠道功能紊乱

10. 【答案】B。

11. 伦理是道德现象的（ ）。

- A. 进步化和理论化
- B. 进步化和系统化
- C. 理论化和实践化
- D. 系统化和理论化

11. 【答案】D。

12. 倾听对方谈话时以下均要注意观察，但哪一项除外？（ ）

- A. 流畅程度
- B. 沉默方式
- C. 面部表情
- D. 用词选择
- E. 音调大小

12. 【答案】B。

13. 属脂溶性维生素的是（ ）。

- A. 维生素 B<sub>1</sub>
- B. 维生素 C
- C. 维生素 D
- D. 维生素 B<sub>6</sub>
- E. 维生素 PP

13. 【答案】C。

14. 恶性肿瘤病理分级的根据是（ ）。

- A. 肿瘤生长快慢
- B. 肿瘤的生长方式及浸润性
- C. 有无复发或转移
- D. 肿瘤细胞的组织学分化程度

14. 【答案】D。

15. 下列长期医嘱错误的是（ ）。

- A. 外科二级护理
- B. 普萘洛尔 10mg po tid
- C. 链霉素 0.75g im qd
- D. 阿托品 0.5mg im st
- E. 安体舒通 20mg po tid

15. 【答案】D。

## 模拟二

一、单项选择题（本大题共 90 小题，每小题 0.75 分，共 67.5 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

1. 体内贮存铁的形式是（ ）。

- A. 血清铁                      B. 转铁蛋白                      C. 总铁结合力                      D. 转铁蛋白饱和度  
E. 铁蛋白和含铁血黄素

1. 【答案】E。

2. 急性腹痛发作时，患者双腿蜷曲的目的是（ ）。

- A. 舒适                      B. 求助于他人                      C. 减轻疼痛                      D. 安全  
E. 习惯动作

2. 【答案】C。

3. 促进病人睡眠的措施中，下面不正确的是（ ）。

- A. 缓解疼痛                      B. 改变病人的睡眠习惯  
C. 消除焦虑                      D. 舒适体位  
E. 创造良好的睡眠环境

3. 【答案】B。

4. 医疗卫生法是由国家制定或认可的，并由国家（ ）。

- A. 推广实行                      B. 制定                      C. 强制力保证实施                      D. 会议参考  
E. 提供

4. 【答案】C。

5. 体温过低是指体温低于（ ）。

- A.  $T < 36^{\circ}\text{C}$                       B.  $T < 35^{\circ}\text{C}$                       C.  $T \leq 36^{\circ}\text{C}$                       D.  $T < 34^{\circ}\text{C}$   
E.  $T \leq 34^{\circ}\text{C}$

5. 【答案】B。

6. 不属于临时医嘱的为（ ）。

- A. 青霉素 80 万单位 im st                      B. 心电图

C. B超

D. 流质饮食

E. 传染科会诊

6. 【答案】D。

7. 应在冰箱中保存的药物是（ ）。

A. 维生素C

B. 乙醇

C. 环氧乙烷

D. 抗毒血清

E. 乙醚

7. 【答案】D。

8. 适用于抢救病人的护理工作方式是（ ）。

A. 综合护理

B. 责任制护理

C. 小组制护理

D. 功能制护理

E. 个案护理

8. 【答案】E。

9. 属于长期备用医嘱的是（ ）。

A. 一级护理

B. 地西洋 5mg qn prn

C. 饮食

D. 氧气吸入

E. 青霉素 80 万 U im q6h

9. 【答案】B。

10. 低血糖的定义是（ ）。

A. 血糖值小于 4.2mmol/L

B. 血糖值小于 3.8mmol/L

C. 血糖值小于 3.0mmol/L

D. 血糖值小于 2.8mmol/L

E. 血糖值小于 2.0mmol/L

10. 【答案】D。

11. 组织损伤、破裂的患者局部禁用冷疗的理由是（ ）。

A. 防止冻伤

B. 以防引起反射性心率减慢、心房纤颤或心室纤颤及房室传导阻滞

C. 以防引起腹泻

D. 因冷可降低血液循环，增加组织损伤，且影响伤口愈合

E. 以防反射性末梢血管收缩，影响散热或引起一过性冠状动脉收缩

11. 【答案】D。

12. 社区卫生服务的对象通常是（ ）。

A. 需要接受社区康复的人

B. 育龄夫妇

C. 儿童及老年人

D. 具有健康问题倾向的高危人群

E. 社区全体居民

12. 【答案】E。

13. 休克病人应采取的体位是（ ）。

A. 中凹位                      B. 侧卧位                      C. 半坐卧位                      D. 端坐位

E. 头高脚低位

13. 【答案】A。

14. 空气栓塞时栓子的流动路径为（ ）。

A. 右心房→右心室→肺动脉                      B. 右心室→右心房→肺动脉

C. 肺动脉→右心室→右心房                      D. 肺动脉→右心房→右心室

E. 右心房→肺动脉→右心室

14. 【答案】A。

15. 护理程序的评价标准包括护理诊断的（ ）。

A 真实性、系统性、完整性                      B. 正确性、完整性、规范性

C. 针对性、全面性、有效性                      D. 及时性、可行性、全面性

E. 准确性、有效性、及时性

15. 【答案】B。

16. 股骨干骨折用石膏绷带固定的患者需采用（ ）。

A. 平车 1 人搬运法      B. 平车 2 人搬运法      C. 平车 3 人搬运法      D. 平车 4 人搬

运法

E. 轮椅运送法

16. 【答案】C。

17. 在加强危重病人护理工作中正确的是（ ）。

A. 加强口腔护理可有效预防中耳炎等的发生

B. 昏迷病人应经常拍打病人胸前区，促进痰液咳出

C. 尽早给予留置导尿管，可有效预防皮肤完整性受损

D. 危重病人消化功能减退，早期应禁食

E. 昏迷病人必须使用约束带，防止非计划性拔管的发生

17. 【答案】A。

18. 有效预防氧疗过程中肺不张发生的措施是（ ）。

A. 病人卧床休息，尽量减少活动                      B. 保证  $FiO_2 \geq 60\%$

C. 维持  $PaO_2 \geq 100\text{mmHg}$                       D. 吸氧时间越长，肺不张发生的几率

越小

E. 经常变换体位，多咳嗽

18. 【答案】E。

19. 活塞型注射泵的特点是（ ）。

A. 充电系统复杂      B. 体积大      C. 携带小心      D. 可测定实际

输液量

E. 便于急救使用

19. 【答案】E。

20. 膀胱刺激征的表现是（ ）。

A. 尿急、尿痛、尿频      B. 尿频、尿急、尿多

C. 尿频、尿多、尿痛      D. 尿急、腰痛、尿频

E. 尿多、尿急、尿痛

20. 【答案】A。

21. 进入人体无菌组织、器官或接触破损皮肤黏膜的医疗用品必须达到（ ）。

A. 灭菌，不得检出致病微生物

B. 灭菌，不得检出沙门菌

C. 灭菌，不得检出乙型溶血性链球菌

D. 灭菌，不得检出金黄色葡萄球菌

E. 灭菌，不得检出任何微生物

21. 【答案】E。

22. 护士为破伤风患者更换敷料后的处理方法是（ ）。

A. 过氧乙酸浸泡后清洗

B. 高压灭菌后再清洗

C. 丢入污物桶后再集中处理

D. 日光下晒后清洗

E. 焚烧处理

22. 【答案】E。

23. 采集标本的正确方法是（ ）。

A. 若患者正在输液，为了避免再次穿刺可直接从输液针头抽血

B. 若患者血管暴露不明显，可尽可能地延长止血带压迫时间，直至血管暴起

C. 为了便于抽血，止血带尽可能绑紧

D. 若采血比较费力，可用手挤压局部组织迫使血液流出

E. 抽得血液后，应先将针头卸掉，再将血液沿试管壁徐徐注入试管内

23. 【答案】E。

24. 可促进钙、磷吸收的是（ ）。

- A. 维生素 A                      B. 维生素 B<sub>1</sub>                      C. 维生素 D                      D. 维生素 PP  
E. 叶酸

24. 【答案】C。

25. 恶性骨肿瘤病人一般疼痛时 ( )。

- A. 应用可待因                      B. 保持舒适体位，转移注意力  
C. 应用吗啡                      D. 应用氯丙嗪  
E. 应用非麻醉性药物

25. 【答案】E。

26. 急性胃肠炎呕吐的特点是 ( )。

- A. 呕吐物为酸性食物                      B. 有大便臭味  
C. 隔夜饮食                      D. 大量鲜红液  
E. 大量咖啡液

26. 【答案】A。

27. 有关皮下注射的正确叙述是 ( )。

- A. 可以注射 3ml 药液                      B. 用 70%乙醇消毒一次  
C. 有强刺激性的药物可皮下注射                      D. 进针后先抽吸检查有无回血  
E. 注射部位只有上臂

27. 【答案】D。

28. 注射青霉素引起血清病型反应，常发生在注射后 ( )。

- A. 1~4 天                      B. 4~7 天                      C. 7~14 天                      D. 10~15 天  
E. 15~20 天

28. 【答案】C。

29. 慢性胃炎最可靠的确诊方法是 ( )。

- A. 胃液分析                      B. 血清学检查                      C. 胃镜检查                      D. 活组织检查  
E. 幽门螺杆菌检查

29. 【答案】C。

30. 留置中心静脉导管引起的并发症有 ( )。

- A. 气胸                      B. 血栓性静脉炎                      C. 肠源性感染                      D. 脓毒血症  
E. 高血脂

30. 【答案】A。

31. 关于甲状腺 <sup>131</sup>I 试验饮食，下列说法正确的是 ( )。



- A. 协助诊断甲状腺功能  
B. 试验期前七天禁用含碘食物  
C. 试验期为1周  
D. 不需禁止局部皮肤碘消毒  
E. 4周后做<sup>131</sup>I机能测定

31. 【答案】A。

32. 不宜早期使用营养支持疗法的疾病是（ ）。

- A. 短肠综合征                  B. 大面积烧伤                  C. 重症胰腺炎                  D. 休克  
E. 肿瘤放、化疗

32. 【答案】D。

33. 破伤风抗毒素过敏试验的阳性体征是（ ）。

- A. 硬结小于0.5cm, 红晕小于2cm                  B. 硬结大于0.5cm, 红晕小于4cm  
C. 硬结小于1cm, 红晕小于4cm                  D. 硬结小于1cm, 红晕大于2cm  
E. 硬结大于1.5cm, 红晕大于4cm

33. 【答案】E。

34. 一位患者进行肌力检查时,四肢体自主抬离床面,但医生用手轻压即落,该患者肌力属于（ ）。

- A. 1级                          B. 2级                          C. 3级                          D. 4级  
E. 5级

34. 【答案】C。

35. 不整脉为（ ）。

- A. 每分钟超过100次                          B. 脉搏骤起骤落,急促有力  
C. 脉搏一强一弱,交替出现,但节律正常                  D. 平静吸气时,脉搏明显减弱或消失  
E. 脉搏不规则的搏动

35. 【答案】E。

36. 治疗性环境要求的适宜温度是（ ）。

- A. 16℃~18℃                  B. 18℃~22℃                  C. 22℃~24℃                  D. 23℃~25℃  
E. 25℃~27℃

36. 【答案】B。

37. 急性病容为（ ）。

- A. 病人面色潮红,烦躁不安,呼吸急促,痛苦呻吟  
B. 病人面容枯槁,面色灰白或发绀,表情淡漠,眼眶凹陷,目光无神,皮肤湿冷,甚至大汗淋漓

- C. 病人面容病人面容憔悴，面色苍白或灰暗，精神萎靡、瘦弱无力
- D. 病人面色晦暗、口唇微绀、两面颊呈淤血性的发红
- E. 病人面容惊愕、眼裂增宽、眼球凸出、目光炯炯有神、情绪激动易变

37. 【答案】A。

38. 肠内营养液输注时最合适的温度应（ ）。

- A. 40℃
- B. 42℃
- C. 37℃
- D. 34℃
- E. 36℃

38. 【答案】A。

39. 符合恶性肿瘤治疗原则的是（ ）。

- A. 所有晚期肿瘤均以对症治疗为主
- B. 早期恶性肿瘤以手术治疗为主
- C. 肿瘤最有效的治疗为化学治疗
- D. 肿瘤的性质是决定治疗方法的唯一

依据

E. 晚期胃癌以免疫治疗为主

39. 【答案】B。

40. 入院时要进行沐浴的患者是（ ）。

- A. 急性心肌梗死
- B. 急性胰腺炎
- C. 脑出血
- D. 食道静脉破

裂出血

E. 慢性肾小球肾炎

40. 【答案】E。

41. 下列哪项不是脑出血常见的临床表现？（ ）

- A. 截瘫
- B. 偏瘫
- C. 头痛
- D. 意识障碍
- E. 大小便失禁

41. 【答案】A。

42. 过氧乙酸使用的注意事项错误的是（ ）。

- A. 对金属有腐蚀性
- B. 对织物有漂白作用
- C. 遇热和光照可氧化分解
- D. 高热和光照可引起爆炸
- E. 使用前应尽早配置

42. 【答案】E。

43. 肠内营养置管并发症是（ ）。

- A. 电解质紊乱
- B. 吸入性肺炎
- C. 鼻咽及食管黏膜损伤
- D. 恶心、呕吐、腹痛、腹胀

E. 以上都不是

43. 【答案】C。

44. 下列属于高效灭菌剂的有（ ）。

A. 2%碘酊                      B. 0.2%苯扎溴铵                      C. 75%酒精                      D. 0.2%过氧乙

酸

E. 0.5%碘伏

44. 【答案】D。

45. 心房纤颤患者可见（ ）。

A. 间歇脉                      B. 绀脉                      C. 水冲脉                      D. 交替脉

E. 奇脉

45. 【答案】B。

46. 缓解病人不舒适的首要措施是（ ）。

A. 了解引起病人不舒适的原因                      B. 给病人心理支持

C. 使病人处于舒适体位                      D. 缓解疼痛

E. 调整环境

46. 【答案】A。

47. 对胸痛患者的护理措施中下列哪一项不妥？（ ）

A. 稳定情绪                      B. 注意休息                      C. 常规使用镇痛剂                      D. 宽胶布固定

患侧胸廓

E. 胸膜炎者取患侧卧位

47. 【答案】C。

48. 下列哪一项属于影响饮食和营养的生理因素？（ ）

A. 营养知识                      B. 活动量                      C. 饮食习惯                      D. 食物的色、

香、味

E. 食物过敏

48. 【答案】B。

49. 直肠或肛门狭窄时，粪便呈（ ）。

A. 栗子样                      B. 便条状或带状                      C. 水样便                      D. 血便

E. 果酱样便

49. 【答案】B。

50. 下列由红细胞成熟障碍引起贫血的是（ ）。

A. 白血病                      B. 再生障碍性贫血                      C. 淋巴瘤                      D. 巨幼细胞贫血

E. 骨髓瘤

50. 【答案】D。

51. 阴道灌洗常用的药液为（    ）。

A. 1:10000 高锰酸钾溶液

B. 0.02%的碘伏溶液

C. 10%温无菌肥皂溶液

D. 0.2%乳碳溶液

E. 1%醋酸溶液

51. 【答案】B。

52. 外阴部手术后伤口加压包扎的时间是（    ）。

A. 24 小时

B. 8 小时

C. 10 小时

D. 48 小时

E. 72 小时

52. 【答案】A。

53. 正常脐带内有（    ）。

A. 1 条脐动脉，2 条脐静脉

B. 2 条脐动脉，1 条脐静脉

C. 1 条脐静脉，1 条脐动脉

D. 2 条脐静脉，2 条脐动脉

E. 1 条脐动脉，3 条脐静脉

53. 【答案】B。

54. 分娩正式发动的表现是（    ）。

A. 见红

B. 胎膜早破

C. 下腹隐痛

D. 规律宫缩

E. 胎儿下降感

54. 【答案】D。

55. 妊娠合并心脏病开始使用抗生素预防感染的合适时机是（    ）。

A. 无论什么时候使用均可

B. 产后立即给予抗生素

C. 分娩期开始使用至产后 1 周

D. 分娩期开始持续至整个产褥期

E. 分娩期开始使用 3 天

55. 【答案】C。

56. 关于胎盘剥离征象下列不正确的是（    ）。

A. 宫底升高

B. 宫体变硬，呈球形

C. 阴道少量出血

D. 于耻骨联合上压子宫下段，脐带回

缩

E. 于耻骨联合上压子宫下段，脐带不回缩

56. 【答案】D。

57. 失败率最低的避孕方法是（ ）。

- A. 避孕套                      B. 宫内节育器                      C. 按规定口服避孕药      D. 阴道隔膜  
E. 安全期避孕

57. 【答案】C。

58. 羊水几度污染者要求在胎肩娩出前吸净胎儿鼻、咽部黏液？（ ）

- A. I 度                      B. II 度                      C. III 度                      D. IV 度  
E. V 度

58. 【答案】C。

59. 分娩期一旦发现子宫先兆破裂，首选的措施是（ ）。

- A. 抗休克，静脉输液、输血                      B. 停止一切操作，抑制宫缩  
C. 行阴道助产，尽快结束分娩                      D. 大量抗生素预防感染  
E. 安静休息，左侧卧位

59. 【答案】B。

60. 以下骨盆外测量径线，哪一项是错误的？（ ）

- A. 髂棘间径 23~26cm                      B. 髂嵴间径 24~29cm  
C. 骶耻外径 18~20cm                      D. 坐骨结节间径 8.5~9.5cm  
E. 耻骨弓角度正常为 90°

60. 【答案】B。

61. 正常新生儿 Apgar 评分为（ ）。

- A. >3 分                      B. 7~10 分                      C. 8~10 分                      D. 4~6 分  
E. <3 分

61. 【答案】C。

62. 血容量于分娩后可恢复至未孕状态的时间是（ ）。

- A. 产后 2~3 周                      B. 产后 6~8 周                      C. 产后 4 周                      D. 产后 6 周  
E. 产后 8~10 周

62. 【答案】A。

63. 雌激素的生理作用包括下列哪一项？（ ）

- A. 降低妊娠子宫对催产素的敏感性                      B. 使子宫内膜增生  
C. 使宫颈粘液减少，变稠，拉丝度减少                      D. 使阴道上皮细胞脱落加快

E. 以上都不是

63. 【答案】B。

64. 在给产妇挤奶前应先刺激（ ）。

- A. 泌乳反射                      B. 射乳反射                      C. 喷乳反射                      D. 缩宫素反射  
E. 乳腺管收缩

64. 【答案】B。

65. 产后会阴侧切伤口时，水肿严重者局部可用（ ）。

- A. 50%硫酸镁湿热敷      B. 50%硫酸镁湿冷敷      C. 75%酒精湿敷                      D. 95%酒精湿敷

敷

E. 2.5%碘伏

65. 【答案】A。

66. 骨盆轴的方向组成，正确的是（ ）。

- A. 上段向下向后，中段向下，下段向下向后  
B. 上段向下向前，中段向下，下段向下向后  
C. 上段向下向后，中段向前，下段向下向前  
D. 上段向下向后，中段向下，下段向下向前  
E. 上段向下向前，中段向下，下段向上向前

66. 【答案】D。

67. 下列哪项不是胎儿宫内窘迫急行剖宫产术的指征？（ ）

- A. 胎心率 $<110$ 次/分，伴羊水II度粪染                      B. 羊水III度粪染  
C. 胎儿头皮血pH $<7.2$     D. 胎心监护反复出现早期减速  
E. 胎心监护胎儿曲线呈正弦波

67. 【答案】D。

68. 有关急产，下列正确的是（ ）。

- A. 总产程不超过3小时    B. 由于宫缩强，发生产后出血的可能性较小  
C. 不容易发生新生儿的窒息或颅内出血                      D. 子宫肌纤维缩复好  
E. 产程快，产妇会阴不容易裂伤

68. 【答案】A。

69. 有关胎心音不正确的是（ ）。

- A. 正常胎心率为110~160次/分

- B. 孕 6 个月前胎心多在脐下正中听到
- C. 孕 7 个月后左枕前位在母体左下腹听到胎心
- D. 孕 6 个月后胎心多在胎背部听到
- E. 臀位 7 个月月在脐部听到胎心

69. 【答案】E。

70. 下列是产钳术适应证的是（ ）。

- A. 胎儿畸形
- B. 第二产程延长
- C. 额先露
- D. 面先露
- E. 死胎

70. 【答案】B。

71. 胎龄 29 周，出生体重 1480g，诊断为（ ）。

- A. 低出生体重儿
- B. 极低出生体重儿
- C. 超低体重儿
- D. 巨大儿
- E. 正常出生体重儿

71. 【答案】B。

72. 某女，35 岁。生育史：0-0-0-0，妊娠足月临产，滞产，胎儿、胎盘娩出后，出现间歇性阴道流血，量较多，混有血块。检查：子宫体柔软，轮廓不清，其出血原因最大可能是（ ）。

- A. 子宫收缩乏力
- B. 子宫胎盘卒中
- C. 软产道损伤
- D. 凝血功能障碍
- E. 胎盘早剥

72. 【答案】A。

73. 初产妇，胎儿娩出后无阴道流血，胎盘娩出后阴道流血不断，时多时少。1 小时内出血量超过 600ml，血压 68/45mmHg，脉搏 126 次/分。此时应采取的紧急措施是（ ）。

- A. 为宫颈裂伤，立即缝合
- B. 为阴道血肿，立即处理
- C. 检查凝血功能，并输纤维蛋白原
- D. 静注麦角新碱加强宫缩
- E. 快速输液、输血

73. 【答案】D。

1. 阴道流血 胎儿娩出后立即发生阴道流血，色鲜红，应考虑软产道裂伤；胎儿娩出后数分钟出现阴道流血，色暗红，应考虑胎盘因素；胎盘娩出后阴道流血较多，应考虑子宫收缩乏力或胎盘、胎膜残留；胎儿娩出后阴道持续流血，且血液不凝，应考虑凝血功能障碍；失血表现明显，伴阴道疼痛而阴道流血不多，应考虑隐匿性软产道损伤，如阴道血肿。

74. 某女，27 岁，初孕妇，现孕 34 周，出现头痛、眼花而就诊，产前检查发现体重突然增加每周 1.5kg。检查：血压 160/115mmHg，尿蛋白 5.5g/24h，下肢水肿（++）。

应诊断为（ ）。

- A. 轻度妊高征                      B. 中度妊高征                      C. 先兆子痫                      D. 重度妊高征  
E. 妊娠合并心脏病

74. 【答案】C。

75. 产妇，28岁，其床单和衣物被血污染，洗涤时应遵循的原则是（ ）。

- A. 混合清洗、消毒                      B. 单独清洗、消毒  
C. 混合消毒、单独清洗                      D. 混合消毒、混合清洗  
E. 单独清洗，不消毒

75. 【答案】B。

76. 心肌梗死患者，通过及时的治疗和护理病情好转，按医嘱停用鼻导管吸氧，护士应首先（ ）。

- A. 拔出鼻导管                      B. 关流量表                      C. 取湿化瓶                      D. 松导管玻璃接头  
E. 关总开关

76. 【答案】A。

77. 某28岁女性患者，产前检查发现尿糖(++)，血糖9.8mmol/L，糖耐量减退，胰岛素释放延迟，无“三多一少”症状，产后仍有持续性血糖偏高，糖耐量减退。你认为主要的保健指导内容是（ ）。

- A. 学会胰岛素注射方法                      B. 注意饮食控制  
C. 学会尿糖定性试验测定法                      D. 绝对卧床休息，保证充足睡眠  
E. 观察低血糖反应与酮症酸中毒

77. 【答案】B。

78. 患者，女性，28岁。妊娠3个月合并甲亢，治疗选择（ ）。

- A. 待分娩后治疗甲亢    B. 首选药物治疗                      C. 首选手术治疗                      D. 首选放射性<sup>131</sup>I治疗  
E. 首选碘剂治疗

78. 【答案】B。

79. 患者，男性，32岁，在10米高处维修电缆时不幸触电摔落地面，患者神志不清，血压96/60mmHg，心率60次/分，头部肿胀明显，颈部有严重的青紫瘀血，为使病人安全，现场为有效保证病人呼吸道通畅可应用（ ）。

- A. 气管插管                      B. 托下颌法



- C. 协助病人取侧卧位  
D. 协助病人取平卧位，头偏向一侧  
E. 气管切开

79. 【答案】B。

80. 患者，男，28岁，诊断为膀胱炎，该患者排出的新鲜尿液有（ ）。
- A. 芳香味                      B. 氨臭味                      C. 粪臭味                      D. 烂苹果味  
E. 硫化氢味

80. 【答案】B。

81. 血钙增高见于（ ）。
- A. 佝偻病                      B. 急性出血性胰腺炎      C. 甲状旁腺功能亢进      D. 低蛋白血症  
E. 婴儿手足搐搦症

81. 【答案】C。

82. 大多数肾挫裂伤患者采取的治疗方法是（ ）。
- A. 肾修补术                      B. 非手术治疗                      C. 肾部分切除术                      D. 肾切除术  
E. 肾周引流术

82. 【答案】B。

83. 引起风湿热的常见菌为（ ）。
- A. 葡萄球菌                      B. 白色念珠菌                      C. 肺炎双球菌                      D. A组乙型溶血性链球菌  
E. 流感嗜血杆菌

83. 【答案】D。

84. 良性前列腺增生病人最重要的症状为（ ）。
- A. 尿频                      B. 进行性排尿困难                      C. 尿潴留                      D. 肾积水  
E. 血尿

84. 【答案】B。

85. 功能制护理的优点是（ ）。
- A. 分工明确，节省人力                      B. 增加与病人的交流机会  
C. 可以掌握病人的全面情况                      D. 工作方式机动灵活  
E. 增强护士责任感

85. 【答案】A。

86. 正常小儿白细胞分类出现两次交叉的年龄是（ ）。
- A. 1~3天及1~3岁                      B. 4~6天及4~6岁

C. 7~9 天及 7~9 岁

D. 10~12 天及 10~12 岁

E. 小于 30 天及 9~14 岁

86. 【答案】B。

87. 女性外阴受伤后最易发生水肿的部位是（ ）。

A. 小阴唇

B. 大阴唇

C. 会阴部

D. 阴阜部

E. 阴蒂部

87. 【答案】B。

88. 可引起冷休克的病菌是（ ）。

A. 革兰阴性菌

B. 革兰阳性菌

C. 金黄色葡萄球菌

D. 大肠杆菌

E. 绿脓杆菌

88. 【答案】A。

89. 大量咯血指（ ）。

A. 24 小时咯血量大于 100ml

B. 24 小时咯血量大于 200ml

C. 24 小时咯血量大于 300ml

D. 24 小时咯血量大于 400ml

E. 24 小时咯血量大于 500ml

89. 【答案】E。

90. 小儿躯干的上部量与下部量相等的年龄是（ ）。

A. 8 岁

B. 9 岁

C. 10 岁

D. 11 岁

E. 14 岁

90. 【答案】E。

二、B 型题（共 10 小题，每小题 0.75 分，共 7.5 分。以下若干组考题，每组考题共用考题前的 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个与问题关系最密切的答案，某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。正确答案错选、多选或未选均不得分。）

（91~92 题）

A. 无痛性肿块，单发，质硬，边界不清，不易推动

B. 无痛性肿块，表面光滑，易推动

C. 乳房肿块不易触及，但常有乳头溢液

D. 乳房胀痛，并有红、肿、发热、压痛

E. 疼痛性肿块与月经周期有关，肿块多发

91. 早期乳腺癌呈（ ）。

91. 【答案】A。

92. 乳腺囊性增生病呈（ ）。

92. 【答案】E。

(93~94 题)

A. CVP 低, BP 低

B. CVP 低, BP 正常

C. CVP 高, BP 低

D. CVP 高, BP 正常

E. CVP 正常, BP 低

93. 提示血容量严重不足的是（ ）。

93. 【答案】A。

94. 提示心功能不全或血容量相对过多的是（ ）。

94. 【答案】C。

(95~97 题)

A. 意外事故

B. 心血管疾病

C. 电解质紊乱

D. 药物过敏、中毒

E. 酸碱平衡紊乱

95. 高血钾属于（ ）。

95. 【答案】C。

96. 青霉素过敏属于（ ）。

96. 【答案】D。

97. 煤气中毒属于（ ）。

97. 【答案】A。

(98~100 题)

A. 胎儿身体纵轴与母体纵轴的关系

- B. 最先进入骨盆入口的胎儿部分
- C. 胎儿身体纵轴与骨盆入口的关系
- D. 胎儿肢体与母体骨盆的关系
- E. 胎儿先露部的指示点与母体骨盆的关系

98. 胎产式 ( )。

98. 【答案】A。

99. 胎先露 ( )。

99. 【答案】B。

100. 胎方位 ( )。

100. 【答案】E。

三、多选题 (本大题共 10 题, 每小题 2.5 分, 共 25 分。以下每一道考题下面有几个备选答案。其中有两个或两个以上正确答案。请从中选择所有正确答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。正确答案错选、多选或未选均不得分。)

101. 为患者进行晨间护理的内容有 ( )。

- A. 整理床铺
- B. 面、手部清洁
- C. 测生命体征
- D. 检查局部皮肤受压情况
- E. 口腔护理

101. 【答案】ABDE。

102. 血液透析中病情观察应做到 ( )。

- A. 严密观察血压、呼吸、体温、脉搏
- B. 观察血液通路流量及压力、温度、浓度
- C. 准确记录透析时间, 脱水量等
- D. 记录肝素用量
- E. 注意机器报警, 及时排除故障

102. 【答案】ABCDE。

103. 脑死亡的诊断依据有 ( )。

- A. 不可逆的深度昏迷
- B. 自发呼吸停止
- C. 脑干反射消失
- D. 心电图平直
- E. 脑电波消失

103. 【答案】ABCE。

104. 异位妊娠的病因有 ( )。

- A. 受精卵游走
- B. 输卵管再通术后
- C. 输卵管发育不良
- D. 输卵管功能

异常

E. 慢性输卵管炎

104. 【答案】ABCDE。

105. 患者活动受限的原因有（ ）。

A. 疼痛                      B. 严重疾病                      C. 身体残疾                      D. 神经功能受

损

E. 某些医护措施的执行

105. 【答案】ABCDE。

106. 绒毛膜癌脑转移终末期的应急措施是（ ）。

A. 平衡电解质              B. 积极降颅压              C. 镇静、止痛              D. 加大化学治

疗量

E. 控制液体量

106. 【答案】ABCE。

107. 经前期紧张综合征可能与下列因素有关？（ ）

A. 缺乏维生素 A                      B. 缺乏维生素 B

C. 雌、孕激素比例失调              D. 精神因素

E. 中枢神经传递

107. 【答案】BCDE。

108. 产程中预防产力异常的护理措施是（ ）。

A. 做好产妇的心理护理              B. 产时多关心体贴产妇

C. 提醒产妇按时自解小便              D. 宫缩乏力时即用缩宫素

E. 鼓励产妇进食进水，补充体内消耗

108. 【答案】ABCE。

109. 成分血的输注包括（ ）。

A. 红细胞输注              B. 浓缩白细胞输注              C. 血浆输注              D. 浓缩血小板

输注

E. 蛋白制剂输注

109. 【答案】ABCD。

110. 氧气吸入的适应症有（ ）。

A. 肺活量减少              B. 心力衰竭              C. 昏迷患者              D. 休克

E. CO 中毒

110. 【答案】ABCDE。

#### 四、附加题（共计 10 道）

1. 局部浸润麻醉选用普鲁卡因时，其常用浓度为（ ）。

- A. 0.5%                      B. 1%                      C. 1.5%                      D. 2%  
E. 2.5%

1. 【答案】A。

2. 颅后窝病变发生脑疝者，最有效的紧急处理措施是（ ）。

- A. 甘露醇脱水                      B. 脑室穿刺外引流  
C. 镇静镇痛                      D. 开颅手术切除病变  
E. 使用激素类药物

2. 【答案】B。

3. 癫痫持续状态的治疗首选药物是（ ）。

- A. 苯妥英钠                      B. 地西洋                      C. 苯巴比妥钠                      D. 水合氯醛  
E. 异戊巴比妥

3. 【答案】B。

4. 腰椎间盘突出症早期基本的治疗方法是（ ）。

- A. 推拿按摩                      B. 止痛药                      C. 理疗                      D. 绝对卧硬板

床休息

- E. 脊肌锻炼

4. 【答案】D。

5. 八纲辨证内容不包括（ ）。

- A. 燥                      B. 表                      C. 里                      D. 寒  
E. 热

5. 【答案】A。

6. 我国医院内感染最常发生的部位是（ ）。

- A. 泌尿道                      B. 外科切口                      C. 血液                      D. 呼吸道  
E. 胃肠道

6. 【答案】D。

7. 护理诊断中的“E”代表（ ）。

- A. 患者出现健康问题的原因  
B. 患者的健康问题  
C. 患者的现状  
D. 症状与体征  
E. 患者的既往病史

7. 【答案】A。

8. 从外部观察，牙体是由哪三部分组成的？（ ）
- A. 牙本质、牙釉质、牙骨质  
B. 牙釉质、牙骨质、牙颈  
C. 牙冠、牙根、根尖孔  
D. 牙冠、牙根、牙颈  
E. 牙釉质、牙根、牙颈

8. 【答案】D。

9. 在中医护理的原则中“扶正祛邪”的“正”为（ ）。
- A. 医疗技术  
B. 护理技术  
C. 人体的防御功能  
D. 中医医疗技术  
E. 中医护理技术

9. 【答案】C。

10. 以下移植方法存活率最高的是（ ）。
- A. 自体移植  
B. 同质移植  
C. 充分配血及组织配型后移植  
D. 同种异体移植  
E. 异种异体移植

10. 【答案】A。

## 模拟三

一、判断题（本大题共 20 个小题，每小题 0.5 分，共 10 分。在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

1. 无菌操作前 30min 停止清扫，防止尘埃。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

1. 【答案】A。

2. 绌脉是指在同一单位时间内脉率少于心率。（ ）
- A. 正确  
B. 错误

2. 【答案】A。

3. 静脉输血，血制品一般在6小时内输完。（ ）

A. 正确                      B. 错误

3. 【答案】B。

4. 长期鼻饲患者定期更换胃管的时间是10天。（ ）

A. 正确                      B. 错误

4. 【答案】B。

5. 压疮患者均可用红外线治疗。（ ）

A. 正确                      B. 错误

5. 【答案】B。

6. 治疗室常规消毒的要求是每天2次。（ ）

A. 正确                      B. 错误

6. 【答案】A。

7. 心脏骤停影响的是收缩压。（ ）

A. 正确                      B. 错误

7. 【答案】B。

8. 三腔管放置12小时后，食管气囊应放气15~20分钟。（ ）

A. 正确                      B. 错误

8. 【答案】A。

9. 高热患者鼓励其多饮淡盐水。（ ）

A. 正确                      B. 错误

9. 【答案】B。

10. 糖尿病病人食用糖尿病饮食感到饥饿时，可吃水果、蔬菜等。（ ）

A. 正确                      B. 错误

10. 【答案】B。

11. 雌激素促进水钠潴留；孕激素促进水钠排泄。（ ）

A. 正确                      B. 错误

11. 【答案】A。

12. 中凹卧位抬高下肢20°。（ ）

A. 正确                      B. 错误

12. 【答案】A。



13. 产前检查从确定早孕开始，妊娠 28 周前每月查一次，28 周后 2 周查一次，36 周后每周一次。（ ）

A. 正确                      B. 错误

13. 【答案】A。

14. 吸痰管最大外径不能超过气管导管内径的 1/2，负压不可过大，进吸痰管时不可给予负压，以免损伤患者气道。（ ）

A. 正确                      B. 错误

14. 【答案】A。

15. 皮肤接触有机磷农药中毒者，擦洗溶液常选用 1%~5%碳酸氢钠。（ ）

A. 正确                      B. 错误

15. 【答案】A。

16. 中心静脉压是指将导管插入右心房或在靠近右心房的上、下腔静脉处所测得的压力。（ ）

A. 正确                      B. 错误

16. 【答案】A。

17. 冰帽局部用冷的最长时间不得超过 30 分钟。（ ）

A. 正确                      B. 错误

17. 【答案】A。

18. 心率增加，心排出量必然增加，而心率减慢，心排出量必定减少。（ ）

A. 正确                      B. 错误

18. 【答案】B。

19. 高浓度吸氧保持在 60%以上。（ ）

A. 正确                      B. 错误

19. 【答案】A。

20. 维持子宫前倾位置的是圆韧带、阔韧带。（ ）

A. 正确                      B. 错误

20. 【答案】B。

二、单项选择题（本大题共 70 小题，每小题 1 分，共 70 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框按要求涂黑。错选、多选或未选均不得分。）

21. 新生儿出生 24 小时内，应注射的疫苗有（ ）。

- A. 乙脑，乙肝            B. 麻疹，卡介苗            C. 卡介苗，百白破            D. 卡介苗，乙肝  
E. 麻疹，乙肝

21. 【答案】D。

22. 患儿，万某，3 岁，因急性支气管炎入院治疗 3 天，现病情好转，但时常哭闹不安，最合适的沟通技巧是（ ）。

- A. 仔细倾听            B. 细语安慰            C. 亲切抚摸            D. 沉默不语  
E. 交流意见

22. 【答案】C。

23. 老年人虽然死记硬背能力减退，但理解能力变化不大，因此比较好保持记忆的方法是（ ）。

- A. 近期记忆            B. 远期记忆            C. 机械记忆            D. 逻辑记忆  
E. 次级记忆

23. 【答案】D。

24. 一病人吞食骨头，说可以使自己具有“硬骨头”精神，这种症状是一种（ ）。

- A. 妄想            B. 思维形式障碍            C. 逻辑倒错            D. 超价观念  
E. 病理性象征性思维

24. 【答案】E。

25. 心搏骤停后，最先受到损害的脏器是（ ）。

- A. 心脏            B. 肝脏            C. 肺部组织            D. 脑组织  
E. 肾脏

25. 【答案】D。

26. 膀胱镜检查的体位是（ ）。

- A. 仰卧位                      B. 截石位                      C. 俯卧位                      D. 侧卧位  
E. 膝胸位

26. 【答案】B。

27. 肝性脑病患者禁用肥皂水灌肠的主要原因是（ ）。

- A. 增加氨的形成                      B. 增加肠道感染的可能  
C. 预防肠道出血                      D. 肥皂水为碱性，增加氨的吸收  
E. 导致电解质紊乱

27. 【答案】D。

28. 下列哪项是左心衰竭的临床表现？（ ）

- A. 肝脏肿大                      B. 颈静脉怒张                      C. 水肿                      D. 呼吸困难  
E. 肝颈静脉回流征阳性

28. 【答案】D。

29. 患者，女，36岁，铜绿假单胞菌感染，护士做口腔护理漱口溶液应选择（ ）。

- A. 0.1%醋酸溶液                      B. 过氧化氢                      C. 复方硼酸                      D. 1%~4%碳酸氢钠溶液  
E. 生理盐水

29. 【答案】A。

30. 血制品从血库取出后30分钟内输注，（ ）小时内输完。

- A. 2小时                      B. 4小时                      C. 6小时                      D. 8小时  
E. 10小时

30. 【答案】B。

31. 核酸检测机构医疗废物暂时储存时间不得超过（ ）。

- A. 半天                      B. 1天                      C. 2天                      D. 3天  
E. 5天

31. 【答案】C。

32. 医院感染预防控制对病房内的空气及地面应采取的措施包括（ ）。

- A. 定时通风换气，必要时空气消毒；地面湿式清扫，遇污染时消毒
- B. 定时空气消毒，必要时通风换气；地面干式清扫，遇污染时清洁
- C. 定时通风换气，必要时空气消毒；地面干式清扫，遇污染时清洁
- D. 定时空气消毒，必要时通风换气；地面湿式清扫，遇污染时消毒
- E. 必要时定时消毒，必要时通风换气；地面湿式清扫，遇污染时消毒

32. 【答案】A。

33. 脑出血患者对压眶刺激出现痛苦表情，没有言语应答，且不能执行简单的命令，目前患者处于的状态是（ ）。

- A. 昏迷
- B. 嗜睡
- C. 睁眼昏迷
- D. 浅昏迷
- E. 深昏迷

33. 【答案】D。

34. 库存血在 4℃ 的环境内可保存（ ）。

- A. 24h
- B. 48h
- C. 72h
- D. 1 周
- E. 2~3 周

34. 【答案】E。

35. 采血清标本作肝功能检查，错误的是（ ）。

- A. 空腹采血
- B. 用干燥试管
- C. 采血后取下针头缓慢注入试管
- D. 血液注入试管后要摇动
- E. 血液泡沫不能注入试管

35. 【答案】D。

36. 使用鼻导管给氧时，下列哪项是错误的？（ ）

- A. 插导管前用湿棉签清洁鼻孔
- B. 鼻导管轻轻插至鼻咽部
- C. 应用氧气时先调节流量
- D. 中途改变流量时，先分离导管，后调流量
- E. 停用氧气时，先关流量开关

36. 【答案】E。

37. 氧气雾化吸入，湿化瓶内应该（ ）。

- A. 盛温开水                      B. 盛冷水                      C. 盛 50%乙醇                      D. 盛生理盐水  
E. 不盛水

37. 【答案】E。

38. 人的心理防卫机制不包括（ ）。

- A. 否认                      B. 压抑                      C. 代偿                      D. 转移  
E. 升华

38. 【答案】C。

39. 下列哪种情况禁忌洗胃？（ ）

- A. 胃黏膜水肿                      B. 误服氢氧化钠                      C. 消化道溃疡                      D. 深度昏迷  
E. 晚期胃癌

39. 【答案】B。

40. 下列哪项操作违反了无菌操作原则？（ ）

- A. 手持无菌容器，应握住边缘部分  
B. 打开无菌容器时，盖的内面向上  
C. 放置到远处取无菌物品，持物钳应与容器一同搬移，就地使用  
D. 戴手套的手不可触及另一手套的内面中央  
E. 铺好的无菌盘有效使用时间是 4 小时

40. 【答案】A。

41. 长期血压增高容易引起损害的器官是（ ）。

- A. 心、脑、肾                      B. 心、脑、肺                      C. 心、肝、肾                      D. 脑、肝、肾  
E. 心、脑、肝

41. 【答案】A。

42. 正常成年男性体液所占体重的比为（ ）。

- A. 70%                      B. 60%                      C. 55%                      D. 50%  
E. 40%

42. 【答案】B。

43. 乳腺钼靶摄影最佳时间是（     ）。
- A. 月经干净后一周内    B. 月经期                      C. 月经前期                      D. 月经中期  
E. 与经期无关

43. 【答案】A。

44. 关于滴虫性阴道炎的治疗措施，下列哪项不正确？（     ）
- A. 妊娠期暂不治疗                      B. 用酸性溶液冲洗疗效好  
C. 未婚患者选用口服甲硝唑                      D. 对无症状带虫者应予以治疗  
E. 已婚者男方应同时治疗

44. 【答案】A。

45. 40%的甲醛气化消毒加入的氧化剂是（     ）。
- A. 乳酸钠                      B. 乳酸钾                      C. 氯化钾                      D. 氢氧化钠  
E. 高锰酸钾

45. 【答案】E。

46. 颅内血肿瞳孔改变为（     ）。
- A. 双侧瞳孔缩小                      B. 瞳孔对光反应消失                      C. 瞳孔等大等圆                      D. 一侧瞳孔散大  
E. 针尖样瞳孔

46. 【答案】D。

47. 在伤口进行热敷时应特别注意（     ）。
- A. 在床上铺橡胶单                      B. 伤口皮肤周边涂凡士林  
C. 掌握无菌技术                      D. 保持合适水温  
E. 及时更换敷料

47. 【答案】C。

48. 患者，女性，40岁，右侧锁骨下静脉置管进行输液时，突然主诉胸部异常不适并出现呼吸困难、发绀，心前区闻及响亮持续的“水泡音”，患者可能发生了（     ）。
- A. 发热反应                      B. 空气栓塞                      C. 过敏反应                      D. 急性肺水肿  
E. 合并肺部感染

48. 【答案】B。

49. 长期服用硝苯地平可出现（ ）。

- A. 干咳                      B. 皮疹                      C. 支气管哮喘                      D. 胫前水肿  
E. 心悸

49. 【答案】D。

50. 护理心源性水肿病人，不正确的方法是（ ）。

- A. 测体重、腹围每日一次                      B. 给予低钠、高蛋白、少产气食物  
C. 每日进液量控制在 500ml 左右                      D. 下肢水肿时应抬高下肢  
E. 输液时滴速一般不超过 20~30 滴/分

50. 【答案】C。

51. 急性心肌梗死病人出现哪项心律失常需警惕室颤的发生？（ ）

- A. 房颤                      B. 短阵室性心动过速                      C. 室上性心动过速                      D. 窦性心动过

缓

E. I 型房室传导阻滞

51. 【答案】B。

52. 下列哪项化验结果是冠心病的危险因素？（ ）

- A. 血清总胆固醇下降                      B. 血清甘油三酯下降  
C. 血清高密度脂蛋白——胆固醇增高                      D. 血清低密度脂蛋白——胆固醇增高  
E. 血清肌酸磷酸激酶降低

52. 【答案】D。

53. 一休克患者，在抢救过程中出现呼吸困难、紫绀，吸氧无效， $\text{PaO}_2$ 持续降低，诊断是休克肺，护理措施首先采取（ ）。

- A. 呼气终末正压给氧                      B. 持续吸纯氧                      C. 快速输液                      D. 给血管活性药物

E. 气管切开

53. 【答案】A。

54. 肾上腺素用于治疗心脏骤停，其主要的药理作用是（ ）。

- A. 增加心肌收缩力                      B. 扩张外周血管                      C. 减慢心率                      D. 抗心律失常  
E. 纠正酸碱平衡

54. 【答案】A。

55. 除哪项外，均为低渗性脱水的特点？（ ）

- A. 主要是细胞外液减少，重点为低钠血症  
B. 多见于营养不良伴腹泻的病儿  
C. 易高热，烦渴  
D. 易脱水，休克  
E. 易嗜睡，昏迷

55. 【答案】C。

56. 网织红细胞减少的疾病见于（ ）。

- A. 缺铁性贫血      B. 肺心病      C. 大细胞性贫血      D. 再生障碍性

贫血

E. 溶血性贫血

56. 【答案】D。

57. 硝苯地平的不良反应不包括（ ）。

- A. 心动过速      B. 胃肠功能紊乱      C. 高铁血红蛋白血症      D. 外周组织水

肿

E. 过敏反应

57. 【答案】C。

58. 颈外静脉输液，最佳穿刺点在（ ）。

- A. 下颌角与锁骨上缘中点连线下 1/3 处      B. 下颌角与锁骨下缘中点连线下 1/3

处

- C. 下颌角与锁骨下缘中点连线上 1/3 处      D. 下颌角与锁骨上缘中点连线上 1/3

处

E. 下颌角与锁骨上缘中点连线中 1/3 处

58. 【答案】D。

59. 男，35 岁，长期吸烟，右下肢反复发作静脉炎，并有间歇性跛行，其原因是发生了（ ）。

- A. 雷诺病      B. 动脉栓塞      C. 大动脉炎      D. 血栓闭塞性

脉管炎

E. 动脉硬化性闭塞症

59. 【答案】D。

60. 子宫脱垂是指宫颈外口低于（ ）。

- A. 处女膜缘      B. 阴道口      C. 坐骨结节      D. 坐骨棘

E. 以上都不是

60. 【答案】D。



61. 某法洛四联症患者，2岁，此次因发热入院，体温最高39.5℃。入院后，医嘱给予补液，其目的是为了防止并发（ ）。

- A. 心功能衰竭                  B. 肾衰竭                  C. 低血容量                  D. 脑栓塞  
E. 便秘

61. 【答案】D。

62. 患者，女，36岁，晨起黑便约100g，患者无慢性胃炎、消化性溃疡疾病，有关节肿痛三年，评估患者最重要的是（ ）。

- A. 黑便的性状                  B. 饮食                  C. 黑便时有无腹痛                  D. 有无恶心、心悸  
E. 有无使用特殊药物

62. 【答案】E。

63. 风心病二尖瓣狭窄和（或）二尖瓣关闭不全最主要的并发症及死因是（ ）。

- A. 慢性心房颤动                  B. 急性左心衰竭  
C. 亚急性感染性心内膜炎                  D. 血栓栓塞  
E. 肺部感染

63. 【答案】B。

64. 妇科腹部手术备皮范围正确的是（ ）。

- A. 上自脐下，两侧至腋中线，下至阴阜  
B. 上自脐下，两侧至腋中线，下至阴阜及大腿上1/3  
C. 上自剑突下，两侧至腋中线，下至阴阜及大腿上1/3  
D. 上自剑突下，两侧至腋中线，下至大腿上1/3  
E. 上自剑突下，两侧至腋中线，下至阴阜

64. 【答案】C。

65. 某一左卵巢囊肿的患者住院等待手术期间，于解大便后，突然感到左下腹持续疼痛，随后肿块逐渐增大，这一征象表明（ ）。

- A. 囊肿破裂                  B. 囊内出血                  C. 瘤蒂扭转                  D. 囊内感染  
E. 囊肿恶变

65. 【答案】C。

66. 急性心肌梗死并发室性心动过速宜选择的治疗药物为（ ）。

- A. 维拉帕米                  B. 洋地黄                  C. 阿托品                  D. 利多卡因  
E. 胺碘酮

66. 【答案】D。

67. 属于抗代谢类的抗肿瘤药物为（ ）。

- A. 环磷酰胺                      B. 氟脲嘧啶                      C. 硫酸长春新碱                      D. 放线菌素 D  
E. 顺铂

67. 【答案】B。

68. 感染早期，渗出的白细胞以哪种为主？（ ）

- A. 淋巴细胞                      B. 中性粒细胞                      C. 嗜碱性粒细胞                      D. 嗜酸性粒细胞  
E. 纤维细胞

68. 【答案】B。

69. 轮状病毒肠炎多发年龄是（ ）。

- A. 新生儿                      B. 6个月以下                      C. 6~24个月                      D. 3~5岁  
E. 6岁以上

69. 【答案】C。

70. 患者因膀胱癌予以B超，做完之后的膀胱镜如何消毒？（ ）

- A. 煮沸                      B. 化学药物浸泡                      C. 干烧法                      D. 高压蒸汽灭菌  
E. 微波消毒法

70. 【答案】D。

71. 内分泌疾病患者在病因未明时的治疗应偏重于（ ）。

- A. 药物治疗                      B. 手术治疗                      C. 对症治疗                      D. 中药治疗  
E. 纠正功能紊乱

71. 【答案】E。

72. 适合饭后服用的药物是（ ）。

- A. 截疟药                      B. 制酸药                      C. 平喘药                      D. 健胃药  
E. 调经药

72. 【答案】E。

73. 用于纠正酸中毒的首选药物是（ ）。

- A. 11.2%乳酸                      B. 林格液                      C. 5%碳酸氢钠                      D. 0.9%氯化钠  
E. 洛贝林

73. 【答案】C。

74. 手足口病高发期是在（ ）月。

- A. 1~2                      B. 3~4                      C. 4~7                      D. 8~9  
E. 10~12

74. 【答案】C。

75. 对原发性高血压患者做健康指导，不正确的是（ ）。

- A. 宜低盐、低脂、低胆固醇、低热量饮食      B. 早期高血压应注意休息，避免过劳  
C. 缓解期适当运动，控制体重                      D. 根据血压情况，高时服药，不高时不用服药  
E. 每日定时测血压

75. 【答案】D。

76. 关于冠心病患者保持大便通畅的叙述，不正确的是（ ）。

- A. 卧床会使肠蠕动减慢                              B. 饮食中需增加粗纤维食物  
C. 便秘时采用大量不保留灌肠以导泻              D. 用力排便可诱发和加重心力衰竭  
E. 用力排便可诱发严重心律失常

76. 【答案】C。

77. 脉压增大的先心病是（ ）。

- A. 房间隔缺损                      B. 室间隔缺损                      C. 动脉导管未闭                      D. 法洛四联症  
E. 肺动脉狭窄

77. 【答案】C。

78. 血栓闭塞性脉管炎治疗措施不正确的是（ ）。

- A. 指导病人绝对戒烟                              B. 用热水袋改善肢体温度  
C. 指导病人做伯格运动                              D. 保持足部清洁干燥，积极治疗足癣  
E. 进行动脉重建手术

78. 【答案】B。

79. 妊娠晚期，孕妇每周体重的增加量不得超过（ ）。

- A. 0.25kg                      B. 0.5kg                      C. 1kg                      D. 0.6kg  
E. 2.0g

79. 【答案】B。

80. 有可能导致危及生命的心律失常是（ ）。

- A. 心房颤动                      B. 阵发性室上性心动过速  
C. 窦性心动过缓                      D. 阵发性室性心动过速  
E. 频发单源性室性早搏

80. 【答案】D。

81. 心绞痛常见的疼痛部位是（ ）。

- A. 心前区                      B. 胸骨体中上段之后      C. 剑突下                      D. 左肩  
E. 前胸部

81. 【答案】B。

82. 成人心肺复苏按压部位在（ ）。

- A. 胸骨中下 1/3                      B. 胸骨中 1/3                      C. 胸骨上 1/3                      D. 胸骨中上  
1/3  
E. 胸骨中下 2/3

82. 【答案】A。

83. 下列关于抢救药品和设备的管理，错误的是（ ）。

- A. 定人管理                      B. 定数量品种                      C. 定期检查                      D. 定位放置  
E. 外借时一定要登记

83. 【答案】E。

84. 尿毒症患者血肌酐明显增高，近周来夜间尿量增多，晨起时恶心、呕吐，为减轻晨间呕吐，最有效的护理措施是（ ）。

- A. 加强晨间口腔护理      B. 饮食少量多餐                      C. 避免刺激性食物                      D. 减少晚餐进食量

E. 睡前饮水

84. 【答案】E。

85. 一旦医院发生急性胃肠道感染的爆发流行后, 不应( )。

- A. 立即转入传染病院
- B. 了解发病情况
- C. 查阅病历及细菌培养
- D. 掌握爆发流行的时间及分布
- E. 切断传播途径

85. 【答案】A。

86. 感染性肺炎抗休克护理错误的是( )。

- A. 取仰卧中凹卧位
- B. 用热水袋置于体表
- C. 建立静脉通路
- D. 备抢救物品
- E. 遵医嘱用药, 观察疗效

86. 【答案】B。

87. 急性血源性骨髓炎病人患肢石膏托固定的最主要的目的是( )。

- A. 缓解疼痛
- B. 减轻肿胀
- C. 防止病理性骨折
- D. 减少脓液
- E. 防止炎症扩散

87. 【答案】C。

88. 病床数 100~500 张医院感染率应低于( )。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 8%
- E. 10%

88. 【答案】D。

89. 门静脉高压症并发上消化道出血首选的有效措施是( )。

- A. 三腔二囊管压迫
- B. 断流术
- C. 输血和止血药物的应用
- D. 分流术
- E. 脾切除术

89. 【答案】C。

90. 在 PDCA 循环中, 关键的环节是( )。

- A. 计划
- B. 实施
- C. 检查
- D. 处理

90. 【答案】D。

三、多选题（本大题共 5 题，每小题 2 分，共 10 分。以下每一道考题下面有几个备选答案。其中有两个或两个以上正确答案。请从中选择所有正确答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。正确答案错选、多选或未选均不得分。）

91. 非特异性感染常见于哪些疾病？（ ）

- A. 疔                      B. 疖                      C. 蜂窝织炎                      D. 脓肿  
E. 急性阑尾炎

91. 【答案】ABCDE。

92. 属于乙类传染病的是（ ）。

- A. 鼠疫                      B. 流行性出血热                      C. 麻疹                      D. 梅毒  
E. 狂犬病

92. 【答案】BCDE。

93. 女，33 岁，因高热伴尿频、尿急、尿痛而急诊入院，需做尿培养和菌落计数，标本采集哪些是正确的？（ ）

- A. 使用抗菌药前采集      B. 先向导尿                      C. 取终末尿                      D. 取清晨第一次尿  
E. 采集后立即送验

93. 【答案】AD。

94. 监测 PaCO<sub>2</sub> 的临床意义是（ ）。

- A. 判断肺泡通气量                      B. 判断代谢性酸碱失衡  
C. 判断呼吸性酸碱失衡                      D. 判断复合性酸碱失衡  
E. 判断 I 型呼吸衰竭

94. 【答案】ACDE。

95. 血栓闭塞性脉管炎早期的典型症状是（ ）。

- A. 肢端发绀、发凉      B. 间歇性跛行                      C. 肢端干性坏疽                      D. 下肢肌肉萎缩  
E. 持续性疼痛

95. 【答案】AB。



99. 【答案】D。

100. 出院教育内容不正确的是（ ）。

- A. 先进食糊状或胶冻状食物，少量多餐
- B. 坚持每天进行 30 分钟以上的慢跑、散步等运动
- C. 遵医嘱正确服用降压、降糖和降脂药物
- D. 进食时取坐位，颈部稍前驱
- E. 卧床休息，鼓励由家属照顾日常饮食起居

100. 【答案】E。

**案例：**赵先生，40 岁，于饱餐、饮酒后突然发生中上腹持久剧烈疼痛，伴有反复恶心，呕吐出胆汁。护理体检：上腹部压痛，腹壁轻度紧张。测血清淀粉酶明显增高。

101. 首选护理措施是（ ）。

- A. 禁食、胃肠减压
- B. 适当补钾、补钙
- C. 外科手术准备
- D. 屈膝侧卧位
- E. 应用抗生素

101. 【答案】A。

102. 急性水肿性胰腺炎不应有的表现是（ ）。

- A. 腹痛
- B. 腹胀
- C. 休克
- D. 呕吐
- E. 发热

102. 【答案】C。

103. 患者经治疗后腹痛、呕吐基本消失，开始进食时应给予（ ）。

- A. 高脂
- B. 高糖
- C. 低脂
- D. 低糖
- E. 低蛋白

103. 【答案】CDE。

**案例：**患者，男，50 岁。因“神志不清、行为异常 5 天，昏迷 1 天”入院，既往有肝硬化病史 8 年。入院查体：呼之不应，压眶反射无反应。皮肤可见蜘蛛痣。实验室检查：血氨  $145 \mu\text{g}/\text{dl}$ 。脑电图显示  $\delta$  波每秒 3 次；诊断为肝硬化、肝性脑病。

104. 患者入院后制定的护理措施中不恰当的是（ ）。

- A. 遵医嘱及时、准确地应用抗生素
- B. 限制高蛋白饮食



- C. 如有便秘应及时用肥皂水灌肠  
D. 避免应用镇静安眠药  
E. 禁食时应避免发生低血糖

104. 【答案】C。

105. 患者经积极治疗后好转，神志清醒，此时适宜的饮食是（ ）。

- A. 每日总热量以脂肪为主  
B. 血氨偏高者限制蛋白质摄入  
C. 病情好转后主要选择动物蛋白  
D. 应控制饮食中维生素 C 的摄入  
E. 每日饮水量不少于 2000mL

105. 【答案】B。

## 五、附加题（共计 15 道）

1. 呼吸机应用时出现高压报警的常见原因有（ ）。

- A. 呼吸机管道脱落  
B. 高压报警限设定过高  
C. 呼吸道分泌物过多  
D. 湿化罐活塞未关闭

1. 【答案】C。

2. 下列哪项不是预防局部麻醉药中毒的措施？（ ）

- A. 一次用药量不超过限量  
B. 避免麻醉药误入血管  
C. 局部麻醉药中加少量肾上腺素  
D. 麻醉前适量用苯妥英钠  
E. 根据患者情况酌情减量

2. 【答案】D。

3. 妊娠合并心脏病，产科护理原则是（ ）。

- A. 产前严密观察生命体征  
B. 产前严密观察宫缩和胎心音  
C. 分娩期第二产程应用缩宫素，以便尽快结束分娩  
D. 产褥期 1~7 天内应在产妇腹部放置沙袋  
E. 分娩后禁止母乳喂养

3. 【答案】B。

4. 肾脏疾病患者少尿期，水盐摄入原则为（ ）。

- A. 不必过分限水，低盐
- B. 不必过分限水，无盐
- C. 每日摄水量小于 1000ml，低盐
- D. 每日摄水量小于 1000ml，无盐
- E. 每日摄水量少于 500ml，低盐

4. 【答案】C。

5. 肠内营养最常见的并发症是（ ）。

- A. 鼻咽部黏膜损伤
- B. 吸入性肺炎
- C. 高血糖及电解质紊乱
- D. 管道阻塞
- E. 恶心、呕吐、腹胀、腹泻

5. 【答案】E。

6. 小猪皮移植于烧伤创面属于（ ）。

- A. 自体移植
- B. 同质移植
- C. 同种异体移植
- D. 异体异种移植
- E. 再植

6. 【答案】D。

7. 急诊护理工作特点是（ ）。

- A. 急、忙、乱
- B. 忙、乱、差
- C. 急、忙、杂
- D. 急、快、忙
- E. 杂、忙、乱

7. 【答案】C。

8. 营养不良早期诊断的最灵敏、最可靠的指标是（ ）。

- A. 血浆类胰岛素生长因子
- B. 血浆转铁蛋白
- C. 血浆甲状腺素结合前白蛋白
- D. 血浆维生素 A 结合蛋白
- E. 血浆蛋白

8. 【答案】A。

9. 有关女性生殖器官的血管淋巴，下列描述错误的是（ ）。

- A. 各部位血管动静脉伴行
- B. 动脉血管较静脉血管数量多
- C. 主要分外生殖器和盆腔两组淋巴
- D. 发生肿瘤时易沿各部的淋巴管传播
- E. 盆腔静脉丛较多

9. 【答案】B。

10. 引导病邪或有害物质，使其从口涌吐的方法为（ ）。

- A. 汗法
- B. 下法
- C. 吐法
- D. 和法

E. 清法

10. 【答案】C。

11. 下列哪项是阿米巴痢疾的确诊依据? ( )。

- A. 典型的果酱样大便
- B. 具有腥臭味的脓血便
- C. 全身中毒症状轻
- D. 右下腹压痛
- E. 大便镜检找到阿米巴滋养体或包囊

11. 【答案】E。

12. 早期张口困难, 而后全身性的肌肉痉挛, 出现“角弓反张”的是 ( )。

- A. 真菌感染
- B. 破伤风
- C. 厌氧链球菌性肌炎
- D. 坏死性筋膜炎

炎

E. 进行性细菌协同性坏疽

12. 【答案】B。

13. 下列属于开放式提问的是 ( )。

- A. 您今天感觉怎么样?
- B. 服用这种药后, 您还觉得头痛吗?
- C. 昨天的检查结果是阴性吗?
- D. 您今天吃药了吗?
- E. 您今天的体温是多少?

13. 【答案】A。

14. 下列描述不属于气管、支气管功能的是 ( )。

- A. 呼吸调节功能
- B. 清洁功能
- C. 屏气功能
- D. 防御性咳嗽

反射

E. 免疫功能

14. 【答案】C。

15. 肺动脉楔压 (PAWP) 降低提示 ( )。

- A. 左室顺应性下降
- B. 心源性休克
- C. 二尖瓣关闭不全
- D. 血容量不足

15. 【答案】D。