

## 展鸿《临床医学》模拟卷（一）

（满分：100分）

一、单项选择题（本大题共 80 小题，每小题 1 分，共 80 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，错选、多选或未选均不得分。）

1. 一位休克病人，心率快，测中心静脉压为 0.48kPa，应采取（ ）。  
A. 迅速补充液体  
B. 控制小量输液  
C. 心功能不全，立即给强心、利尿药  
D. 控制输液量，加用强心药  
E. 休克与血容量无关
2. 胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于（ ）。  
A. 穿刺损伤肺组织  
B. 抽液过多、过快，胸内压突然下降  
C. 胸膜过敏反应  
D. 穿刺损伤肺血管  
E. 空气栓塞
3. 下列哪项禁做骨髓穿刺？（ ）  
A. 显著血小板减少  
B. 粒细胞缺乏症  
C. 重度贫血  
D. 血友病  
E. 恶性组织细胞病
4. 清创术操作下列哪项是错误的？（ ）  
A. 伤口周围油污应用松节油擦去  
B. 伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒  
C. 切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织  
D. 深部伤口不宜再扩大  
E. 用 0.9%氯化钠注射液或过氧化氢溶液冲洗伤口
5. 关于三腔二囊管压迫止血，下列哪项错误？（ ）  
A. 插管前应检查有无漏气  
B. 为证实管道是否进入胃内，可采用通过胃管腔向内注水的方法  
C. 先充气胃囊，后充气食管囊  
D. 每 2~3 小时检查气囊内压力 1 次  
E. 每 8~12 小时食管气囊放气 1 次，进行观察
6. 关于胃插管术，下列哪项是错误的？（ ）  
A. 在胃扩张、幽门梗阻及食物中毒治疗中进行胃插管是必要的治疗  
B. 肠梗阻者可插管进行胃肠减压  
C. 对昏迷者，可插管行营养治疗

- D. 对食管静脉破裂出血者，可插管观察有无活动性出血
- E. 插管抽吸胃液进行分析
7. 有关胸腔穿刺的方法，下列哪项不正确？（ ）
- A. 穿刺抽液时，穿刺点一般取肩胛线 7~9 肋间隙或腋中线 6~7 肋间
- B. 穿刺抽气时，穿刺点取患侧锁骨中线第 2 肋间
- C. 穿刺时应沿肋骨下缘进针
- D. 第一次抽液不超过 600ml，此后每次的抽液量不超过 1000ml
- E. 抽气抽至胸内压为 0 为止
8. 口对口人工呼吸时，将病人头部后仰，托起下颏，最主要的目的是（ ）。
- A. 保持脑血液供应
- B. 便于口对口接触
- C. 避免口、鼻分泌物流出
- D. 解除舌后坠造成的咽阻塞
- E. 有利于保护颈椎
9. 成年人胸外按压，下列哪项正确？（ ）
- A. 按压部位在胸骨下段，剑突上 2.5~5cm 处
- B. 按压时以使胸廓下陷 2cm 为度
- C. 应用冲击式猛压，下压时间与放松时间比为 2:1
- D. 放松时手掌根离开胸骨
- E. 按压频率以 30 次/min 为宜
10. 有关开胸心脏按压术，下列哪项错误？（ ）
- A. 切口取左胸乳头下一个肋间，从胸骨左缘至腋中线
- B. 按压频率一般为 60~70 次/分
- C. 用推压法或按压法按压心脏
- D. 按压后心脏开始复跳，应立即关闭胸腔、避免感染
- E. 可配合按压，向左心室注入肾上腺素
11. 下列气管切开术的适应症哪项错误？（ ）
- A. 各种原因引起喉梗阻，造成呼吸困难
- B. 各种原因引起下呼吸道分泌物梗阻
- C. 各种原因引起 I 度和 II 度呼吸困难
- D. 各种原因引起呼吸衰竭或呼吸停止，需行人工机械呼吸
12. 有关气管切开术，下列哪项不正确？（ ）
- A. 患者取仰卧位，垫肩高、头后仰、颈伸直
- B. 皮肤切口从环状软骨下缘至胸骨上切迹稍上方
- C. 根据气管环为白色、触之有弹性、穿刺抽出气体来辨认气管
- D. 自 2~3 正中切开气管壁
- E. 下呼吸道分泌物阻塞，不宜气管切开
13. 中心静脉压测定中，医用塑料导管或硅胶管从静脉切口插至上腔静脉或下腔静脉处，一般插入

深度为 ( )。

- A. 25~35cm                      B. 40~50cm                      C. 35~45cm                      D. 35~55cm  
E. 45~55cm

14. 风湿性心脏病主动脉瓣狭窄常见的临床“三联征”为 ( )。

- A. 呼吸困难、心绞痛、房颤                      B. 呼吸困难、心绞痛、晕厥  
C. 呼吸困难、心绞痛、细迟脉                      D. 心绞痛、晕厥、细迟脉

15. 急性心肌梗死患者的心电图显示在 II、III、aVF 导联出现病理性 Q 波，ST 段抬高，T 波倒置，该患者心肌梗死部位位于 ( )。

- A. 前间壁                      B. 侧壁                      C. 下壁                      D. 前壁

16. 甲型流感是一种急性呼吸道传染性疾病，该病的主要传播途径是 ( )。

- A. 呼吸道                      B. 消化道                      C. 皮肤黏膜                      D. 血液

17. 病人呼吸气味中有大蒜味，应考虑 ( )。

- A. 尿毒症                      B. 酮症酸中毒                      C. 有机磷农药中毒                      D. 肺癌

18. 里急后重常见于 ( )。

- A. 急性菌痢                      B. 伤寒                      C. 霍乱                      D. 肠结核

19. 急性有机磷酸酯类中毒症状中，不属于 M 样症状的是 ( )。

- A. 腹痛、腹泻                      B. 流涎                      C. 瞳孔缩小                      D. 肌肉颤动

20. 以腹水为突出表现的患者，应首先考虑 ( )。

- A. 肝性水肿                      B. 心性水肿                      C. 肾性水肿                      D. 肺水肿

21. 下列不属于艾滋病传播途径的是 ( )。

- A. 性传播                      B. 经血传播                      C. 直接接触传播                      D. 母婴传播

22. 上消化道出血病人的粪便是 ( )。

- A. 脓血样                      B. 果酱样                      C. 米泔水样                      D. 柏油样

23. 中年以上有多年吸烟史者，如咯血应警惕 ( )。

- A. 肺结核                      B. 支气管扩张  
C. 支气管肺癌                      D. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄

24. 诊断贫血的主要依据是 ( )。

- A. 红细胞计数                      B. 红细胞压积                      C. 红细胞计数和压积                      D. 血红蛋白浓度

25. 关于流行性感病毒的病毒说法，错误的是 ( )。

- A. 主要传播途径是经呼吸道传播  
B. 病毒传染性强，在人群中可迅速蔓延造成流行  
C. 人体在感染病毒后不会产生特异性的细胞免疫和体液免疫  
D. 人群普遍易感，潜伏期一般为 1~4 天，起病急

26. 慢性肝炎根据患者具体情况采用综合性治疗方案，不包括 ( )。

- A. 合理的营养  
B. 保持心理平衡

- C. 严禁进食高热量、高蛋白、高维生素的食物  
D. 调节机体免疫
27. 破伤风病人最先受影响的肌群是 ( )。
- A. 面部表情肌      B. 四肢肌      C. 膈肌      D. 咀嚼肌  
E. 颈肌
28. 流行性乙型脑炎是一种可以引起严重后果的传染病，预防本病的关键除了易感人群的预防接种外，还应做好 ( ) 的工作。
- A. 防鼠灭鼠      B. 防蚊灭蚊      C. 防恙虫叮咬      D. 消灭蟑螂
29. 腹部最易损伤的空腔脏器是 ( )。
- A. 结肠      B. 胃      C. 直肠      D. 小肠
30. 白细胞中对急性化脓性感染起主要反应的是 ( )。
- A. 中性粒细胞      B. 嗜酸性粒细胞      C. 嗜碱性粒细胞      D. 淋巴细胞
31. 肠鸣音消失见于 ( )。
- A. 急性胃肠炎      B. 急性胰腺炎      C. 急性腹膜炎      D. 机械性肠梗阻
32. 下列不属于胸壁疾病引起的胸痛是 ( )。
- A. 带状疱疹      B. 肋间神经炎      C. 多发性骨髓瘤      D. 心绞痛
33. 人体血浆PH的相对恒定有赖于血液内的缓冲物质以及肺和胃的正常功能，当血浆PH低于( ) 时为酸中毒。
- A. 7. 35      B. 7. 45      C. 8. 11      D. 9. 25
34. 胸膜摩擦音可随体位的变动而消失或复现，当 ( ) 时，胸膜摩擦音可消失。
- A. 胸腔积液较多      B. 患有胸腔纤维素性胸膜炎  
C. 患有胸膜肿瘤      D. 患有肺梗死
35. 头痛、偏瘫或昏迷患者，若腰椎穿刺获得无色透明脑脊液，则提示为 ( )。
- A. 缺血性脑病      B. 急性脑出血      C. 蛛网膜下腔出血      D. 化脓性脑膜炎
36. WHO 癌痛治疗之阶梯疗法第二阶段是用 ( )。
- A. 弱阿片类药+辅助用药  
B. 强阿片类药+辅助用药  
C. 弱阿片类药+非阿片类药+辅助用药  
D. 强阿片类药+非阿片类药+辅助用药  
E. 强阿片类药+神经阻滞
37. 急性蜂窝组织炎与丹毒的主要不同临床表现是 ( )。
- A. 病变不易局限，扩散迅速      B. 附近淋巴结肿大  
C. 多伴有全身症状      D. 病变与正常组织无明显界限  
E. 局部疼痛
38. 对诊断急性坏死性肠炎意义最大的临床症状是 ( )。
- A. 持续性疼痛伴阵发性加剧

- B. 多呈中等度发热，并可高达 40℃  
C. 呕吐为胃内容物或胆汁，严重者可呈咖啡色血性物  
D. 腹泻粪便呈暗红色糊状或赤豆汤样血水便，有特殊腐败腥臭味  
E. 起病初常有精神萎靡、疲倦、食欲不振的症状
39. 宫颈癌早期临床特点是（ ）。
- A. 绝经后阴道大量出血                      B. 接触性出血  
C. 大量脓血性恶臭白带                      D. 下肢肿瘤  
E. 输尿管上段扩张
40. 等渗性脱水病人，如大量输入生理盐水治疗可导致（ ）。
- A. 低氯血症                      B. 低钙血症                      C. 低钾血症                      D. 高钾血症  
E. 高氯血症
41. 关于上尿路结石的临床表现，下列选项错误的是（ ）。
- A. 结石可引起钝痛和绞痛  
B. 结石越大疼痛越重  
C. 可引起肉眼和镜下血尿  
D. 伴感染时可有尿频、尿痛等  
E. 双侧上尿路结石和肾上尿路结石完全性梗阻时，可导致无尿
42. 关于脑震荡，下列叙述中，错误的是（ ）。
- A. 主要症状是受伤当时立即出现短暂的意识障碍，一般不超过半小时  
B. 清醒后逆行性遗忘  
C. 神经系统检查无阳性体征  
D. 脑脊液检查有红细胞  
E. 无肉眼可见的神经病理改变
43. 挤压综合征最常引起（ ）。
- A. 急性肾功能衰竭                      B. 呼吸困难                      C. 心力衰竭                      D. 昏迷  
E. 肝缺血坏死
44. 局麻药中加入肾上腺素禁用于（ ）。
- A. 腹部手术                      B. 指、趾末节手术                      C. 胸部手术                      D. 面部手术  
E. 颈部手术
45. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最关键的治疗是（ ）。
- A. 及时使用抗生素                      B. 应用肾上腺皮质激素  
C. 及时用升压药                      D. 紧急胆道减压手术  
E. 纠正水电解质酸碱失衡
46. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是（ ）。
- A. 阑尾开口小                      B. 阑尾淋巴丰富  
C. 阑尾蠕动慢而弱                      D. 阑尾动脉为终末动脉

E. 阑尾系膜短

47. 患者，男，70岁，粪便中带血两年，逐渐消瘦，查体：面色苍白，腹软，右侧腹部触及一约5cm×4cm大小肿块，较硬，触之痛，则该患者可能为（ ）。

- A. 右侧结肠癌      B. 克隆氏病      C. 肠结核      D. 阿米巴肠病  
E. 溃疡性结肠炎

48. 患者，男，毕Ⅱ氏胃大部切除术后2年，上腹部有烧灼痛，抗酸剂治疗无效，有时呕吐，内含胆汁，吐后腹部无缓解，体重减轻，胃镜下黏膜充血水肿，易出血，最可能的诊断是（ ）。

- A. 输入段综合征      B. 输出段梗阻      C. 碱性反流性胃炎      D. 吻合口梗阻  
E. 吻合口溃疡

49. 男性，65岁，进行性吞咽困难2个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋巴结，食管X线钡餐透视显示：食管中段黏膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄。如病人出现声音嘶哑，提示肿瘤已侵犯（ ）。

- A. 声带      B. 气管隆突      C. 迷走神经      D. 喉返神经  
E. 喉上神经

50. 一急性再生障碍型贫血患者，突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，考虑该患者可能发生的情况是（ ）。

- A. 高血压脑病      B. 脑梗死      C. 脑动脉痉挛      D. 颅内出血  
E. 高血压危象

51. 尿道球部损伤最常见的病因是（ ）。

- A. 尿道镜检查      B. 会阴部刺伤      C. 会阴部骑跨伤      D. 尿道扩张  
E. 骨盆骨折

52. 股骨干下1/3骨折损伤的结构是（ ）。

- A. 股静脉      B. 股神经      C. 股动脉      D. 大隐静脉  
E. 腓动脉

53. 诊断脊髓损伤最有价值的检查是（ ）。

- A. MRI      B. ECT      C. X线片      D. CT  
E. B超

54. 桡骨下段骨折首选的治疗方法是（ ）。

- A. 切开复位钢板内固定      B. 抗炎镇痛  
C. 中药活血化瘀      D. 手法复位外固定  
E. 直接支具外固定

55. 属于骨折早期并发症的是（ ）。

- A. 脂肪栓塞综合征      B. 缺血性肌挛缩  
C. 创伤性关节炎      D. 损伤性骨化  
E. 急性骨萎缩

56. 男，35岁。反复右腰部绞痛伴血尿，KUB见右肾结石，长径1.8cm。IVU见右肾轻度积水，输尿管

加展鸿医考张老师微信(15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

管显影正常。首选的治疗方法是（ ）。

- A. 经皮肾镜碎石取石
- B. 输尿管镜碎石取石
- C. 体外冲击波碎石
- D. 药物排石
- E. 抗炎治疗

57. 某患者鼻周围三角区感染化脓，忌热敷，其主要原因是（ ）。

- A. 易加重疼痛
- B. 可导致颅内感染
- C. 易导致面部皮肤烫伤
- D. 易加重局部出血
- E. 以上都是

58. 尿毒症病人以碳酸氢钠静脉滴入纠正代谢性酸中毒时发生手足抽搐的机制是（ ）。

- A. 高钠血症继发脑水肿
- B. 低钾血症
- C. 血中游离钙降低
- D. 血中钙总量降低
- E. 血中结合钙降低

59. 女，28岁，妊娠28周。2小时糖耐量试验血糖水平依次为50、95、100及85mg/dl，1周后早餐后2小时血糖为87mg/dl，患者系初次妊娠，既往无糖尿病史。诊断为（ ）。

- A. 糖耐量正常
- B. 妊娠期糖耐量减低
- C. 妊娠期糖尿病
- D. 糖尿病合并妊娠

60. 与病理缩复环关系最密切的是（ ）。

- A. 双胎妊娠
- B. 嵌顿性肩先露
- C. 子宫收缩过强
- D. 胎盘早剥

61. 初产妇，27岁，产前各项检查正常。自然分娩1小时后阴道出血增多。查体：脉搏110次/分，血压80/60mmHg。估计出血量约为（ ）。

- A. 全身血容量的20%以下
- B. 全身血容量的20%~30%
- C. 全身血容量的30%~40%
- D. 全身血容量的40%以上

62. 用硫酸镁治疗妊娠高血压疾病，最早出现的中毒症状是（ ）。

- A. 心率减慢
- B. 血压降低
- C. 膝反射消失
- D. 尿量减少

63. 下列选项不符合羊水栓塞临床表现的是（ ）。

- A. 休克症状
- B. 分娩过程中突然出现呛咳、呼吸困难
- C. 较短时间内即发生呼吸、循环功能衰竭
- D. 休克的出现与失血量呈正比
- E. 晚期常有急性肾功能衰竭

64. 无排卵型功血是由于（ ）。

- A. 雌激素和孕激素撤退，使子宫内膜坏死脱落出血
- B. 孕激素和促性腺激素撤退，使子宫内膜坏死脱落出血
- C. 雌激素和促性腺激素释放激素撤退引起的子宫出血
- D. 单一雌激素刺激而无孕酮对抗而引起的撤退性出血
- E. 单一孕激素刺激而无雌激素对抗而引起的撤退性出血

65. 在维持阴道正常菌群中起关键作用的是 ( )。
- A. 念珠菌                      B. 支原体                      C. 大肠杆菌                      D. 乳酸杆菌  
E. 葡萄球菌
66. 某初产妇, 停经 50 天出现阴道少量流血, 伴轻微小腹痛, 妇科检查发现该患者宫颈口关闭, 子宫增大, 约孕 50 天大小, 妊娠试验阳性。该孕妇最可能的诊断是 ( )。
- A. 先兆性流产                      B. 难免性流产                      C. 不全流产                      D. 完全流产  
E. 习惯性流产
67. 与排卵后基础体温升高有关的激素是 ( )。
- A. 卵泡雌激素                      B. 缩宫素                      C. 雌激素                      D. 黄体生成素  
E. 孕激素
68. 女, 25 岁, 初孕妇。妊娠 12 周, 尿频、尿急、尿痛伴阴道分泌物增多 4 天。查体: 尿道口及宫颈口均见脓性分泌物, 为确诊首选的辅助检查是 ( )。
- A. 羊水培养                      B. 血培养  
C. 宫颈管分泌物培养                      D. 血清学检查  
E. 尿培养
69. 异位妊娠最常见的发生部位是 ( )。
- A. 输卵管间质部                      B. 输卵管系膜                      C. 输卵管壶腹部                      D. 输卵管峡部  
E. 输卵管伞部
70. 对 HBeAg 阳性母亲生下的新生儿的预防处理, 最好的方法是 ( )。
- A. 丙种球蛋白                      B. 乙肝疫苗  
C. 高效价乙肝免疫球蛋白                      D. 乙肝疫苗+高效价乙肝免疫球蛋白  
E. 乙肝疫苗+丙种球蛋白
71. 对正常足月新生儿, 暂不能引出的神经反射是 ( )。
- A. 腹壁反射                      B. 觅食反射                      C. 吸吮反射                      D. 握持反射  
E. 拥抱反射
72. 关于小儿生理性腹泻, 下列选项中不正确的是 ( )。
- A. 多见于渗出体质的小儿                      B. 大便为黄绿色稀便, 大便次数多  
C. 无呕吐等其他消化道症状                      D. 镜检粪中有大量白细胞  
E. 生长发育不受影响
73. 8 个月患儿, 腹泻 4 天, 尿很少, 精神萎靡, 呼吸深长, 皮肤弹性差, 前囟、眼眶明显凹陷, 肢冷、脉弱, 心率 160 次/分, 心音低钝, 考虑诊断为 ( )。
- A. 重度脱水+酸中毒                      B. 中度脱水+酸中毒+心力衰竭  
C. 重度脱水+低钾血症                      D. 中度脱水+低钾血症  
E. 重度脱水+低钾血症+心力衰竭
74. 最能反映小儿近期营养状态变化的描述是 ( )。
- A. 身高                      B. 胸围                      C. 腹围                      D. 体重

E. 头围

75. 婴儿出现无胆汁的喷射性呕吐、胃肠蠕动波和右上腹肿块，首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 幽门痉挛
- B. 先天性肥厚型幽门狭窄
- C. 先天性巨结肠
- D. 胃食管反流病
- E. 胃扭转

76. 关于产前检查，正确的是（ ）。

- A. 一般孕妇妊娠 20~36 周，每 4 周检查一次
- B. 首次产前检查是从妊娠 12 周开始
- C. 高危孕妇从妊娠开始每 2 周一次
- D. 妊娠 37 周后每周 2 次
- E. 一般孕妇共进行产前检查 10~12 次

77. 川崎病急性期最佳治疗药物是（ ）。

- A. 阿司匹林
- B. 丙种球蛋白+阿司匹林
- C. 糖皮质激素+阿司匹林
- D. 糖皮质激素
- E. 丙种球蛋白

78. 新生儿沙眼衣原体感染的主要途径是（ ）。

- A. 呼吸道感染
- B. 宫内感染
- C. 乳汁感染
- D. 产道感染
- E. 唾液感染

79. 不属于垂体腺瘤典型症状或体征的是（ ）。

- A. 视神经萎缩
- B. 癫痫发作
- C. 停经、泌乳
- D. 双颞侧偏盲
- E. 肢体肥大

80. 川崎病的诊断标准不包括（ ）。

- A. 双眼球结膜充血、唇红干裂和杨梅舌
- B. 遍布全身的荨麻疹样、麻疹样、猩红热样皮疹
- C. 发热呈稽留热或弛张热
- D. 手足皮肤广泛硬性水肿，继之手掌、脚底有弥漫性红斑或膜样脱皮
- E. 关节疼痛、肿大

二、多项选择题（本大题共 10 题，每题 1.5 分，共 15 分。以下每一道考题下面有几个备选答案，其中有两个或两个以上正确答案。错选、多选或未选均不得分。）

81. 以下高钾血症的处理原则是（ ）。

- A. 积极防治心律失常
- B. 立即停止钾盐摄入
- C. 降低血清钾浓度
- D. 原发病治疗
- E. 改善肾功能

82. 法洛三联症是指（ ）。

- A. 室间隔缺损            B. 肺动脉口狭窄            C. 右心房肥大            D. 主动脉骑跨  
E. 右心室肥大
83. 以下关于纳洛酮的叙述，正确的是（    ）。
- A. 为吗啡受体拮抗剂            B. 可治疗麻醉性镇痛药急性中毒  
C. 可治疗安眠药中毒            D. 可治疗酒精中毒  
E. 可治疗毒鼠强中毒
84. HIV 高危人群包括（    ）。
- A. 性乱交者            B. 医务人员            C. 男同性恋者            D. 多次输血者  
E. 静脉药瘾者
85. 病人就诊时出现昏迷、针尖样瞳孔，可见于（    ）。
- A. CO 中毒            B. 有机磷农药中毒  
C. 吸毒            D. 脑干出血  
E. 安定中毒
86. 下列哪些肿瘤是起源于间叶组织的恶性肿瘤？（    ）
- A. 淋巴管瘤            B. 脂肪肉瘤            C. 畸胎瘤            D. 骨肉瘤
87. 高血压脑病的临床表现包括（    ）。
- A. 动脉压升高            B. 颅内压增高            C. 意识障碍            D. 阵发性呼吸困难
88. 伤寒玫瑰疹的特点（    ）。
- A. 直径在 2~4 毫米，多在 10 个以内            B. 浅红色小斑丘疹，压之褪色  
C. 多在 2~4 天内消失            D. 多分布在胸腹部
89. 乙型肝炎血清学流行率调查中，常用的三大指标是（    ）。
- A. HBsAg            B. 抗-HBs            C. e 抗原            D. 抗-HBc
90. 早产常见的病因有（    ）。
- A. 胎膜早破            B. 羊水过多  
C. 子宫畸形            D. 孕妇合并急性或慢性疾病

**三、判断题（本大题共 10 个小题。每小题 0.5 分，共 5 分。正确的选 A，错误的选 B。）**

91. 癫痫诊断的有效检查项目是头部 CT。  
A. 正确  
B. 错误
92. 孕激素有加强输卵管肌节律性收缩振幅的作用。  
A. 正确  
B. 错误
93. 猝死型冠心病经过及时有效的心脏复苏，可挽救病人生命。  
A. 正确

B. 错误

94. 严重感染者只需联合用药，不必做细菌培养。

A. 正确

B. 错误

95. 化学性烧伤应当搞清楚致伤物质后再进行创面急救处理。

A. 正确

B. 错误

96. 非必需氨基酸是指人体代谢中可有可无的氨基酸。

A. 正确

B. 错误

97. 一旦诊断为粘连性肠梗阻，应及时行手术治疗解除梗阻。

A. 正确

B. 错误

98. 抑郁症的首要症状是精力明显减退、疲乏。

A. 正确

B. 错误

99. 大量胸腔积液患者应常规使用糖皮质激素改善毒性症状，加速胸液吸收，减少胸膜粘连或胸膜增厚等后遗症。

A. 正确

B. 错误

100. 去大脑强直常表现为上肢屈曲，下肢伸直。

A. 正确

B. 错误

## 展鸿《临床医学》模拟卷（一）

## 参考答案及解析

1. 【答案】A。解析：中心静脉压（CVP）测定对了解有效循环血容量和右心功能有重要意义。正常值为 0.49~1.18Kpa（5~12cmH<sub>2</sub>O）。此患者 CVP<0.49Kpa，说明有效循环血容量不足，心率快是心脏代偿性表现，应迅速补充液体。故本题选 A。

2. 【答案】B。解析：胸腔穿刺抽液引起急性肺水肿是由于抽液过多、过快，胸内压突然下降引起。故本题选 B。

3. 【答案】D。解析：骨髓穿刺禁忌严重出血的血友病病人，有出血倾向或凝血时间明显延长者不宜做骨穿；晚期妊娠的妇女慎做骨穿；小儿及不合作者不宜做胸骨穿刺。故本题选 D。

4. 【答案】D。解析：清创术操作步骤：（1）伤口周围油污应用松节油擦去，伤口周围皮肤用碘酊、乙醇消毒；（2）取出明显可见异物、血块及脱落的组织碎片，用 0.9%氯化钠注射液反复冲洗伤口；（3）常规消毒铺巾；（4）沿原伤口切除创缘皮肤 1~2mm，必要时可扩大伤口；（5）切除失去活力的组织和明显挫伤的创缘组织；（6）彻底止血；（7）再用 0.9%氯化钠注射液反复冲洗伤口，污染严重者可用 3%过氧化氢溶液冲洗伤口再以 0.9%氯化钠注射液冲洗；（8）彻底清创后，可予缝合伤口。故本题选 D。

5. 【答案】B。解析：证实胃管在胃内的方法：（1）连接注射器于胃管末端进行抽吸，抽出胃液；（2）置听诊器于病人胃区，快速经胃管向胃内注入 10ml 空气，听气过水声；（3）将胃管末端置于盛水的治疗碗内，无气泡逸出。B 项错误。故本题选 B。

6. 【答案】D。解析：胃插管术禁用于鼻咽部有癌肿或急性炎症的患者；食管静脉曲张、上消化道出血、心力衰竭和重度高血压患者；吞食腐蚀性药物的患者。故本题选 D。

7. 【答案】C。解析：胸腔穿刺一定要在肋骨上缘进针，沿肋骨下缘进针，会误伤沿肋骨下缘走向的血管、神经。故本题选 C。

8. 【答案】D。解析：口对口人工呼吸采用仰头举颏法是为了解除舌后坠造成的咽阻塞，打通气道，使气道通畅。故本题选 D。

9. 【答案】A。解析：胸外心脏按压法，按压部位在胸骨中下 1/3 交界处或胸骨下段剑突上 2.5~5cm 处，按压频率至少为 100 次/分，成人按压深度至少 5cm，不能应用冲击式猛压，下压时间与放松时间比为 1:1，放松时手掌根不能离开胸骨。A 项正确。故本题选 A。

10. 【答案】D。解析：开胸心脏按压术，切口取左胸乳头下一个肋间，从胸骨左缘至腋中线，用推压法或按压法按压心脏；按压频率一般为 60~70 次/分；可配合按压，向左心室注入肾上腺素开胸心脏。按压后心脏恢复，血压逐渐稳定后，胸壁和心包切口开始出血，应仔细结扎出血部位，并冲洗心包腔和胸腔，在膈神经后侧作心包引流切口，缝合心包。D 项错误。故本题选 D。

11. 【答案】C。解析：气管切开术的适应症有：（1）喉阻塞；（2）下呼吸道分泌物潴留；（3）预防性气管切开；（4）取气管异物；（5）颈部外伤伴有咽喉或气管、颈段食管损伤者。各种原因引起的 I 度和 II 度呼吸困难可行氧疗改善呼吸困难，无需气管切开。故本题选 C。

12. 【答案】E。解析：由各种原因引起的昏迷、下呼吸道炎症、胸部外伤或手术后不能有效咳嗽排痰以致下呼吸道分泌物阻塞，可考虑气管切开。故本题选 E。

13. 【答案】C。解析：在中心静脉压测定中，医用塑料导管或硅胶管从静脉切口插至上腔静脉或下腔静脉处，一般插入深度为 35~45cm。故本题选 C。

14. 【答案】B。解析：呼吸困难、心绞痛、晕厥是主动脉瓣狭窄的临床“三联征”。故本题选 B。

15. 【答案】C。解析：急性心肌梗死的定位主要依据是病理性 Q 波出现的导联。前间壁心肌梗死：V1、V2、(V3) 导联；前壁心肌梗死：V3、V4、(V5) 导联；广泛前壁：V1~V6 导联；前侧壁：V5、V6、(I、aVL) 导联；高侧壁：I、aVL、(V5、V6) 导联；下壁：II、III、aVF 导联；后壁：V7~V9 导联；右室：V3R~V5R 导联。故本题选 C。

16. 【答案】A。解析：甲型流感是一种急性呼吸道传染性疾病，主要通过空气和飞沫传播。故本题选 A。

17. 【答案】C。解析：有机磷农药中毒呼吸为大蒜味；酮症酸中毒呼吸为烂苹果味；尿毒症呼吸为尿味；肺癌晚期呼吸为腥臭味。故本题选 C。

18. 【答案】A。解析：里急后重是指腹痛窘迫，时时欲便，肛门重坠，为急性菌痢常见症状之一。故本题选 A。

19. 【答案】D。解析：M 样症状（毒蕈碱样症状）是指交感神经兴奋引起平滑肌痉挛，如瞳孔缩小，腹痛、腹泻；腺体分泌增强，如流涎、大汗。重者发生肺水肿或呼吸衰竭死亡。N 样症状（烟碱样症状）是指激动 N2 受体出现肌肉震颤、抽搐，严重者出现肌无力甚至呼吸肌麻痹；激动 N1 受体可引起交感节后纤维兴奋，可出现血压升高。故本题选 D。

20. 【答案】A。解析：腹水最常见的原因是肝硬化，但多见于失代偿期，代偿期很少有水肿，严重者还伴有胸水，也可致阴囊水肿。因此以腹水为突出表现的患者，应首先考虑为肝性水肿。故本题选 A。

21. 【答案】C。解析：艾滋病主要通过性传播、血液传播和母婴传播，直接接触不会导致艾滋病。故本题选 C。

22. 【答案】D。解析：上消化道或小肠出血在肠腔内停留的时间较长，因红细胞破坏后，血红蛋白在肠道内与硫化物结合形成硫化铁，这种化合物可使大便变黑，因形、色如柏油，因此称为柏油样便。故本题选 D。

23. 【答案】C。解析：吸烟是支气管肺癌最重要的高危因素。支气管肺癌局部症状是由肿瘤在局部生长时刺激、阻塞、浸润和压迫组织所引起的症状，常见咳嗽、痰中带血或咯血、胸痛、胸闷、气急、声音嘶哑等；全身症状可出现发热、消瘦和恶病质等。故本题选 C。

24. 【答案】D。解析：贫血是指人体外周血红细胞容量减少，低于正常范围下限的一种常见的临床症状。由于红细胞容量测定较复杂，因此临床上常以血红蛋白（Hb）浓度来代替。故本题选 D。

25. 【答案】C。解析：流行性感是流感病毒引起的急性呼吸道感染，也是一种传染性强、传播速度快的疾病，极易发生大范围流行；人群普遍易感，潜伏期一般为 1~4 天，起病急；人体在感染病毒后会产生特异性的细胞免疫和体液免疫。因此 C 项说法错误。故本题选 C。

26. 【答案】C。解析：慢性肝炎患者可根据具体情况采用综合性治疗方案，包括合理的休息和营养，保持心理平衡，改善和恢复肝功能，调节机体免疫，抗病毒、抗纤维化等治疗。可适当进食高蛋白、高热量、高维生素等易消化食物，有利于肝脏修复，避免过分强调高营养，避免饮酒，以防发生脂肪肝。因此 C 项说法错误。故本题选 C。

27. 【答案】D。解析：破伤风病人最先受影响的肌群是咀嚼肌，随后顺序为面部表情肌、颈、背、腹、四肢肌，最后为膈肌。故本题选D。

28. 【答案】B。解析：流行性乙型脑炎是经蚊传播的血液性传染疾病，故应做好防蚊灭蚊的工作。故本题选B。

29. 【答案】D。解析：肠管损伤中以小肠损伤多见，并且往往发生在空肠上段或回肠下端，因系膜短而固定，移动性小，故易受损伤。故本题选D。

30. 【答案】A。解析：中性粒细胞增多见于急性化脓性感染（疖痈、脓肿、肺炎、阑尾炎、丹毒、败血症、内脏穿孔、猩红热等），各种中毒（酸中毒、尿毒症、铅中毒、汞中毒等），组织损伤，恶性肿瘤，急性大出血，性溶血等。故本题选A。

31. 【答案】C。解析：若持续听诊3~5分钟未听到肠鸣音，此时应重点听诊右下腹，并可用手指轻叩或搔弹腹部，若仍无肠鸣音，则为肠鸣音消失，常见于急性腹膜炎或麻痹性肠梗阻。故本题选C。

32. 【答案】D。解析：胸壁疾病引起的胸痛有急性皮炎、皮下蜂窝织炎、带状疱疹、流行性胸痛、肌炎、非化脓性肋软骨炎、肋间神经炎、肋骨骨折、急性白血病、多发性骨髓瘤等。排除A、B、C项。故本题选D。

33. 【答案】A。解析：人的血液正常PH在7.35~7.45的范围，当血浆PH低于7.35时为酸中毒，当血浆PH高于7.45为碱中毒。故本题选A。

34. 【答案】A。解析：胸膜摩擦音最常听到的部位是腋中线下侧胸壁，可随体位的变动而消失或复现。当胸腔积液较多时，因两层胸膜被分开，摩擦音可消失；在积液吸收过程中当两层胸膜又接触时胸膜摩擦音可再出现。故本题选A。

35. 【答案】A。解析：头痛、偏瘫或昏迷病人，若腰椎穿刺获得均匀血色脑脊液，提示为出血性脑病（脑出血或蛛网膜下腔出血）；若脑脊液为无色透明提示为缺血性脑病。故本题选A。

36. 【答案】C。解析：WHO 癌痛三阶梯止痛法具体方案：①第一阶梯：轻度疼痛给予非阿片类药+辅助用药。②第二阶梯：中度疼痛给予弱阿片类药+非阿片类药+辅助用药。③第三阶梯：重度疼痛给予强阿片类药+非阿片类药+辅助用药。故本题选C。

37. 【答案】D。解析：急性蜂窝组织炎红肿的皮肤与周围正常组织无明显的界限，而丹毒出现的红斑呈进行性扩大，界限清楚。故本题选D。

38. 【答案】D。解析：急性坏死性肠炎最典型的临床表现是粪便呈暗红色糊状，其后渐为黄水样，继之呈白水状或呈赤豆汤和果酱样，粪便少且恶臭，有腐败腥臭味，对诊断急性坏死性肠炎具有重要意义。故本题选D。

39. 【答案】B。解析：宫颈癌早期表现多为接触性出血，中晚期为不规则阴道流血。故本题选B。

40. 【答案】E。解析：生理盐水为等渗溶液，含钠离子和氯离子相等，当机体发生等渗性脱水时，肾血流受阻，排氯功能受阻，大量输入生理盐水可导致氯离子积聚过多引起高氯血症。故本题选E。

41. 【答案】B。解析：上尿路结石大而活动度小的肾结石可无痛，小而活动度大的结石疼痛较重，甚至出现肾绞痛。因此B项说法错误。故本题选B。

42. 【答案】D。解析：脑震荡主要症状是受伤当时立即出现短暂的意识障碍，一般不超过半小时；临床表现为短暂性昏迷、逆行性遗忘以及头痛、恶心和呕吐等症状；神经系统检查无阳性体征发现，无

加展鸿医考张老师微信（15336535813），回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

肉眼可见的神经病理改变；腰椎穿刺颅内压正常，部分患者可出现颅内压降低；脑脊液无色透明，不含血，白细胞数正常。因此D项说法错误。故本题选D。

43. 【答案】A。解析：挤压综合征主要表现为以肢体肿胀、肌红蛋白尿、高血钾为特点的急性肾功能衰竭。故本题选A。

44. 【答案】B。解析：局麻药中加入肾上腺素可延缓麻醉药吸收，延长麻醉时间，但禁用于指趾末节手术，因其血管收缩会导致肢体末端缺血坏死。故本题选B。

45. 【答案】D。解析：急性梗阻性化脓性胆管炎是在胆道梗阻的基础上伴发胆管急性化脓性感染、脓液和胆道高压，最关键的治疗是紧急胆总管切开引流，减轻胆道压力。故本题选D。

46. 【答案】D。解析：阑尾的血供为回肠动脉的终末分支动脉，没有侧支循环，一旦受压就容易出现缺血、坏死和穿孔。故本题选D。

47. 【答案】A。解析：右侧结肠癌是位于腹部偏右侧这一段结肠发生的结肠癌，主要表现是大便次数增多，大便带粘液和血，癌肿可以增大形成狭窄，继而出现腹胀、腹痛、不排气等肠梗阻的症状。故本题选A。

48. 【答案】B。解析：输出段梗阻多因术后粘连、大网膜水肿或炎性肿块压迫等所致，表现为上腹饱胀，呕吐食物和胆汁，胃镜表黏膜充血水肿。故本题选B。

49. 【答案】D。解析：肿瘤压迫喉返神经或者单侧损伤可造成声音嘶哑，双侧损伤可造成窒息。故本题选D。

50. 【答案】D。解析：急性再生障碍性贫血起病急，贫血呈进行性加重，常伴有严重的感染和内脏出血，患者突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，为脑部症状，应考虑为颅内出血。故本题选D。

51. 【答案】C。解析：男性前尿道损伤中最常见的是尿道球部损伤，骑跨伤是其典型的致病因素。会阴部骑跨时，将尿道挤向耻骨联合下方，引起尿道球部损伤。故本题选C。

52. 【答案】E。解析：股骨下1/3骨折时，由于血管位于骨折的后方，而且骨折远断端常向后成角，易刺伤该处的腘动、静脉。故本题选E。

53. 【答案】A。解析：MRI不仅可了解脊髓受压程度，还可观察脊髓信号强度、脊髓信号改变的范围和脊髓萎缩情况等，是诊断脊髓损伤最有价值的检查。故本题选A。

54. 【答案】D。解析：桡骨下段骨折首选的治疗方法是手法复位外固定。复位后，保持腕关节掌屈及尺偏位，石膏或外固定架固定4周。故本题选D。

55. 【答案】A。解析：骨折早期的并发症有休克、脂肪栓塞综合征、重要内脏器官损伤、重要周围组织损伤和骨筋膜室综合征；晚期并发症有坠积性肺炎、褥疮、下肢静脉血栓、感染、损伤性骨化、创伤性关节炎、关节僵硬、急性骨萎缩、缺血性骨坏死和缺血性肌痉挛。故本题选A。

56. 【答案】C。解析：肾结石小于0.6cm应先采用保守疗法；0.6~2.0cm采用体外冲击波碎石；>2.0cm采用经皮肾镜治疗。该患者为1.8cm，应采用体外冲击波碎石。故本题选C。

57. 【答案】B。解析：因面部危险三角区血管丰富又无静脉瓣，且与颅内海绵窦相通，热敷可造成颅内感染和败血症。故本题选B。

58. 【答案】C。解析：尿毒症病人以碳酸氢钠静脉滴入纠正代谢性酸中毒时，如果补充过快，会使血中游离钙降低，发生手足抽搐。故本题选C。

59. 【答案】A。解析：目前国内常用的糖耐量试验及妊娠糖尿病的诊断标准为：(1) 空腹静脉血浆血糖 $\geq 5.1\text{mmol/L}$ ；(2) 口服葡萄糖 75g，1 小时后 $\geq 10.0\text{mmol/L}$ ；(3) 2 小时 $\geq 8.5\text{mmol/L}$ ；(4) 3 小时 $\geq 8.0\text{mmol/L}$ 。其中两项符合就考虑糖尿病。题干中糖耐量试验均为正常。故本题选 A。

60. 【答案】B。解析：嵌顿性肩先露时，宫缩继续加强，子宫上段越来越厚，子宫下段被动扩张越来越薄，子宫上下段肌壁厚薄悬殊，形成环状凹陷。此环状凹陷随宫缩逐渐升高，可高达脐上，形成病理缩复环，是子宫破裂先兆，若不及时处理，将发生子宫破裂。因此与病理性缩复环关系最密切的是嵌顿性肩先露。故本题选 B。

61. 【答案】B。解析：此题采用了休克指数法 (SI) 来估计产后出血量， $SI = \text{脉率} / \text{收缩压 (mmHg)}$ 。SI=0.5 为正常；SI=1 时，为轻度休克； $1 < SI \leq 1.5$  时，失血量为全身血容量的 20%~30%； $1.5 < SI \leq 2.0$  时，失血量为全身血容量的 30%~50%； $SI > 2.0$ ，失血量为全身血容量的 50%以上，属重度休克。本题中  $SI = 110/80 = 1.375$ ，失血量为全身血容量的 20%~30%，故本题选 B。

62. 【答案】C。解析：硫酸镁中毒现象首先表现为膝反射减弱或消失，随着血镁浓度的不断增加可出现全身肌张力减退及呼吸抑制，严重者心脏骤停。故本题选 C。

63. 【答案】D。解析：部分羊水栓塞患者出现休克，表现为大量阴道流血为主的全身出血倾向，也有部分病人只是以不易控制的阴道流血为主要表现。因此 D 项说法错误。故本题选 D。

64. 【答案】D。解析：无排卵型功血是由于不成熟的卵泡分泌的雌激素不能达高峰，导致卵巢不能排卵形成黄体，无法分泌孕激素，子宫内膜就一直停留在增殖期而不能转变为分泌期，从而导致无排卵型子宫出血。故本题选 D。

65. 【答案】D。解析：阴道内正常存在的乳酸杆菌对维持阴道正常菌群起着关键的作用，可使阴道局部形成弱酸性环境，抑制其他寄生菌的过度生长。故本题选 D。

66. 【答案】A。解析：(1) 先兆流产：停经后少量阴道流血，量比月经少，有时伴有轻微下腹痛和腰痛。子宫大小与停经周数相符，宫颈口未开，胎膜未破，妊娠产物未排出。(2) 难免流产：阴道流血量增多，阵发性腹痛加重。妇科检查子宫大小与停经周数相符或略小，宫颈口已扩张，但组织尚未排出；晚期难免流产可见胚胎组织或胎囊堵于宫口。(3) 不全流产：妊娠产物已部分排出体外，尚有部分残留于宫内，阴道出血可持续不止，下腹痛减轻。妇科检查一般子宫小于停经周数，宫颈口已扩张，不断有血液自宫颈口内流出，有时尚可见胎盘组织堵塞宫颈口，或部分妊娠产物已排出于阴道内，而部分仍留在宫腔内。(4) 完全流产：妊娠产物已完全排出，阴道出血逐渐停止，腹痛逐渐消失。妇科检查子宫接近未孕大小或略大，宫颈口已关闭。(5) 稽留流产：指胚胎或胎儿已死亡，滞留在宫腔内尚未排出者。(6) 习惯性流产：指同一性伴侣自然流产连续发生 3 次或 3 次以上的自然流产。题干中患者宫颈口关闭，阴道少量流血，伴轻微腹痛，子宫大小与停经周数相符，最可能的诊断是先兆流产。故本题选 A。

67. 【答案】E。解析：排卵后次日，因卵巢形成黄体，分泌孕激素会使体温上升 0.6 摄氏度左右，使体温呈现高低两相变化。故本题选 E。

68. 【答案】C。解析：患者为初孕妇，尿频、尿急、尿痛伴阴道分泌物增多 4 天，尿道口及宫颈口均见脓性分泌物，考虑为妊娠期细菌性阴道炎合并尿路感染。为确诊应首选的辅助检查是宫颈管分泌物培养。故本题选 C。

69. 【答案】C。解析：输卵管壶腹部是异位妊娠最常见的发生部位，其次为峡部，伞部和间质部最

加展鸿医考张老师微信 (15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试试面资料

少见。故本题选 C。

70. 【答案】D。解析：HBeAg 阳性母亲生下的新生儿属于暴露于 HBV 的易感者，生后 12 小时内应接种乙肝疫苗和高效价乙肝免疫球蛋白来获得主动和被动免疫。故本题选 D。

71. 【答案】A。解析：正常足月新生儿生后具有觅食反射、吸吮反射、握持反射、拥抱反射等原始反射，腹壁反射偶可出现。故本题选 A。

72. 【答案】D。解析：小儿生理性腹泻镜检大便无或偶见少量白细胞。因此 D 项说法错误。故本题选 D。

73. 【答案】E。解析：患儿出现腹泻，尿少，皮肤弹性差，前囟、眼眶明显凹陷等为重度脱水的症状，精神萎靡、呼吸深长以及肢冷、脉弱，心率 160 次/分，心音低钝为低钾血症及心力衰竭的症状。故本题选 E。

74. 【答案】D。解析：体重在小儿体格生长指标中最易波动，是最能反映儿童生长与营养状况的指标。故本题选 D。

75. 【答案】B。解析：先天性肥厚型幽门狭窄是由于幽门肌肥厚和水肿引起的输出道梗阻。本病多见于婴儿出生后 6 个月内，主要表现为胃蠕动波、扪及幽门肿块和喷射性呕吐。故本题选 B。

76. 【答案】A。解析：孕妇首次检查一般在妊娠 6~8 周，妊娠 20~36 周时每 4 周检查 1 次，妊娠 37 周以后每周检查 1 次，共行产前检查 9~11 次。高危孕妇应酌情增加检查次数。故本题选 A。

77. 【答案】B。解析：川崎病是以全身血管炎为主要病变的急性发热出疹性小儿疾病，急性期最佳治疗药物是丙种球蛋白+阿司匹林，激素可用于静脉丙种球蛋白输注无反应性患儿的二线治疗。故本题选 B。

78. 【答案】D。解析：新生儿在通过母亲产道时，可感染衣原体引起结膜炎和肺炎。故本题选 D。

79. 【答案】B。解析：腺垂体瘤典型症状和体征包括视神经萎缩；停经、泌乳；双颞侧偏盲；肢体肥大等内分泌症状，不会导致癫痫。故本题选 B。

80. 【答案】E。解析：川崎病临床表现发热为稽留热或弛张热并伴以下 5 条中的 4 条，即可确诊：(1) 双侧眼结膜充血，无渗出物；(2) 口腔及咽部黏膜有充血，口唇干燥皸裂，杨梅舌；(3) 急性期手足红肿，亚急性期甲周脱皮；(4) 出疹主要在躯干部，斑丘疹，多形红斑样或猩红样。(5) 颈部淋巴结肿大，直径超过 1.5cm。故本题选 E。

81. 【答案】ABCDE。解析：高钾血症的处理原则是立即停止钾摄入；积极防治心律失常；迅速降低血钾；及时处理原发病和恢复肾功能；促进多余钾排出体外。故本题选 ABCDE。

82. 【答案】ABDE。解析：法洛四联症是一种常见的先天性心脏畸形。其基本病理为室间隔缺损、肺动脉狭窄、主动脉骑跨和右心室肥厚。故本题选 ABDE。

83. 【答案】ABCD。解析：纳洛酮为吗啡受体拮抗剂，主要用于：(1) 治疗阿片类药物及其他麻醉性镇痛药（如哌替啶、阿法罗定、美沙酮、芬太尼、二氢埃托啡、依托尼秦等）中毒。(2) 治疗镇静催眠药与急性酒精中毒。(3) 阿片类及其他麻醉性镇痛药依赖性的诊断。故本题选 ABCD。

84. 【答案】ACDE。解析：HIV 高危人群包括男同性恋者、性乱交者、静脉药瘾者、多次输血者等，不包括医务人员。故本题选 ACDE。

85. 【答案】BCDE。解析：有机磷农药中毒、吸毒、脑干出血、安定中毒患者可出现昏迷，针尖样

加展鸿医考张老师微信 (15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

瞳孔。CO 轻度中毒和中度中毒瞳孔无变化，重度中毒时瞳孔散大。故本题选 BCDE。

86. 【答案】BD。解析：起源于间叶组织的恶性肿瘤称为“肉瘤”，多发生于皮肤、皮下、骨膜及长骨两端。淋巴管瘤和卵巢畸胎瘤是起源于间叶组织的良性肿瘤；脂肪肉瘤和骨肉瘤是起源于间叶组织的恶性肿瘤。故本题选 BD。

87. 【答案】ABCD。解析：高血压脑病的临床表现有动脉压升高、颅内压增高、意识障碍、癫痫发作、阵发性呼吸困难、头痛、脑水肿症状以及其他脑机能障碍的症状等。故本题选 ABCD。

88. 【答案】ABCD。解析：玫瑰疹于病程第 6 天胸腹部皮肤可见压之褪色的淡红色斑丘疹，直径 2~4mm，一般在 10 个以下，分批出现，2~4 日内消退。故本题选 ABCD。

89. 【答案】ABD。解析：乙型肝炎血清学流行率调查中，常用的三大指标是 HBsAg、抗-HBs、抗-HBc。故本题选 ABD。

90. 【答案】ACD。解析：早产常见的病因有：胎膜早破、绒毛膜羊膜炎；下生殖道及泌尿系统感染；妊娠合并症和并发症；子宫过度膨胀及胎盘因素；子宫畸形；宫颈内口松弛等。故本题选 ACD。

91. 【答案】B。解析：癫痫诊断的有效检查项目是脑电图；脑血管疾病的有效检查项目是头部 CT。故本题说法错误。

92. 【答案】B。解析：孕激素生理功能为减低对缩宫素的敏感性；抑制输卵管收缩；促进腺泡发育，促进水钠排泄。故本题说法错误。

93. 【答案】A。解析：冠心病患者及时进行治疗，特别是对有可能演变为心脏骤停的心律失常及时发现，一旦患者猝死，应立即进行心肺脑复苏治疗，可挽救病人生命。故本题说法正确。

94. 【答案】B。解析：严重感染者需做细菌培养，联合用药行抗菌治疗。故本题说法错误。

95. 【答案】A。解析：化学性烧伤应及时确认是否伴有化学物质中毒，并按其救治原则及时治疗。故本题说法正确。

96. 【答案】B。解析：非必需氨基酸是指人体可以通过自身合成或从其他氨基酸转化来得到它们，不一定非从食物中摄取不可的氨基酸。故本题说法错误。

97. 【答案】B。解析：手术治疗适用于绝大多数非手术治疗无效以及反复发作的粘连性肠梗阻患者。故本题说法错误。

98. 【答案】B。解析：抑郁症的首要症状是情绪低落、兴趣下降以及乐趣丧失。故本题说法错误。

99. 【答案】B。解析：大量胸液者可每周抽液 2~3 次，直至胸液完全吸收。糖皮质激素可减少机体的变态反应及炎症反应，改善毒性症状，加速胸液吸收，减少胸膜粘连或胸膜增厚等后遗症，但有一定不良反应，应慎用。故本题说法错误。

100. 【答案】B。解析：去大脑强直常见于重症脑出血以及其他原因引起的严重脑干损伤等，主要表现为四肢强直性伸展。故本题说法错误。