

展鸿《临床医学》模拟卷（二）

答题须知

1. 本试卷满分 100 分，考试时间为 120 分钟。
2. 在作答前，请考生用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在试卷和专用答题卡的相应位置填写本人姓名、准考证号和科目代码，并用 2B 铅笔在专用答题卡上准确填涂准考证号码和科目代码。
3. 作答时请用黑色字迹的钢笔、签字笔或圆珠笔在专用答题卡指定区域作答，在草稿纸上或专用答题卡的非指定区域作答一律无效。
4. 考试结束后，请将试卷和专用答题卡一并交监考老师，严禁携带试卷和专用答题卡出考场。

一、单项选择题（本大题共 60 小题，每小题 1.5 分，共 90 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，错选、多选或未选均不得分。）

1. 房颤发生后易引起哪种并发症（ ）。
A. 严重心力衰竭 B. 体循环动脉栓塞 C. 神志模糊、抽搐 D. 肺内感染
2. 生命伦理四原则被视为医生的执业行为依据，包括尊重原则，不伤害原则、有利原则和公正原则。下列医疗行为体现出公正原则的是（ ）。
A. 请家属签署知情同意书 B. 为患者选择副作用小的药物
C. 减少不必要的医学检查项目 D. 严格按门诊挂号序号诊治患者
3. 病人呼吸气味中有大蒜味，应考虑（ ）。
A. 尿毒症 B. 酮症酸中毒 C. 有机磷农药中毒 D. 肺癌
4. 下列不属于艾滋病传播途径的是（ ）。
A. 性传播 B. 经血传播 C. 直接接触传播 D. 母婴传播
5. 肺炎时，应用肾上腺素皮质激素的禁忌症是（ ）。
A. 合并水痘 B. 中毒症状明显 C. 严重喘憋 D. 感染性休克
6. 心动周期中，主动脉瓣开放，房室瓣关闭的时期是（ ）。
A. 等容收缩期和等容舒张期 B. 心室射血期
C. 心室充盈期 D. 房缩期
7. （ ）是运送血液至肺进行气体交换的功能性血管，在肺门其分支先位于支气管前方再转向后方。
A. 脐静脉 B. 肺静脉 C. 椎动脉 D. 肺动脉
8. 流行性乙型脑炎是一种可以引起严重后果的传染病，预防本病的关键除了易感人群的预防接种外，还应做好（ ）的工作。
A. 防鼠灭鼠 B. 防蚊灭蚊 C. 防羔虫叮咬 D. 消灭蟑螂

9. PaO_2 显著下降伴 PaCO_2 明显增强主要见于 ()。
- A. COPD 所致的呼吸衰竭 B. 肺水肿所致的呼吸衰竭
C. ARDS 所致的呼吸衰竭 D. 间质性肺病所致的呼吸衰竭
E. 张力性气胸
10. 当人们长期处于暗处而突然进入明亮处时, 最初感到一片耀眼的光亮, 不能看清物体, 稍待片刻后才能恢复视觉, 这种现象叫做 ()。
- A. 色盲 B. 色弱 C. 暗适应 D. 明适应
11. 对于癫痫的药物治疗, 下列不正确的是 ()。
- A. 口服药剂量自低限开始
B. 定期复查, 注意毒性反应及副作用
C. 不能突然停药, 换药
D. 先用一种药物, 不能控制可加用其他药物
E. 完全控制和产生严重毒性反应不能兼顾时, 应满足完全控制
12. 肺炎球菌肺炎患者若高烧持续不退, 白细胞持续升高, 胸腔积液体征明显, 应考虑并发症是 ()。
- A. 肺脓肿 B. 结核性胸膜炎 C. 脓胸 D. 感染性心内膜炎
E. 心包炎
13. 主动脉关闭不全患者可出现 ()。
- A. 奇脉 B. 脉搏减弱 C. 交替脉 D. 水冲脉
E. 脉搏短绌
14. 肝性脑病患者灌肠或导泻时应禁用 ()。
- A. 25% 硫酸镁 B. 肥皂水 C. 生理盐水 D. 生理盐水加食醋
E. 乳果糖加水
15. 肺心病慢性呼吸衰竭患者血气分析结果: PH 7.18, PaCO_2 75mmHg, HCO_3^- 27.6mmol/L, 其酸碱失衡类型是 ()。
- A. 代谢性酸中毒 B. 呼吸性酸中毒
C. 代谢性碱中毒 D. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
E. 呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒
16. 属于第二级预防措施的是 ()。
- A. 遗传咨询 B. 疾病筛检 C. 病后康复 D. 健康促进
E. 疫苗接种
17. 最容易发生变异的呼吸道病毒是 ()。
- A. 甲型流感病毒 B. 副流感病毒 C. 麻疹病毒 D. 腮腺炎病毒
E. 呼吸道合胞病毒
18. 治疗脆弱拟杆菌感染所致吸入性肺脓肿首选的抗菌药物是 ()。
- A. 红霉素 B. 青霉素 C. 万古霉素 D. 克林霉素

E. 庆大霉素

19. 腹部最易损伤的空腔脏器是 ()。

- A. 结肠 B. 胃 C. 直肠 D. 小肠

20. 白细胞中对急性化脓性感染起主要反应的是 ()。

- A. 中性粒细胞 B. 嗜酸性粒细胞 C. 嗜碱性粒细胞 D. 淋巴细胞

21. 脑复苏中首选的脱水剂是 ()。

- A. 25%葡萄糖液 B. 50%葡萄糖液 C. 20%甘露醇 D. 速尿

22. 胸膜腔穿刺术常用于检查胸腔积液的性质，抽液减压或通过穿刺胸膜腔内给药，胸膜腔穿刺时常嘱患者取 ()。

- A. 膝胸位 B. 侧卧位 C. 头低脚高位 D. 坐位

23. 某急性低位肠梗阻患者，出现少尿、不口渴的临床表现，查体：血压 100/60mmHg，心率 110 次/分，则该患者最可能是 ()。

- A. 等渗性缺水 B. 低渗性缺水 C. 高渗性缺水 D. 低钾血症

24. 有关脑血栓形成不正确的是 ()。

- A. 脑血栓形成是急性缺血性脑血管病中常见类型
B. 最常见的病因是高血压
C. 在安静状态下发病
D. 无明显头痛、呕吐、意识障碍
E. 脑脊液正常

25. 等渗性脱水病人，如大量输入生理盐水治疗可导致 ()。

- A. 低氯血症 B. 低钙血症 C. 低钾血症 D. 高钾血症
E. 高氯血症

26. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最关键的治疗是 ()。

- A. 及时使用抗生素 B. 应用肾上腺皮质激素
C. 及时用升压药 D. 紧急胆道减压手术
E. 纠正水电解质酸碱失衡

27. 一急性再生障碍性贫血患者，突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，考虑该患者可能发生的情况是 ()。

- A. 高血压脑病 B. 脑梗死 C. 脑动脉痉挛 D. 颅内出血
E. 高血压危象

28. 男，18 岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术，其母亲为其供肾者，这种移植类型是 ()。

- A. 同基因移植 B. 同种异体移植 C. 异种移植 D. 同系移植
E. 自体移植

29. 直肠指检发现下列哪种情况属于前列腺穿刺活检的指征？ ()

- A. 前列腺增大 B. 前列腺硬结 C. 前列腺触痛 D. 前列腺囊性变
E. 前列腺萎缩

30. 诊断脊髓损伤最有价值的检查是 ()。
- A. MRI B. ECT C. X 线片 D. CT
E. B 超
31. 属于骨折早期并发症的是 ()。
- A. 脂肪栓塞综合征 B. 缺血性肌挛缩 C. 创伤性关节炎 D. 损伤性骨化
E. 急性骨萎缩
32. 下列属于特异性感染的是 ()。
- A. 背部痛 B. 疖病 C. 急性淋巴结炎 D. 急性乳腺炎
E. 淋巴结结核
33. 下肢浅静脉曲张最主要的原因是 ()。
- A. 盆腔内占位病变 B. 长时间站立活动 C. 静脉壁薄弱 D. 妊娠后期子宫压迫
E. 髂股静脉血栓形成
34. 下列疾病治疗后最易继发肛瘘的是 ()。
- A. 肛周脓肿 B. 外痔 C. 肛裂 D. 混合痔
E. 内痔
35. 切口“乙级愈合”的表现不包括 ()。
- A. 积液 B. 红肿 C. 血肿 D. 硬结
E. 化脓
36. 腰椎间盘突出症与腰椎管狭窄症临床症状的主要鉴别点是 ()。
- A. 二便是否障碍 B. 有无鞍区感觉障碍
C. 腰痛及下肢放射痛的程度 D. 双下肢无力的程度
E. 间歇性跛行是否为主要特点
37. Thomas 征阳性提示 ()。
- A. 骶髂关节炎 B. 腰椎间盘突出症 C. 髋关节屈曲挛缩 D. 腰椎管狭窄症
E. 膝关节屈曲挛缩
38. 关于下肢丹毒临床表现的描述, 正确的是 ()。
- A. 在中央部的表面有脓栓 B. 局部多呈紫红色
C. 界限清楚 D. 局部硬肿
E. 常累及双侧肢体
39. 烧伤后第一个 8 小时应输入的液体量为估计伤后第一个 24 小时补液总量的 ()。
- A. 2/3 B. 1/3 C. 1/2 D. 1/4
E. 1/5
40. 高钾血症的病因不包括 ()。
- A. 慢性肾衰竭 B. 应用袢利尿剂 C. 应用螺内酯 D. 大量输入库存血
E. 挤压综合征
41. 女, 28 岁, 妊娠 28 周。2 小时糖耐量试验血糖水平依次为 50、95、100 及 85mg/dl, 1 周后早

- 餐后 2 小时血糖为 87mg/dl。患者系初次妊娠，既往无糖尿病史。诊断为（ ）。
- A. 糖耐量正常 B. 妊娠期糖耐量减低 C. 妊娠期糖尿病 D. 糖尿病合并妊娠
42. WHO 规定青春期为 10~19 岁，其中女性青春期开始的重要标志为（ ）。
- A. 卵泡开始发育 B. 第一性征开始发育
C. 第一次月经来潮 D. 开始出现第二性征
43. 在维持阴道正常菌群中起关键作用的是（ ）。
- A. 念珠菌 B. 支原体 C. 大肠杆菌 D. 乳酸杆菌
E. 葡萄球菌
44. 符合多囊卵巢综合征内分泌特点的是（ ）。
- A. 空腹胰岛素水平降低 B. FSH、LH 值均 \leq 5U/L
C. LH/FSH \geq 2 D. PRL 正常，FSH $>$ 40U/L
E. E1/E2 $<$ 1
45. 妊娠 10 周后，雌激素的主要来源是（ ）。
- A. 胎儿肾上腺皮质 B. 子宫平滑肌 C. 胎儿胎盘单位 D. 卵巢黄体
E. 胎儿合体滋养细胞
46. 建议在妊娠 12 周前行人工流产的心脏病的类型是（ ）。
- A. 二尖瓣狭窄人工球囊扩张术后 B. 二尖瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭 D. 轻度室间隔缺损
E. 二尖瓣狭窄伴肺动脉高压
47. IDU 取出时间一般选择在（ ）。
- A. 月经来潮 6 小时内 B. 月经期第 2~4 日
C. 月经期第 5~6 日 D. 月经前 4~6 日
E. 月经干净第 3~7 日
48. 孕早期妇女感染下列哪种病原体易导致胎儿先天性感染？（ ）
- A. 人乳头瘤病毒 B. 沙眼衣原体 C. 假丝酵母菌 D. 淋病奈瑟菌
E. 巨细胞病毒
49. 下列关于羊水的叙述，正确的是（ ）。
- A. 妊娠中期主要来自胎盘
B. 母体与羊水的交换主要通过脐带
C. 胎儿的吞咽可以使羊水量趋于平衡
D. 妊娠早期羊水主要来自胎儿尿液
E. 妊娠晚期胎儿的肝脏参与羊水的生成
50. 下列引起原发性闭经的疾病是（ ）。
- A. 空蝶鞍综合征 B. Turner 综合征 C. 神经性厌食 D. Asherman 综合征
E. 咽颅管瘤
51. 初次接种脊髓灰质炎疫苗应在出生后（ ）时候。

- A. 1 个月 B. 2 个月 C. 3 个月 D. 4 个月

52. 关于小儿生理性腹泻，下列选项中不正确的是（ ）。

- A. 多见于渗出体质的小儿 B. 大便为黄绿色稀便，大便次数多
C. 无呕吐等其他消化道症状 D. 镜检粪中有大量白细胞
E. 生长发育不受影响

53. 对正常足月新生儿，暂不能引出的神经反射是（ ）。

- A. 腹壁反射 B. 觅食反射 C. 吸吮反射 D. 握持反射
E. 拥抱反射

54. 儿童缺铁性贫血的临床表现不包括（ ）。

- A. 食欲不振 B. 心率、呼吸加快 C. 肝脾肿大 D. 面色苍白
E. 肢体震颤

55. 先天性甲状腺功能减退症在新生儿期最早引起注意的临床表现是（ ）。

- A. 智力发育落后 B. 特殊容貌 C. 生长发育延迟 D. 生理性黄疸时间延长
E. 皮肤粗糙

56. 新生儿 Apgar 评分指标不包括（ ）。

- A. 体温 B. 肌张力 C. 皮肤颜色 D. 呼吸
E. 心率

57. 不符合小儿先天性肥厚型幽门狭窄临床特点的是（ ）。

- A. 呕吐物含胆汁 B. 多于生后 2~4 周发病
C. 右季肋区下可触及橄榄样肿块 D. 少数病人有黄疸
E. 常见左向右的胃蠕动波

58. 一顺产新生儿，胎龄 35 周，出生体重 1900g，位于同龄胎儿平均体重的第 5 百分位数，对该新生儿全面准确的诊断是（ ）。

- A. 早产儿，小于胎龄儿 B. 早产儿，大于胎龄儿
C. 足月儿，小于胎龄儿 D. 早产儿，适于胎龄儿
E. 足月儿，低出生体重儿

59. 癌起源于（ ）。

- A. 腺体组织 B. 上皮细胞 C. 肌肉组织 D. 脂肪组织
E. 结缔组织

60. 下列哪项违反了手术时无菌操作规则？（ ）

- A. 穿无菌手术衣后手术者背部不能接触
B. 穿无菌手术衣后，手术者肩以上不能接触
C. 穿无菌手术衣后，腰以下不能接触
D. 穿无菌手术衣后，手术者双手可交叉置于腋下
E. 不可在手术人员背后传递器械

二、判断题（本大题共 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。正确的选 A，错误的选 B。）

61. 我国高血压病最常见的并发症是高血压脑病，脑卒中。

A. 正确 B. 错误

62. 消化性溃疡最常见的并发症是穿孔。

A. 正确 B. 错误

63. 一旦诊断为粘连性肠梗阻，应及时行手术治疗解除梗阻。

A. 正确 B. 错误

64. 孕激素有加强输卵管肌节律性收缩振幅的作用。

A. 正确 B. 错误

65. 抑郁症的首要症状是精力明显减退、疲乏。

A. 正确 B. 错误

66. 阴道毛滴虫不仅寄生于阴道，还常侵入尿道、尿道旁腺甚至膀胱、肾盂。

A. 正确 B. 错误

67. 注射麻疹疫苗属于被动免疫。

A. 正确 B. 错误

68. 儿童免疫系统发育不成熟的原因主要是免疫器官发育不成熟。

A. 正确 B. 错误

69. 假性肥大肌营养不良是进行性肌营养不良疾病中最常见的一种类型。

A. 正确 B. 错误

70. 妊娠剧吐多见于年轻初产妇，常引起代谢性酸中毒。

A. 正确 B. 错误

展鸿《临床医学》模拟卷（二）

参考答案及解析

一、单项选择题

1. 【答案】B。解析：房颤时心房丧失收缩功能，血液容易在心房内淤滞而形成血栓，血栓脱落后可随着血液流至全身各处，导致脑栓塞、肢体动脉栓塞等。故本题选B。

2. 【答案】D。解析：请家属签署知情同意书体现了尊重原则；为患者选择副作用小的药物体现了不伤害原则；减少不必要的医学检查项目体现了有利原则；严格按门诊挂号顺序诊治患者体现了公正原则。故本题选D。

3. 【答案】C。解析：有机磷农药中毒呼吸为大蒜味，酮症酸中毒呼吸为烂苹果味，尿毒症呼吸为尿味，肺癌晚期呼吸为腥臭味。故本题选C。

4. 【答案】C。解析：艾滋病主要是通过性传播、血液传播和母婴传播，直接接触不会导致艾滋病。故本题选C。

5. 【答案】A。解析：皮质激素对水痘病程有不利影响，可导致病毒播散，一般不宜用。故本题选A。

6. 【答案】B。解析：心动周期中，等容舒张期、心室充盈期、房缩期时主动脉瓣处于关闭状态。心室射血期主动脉瓣处于开放状态。故本题选B。

7. 【答案】D。解析：肺动脉是运送血液进行气体交换的功能性血管，其分支在肺门先位于支气管前方，后转向后方。在肺内的分支与支气管的分支伴行，直至分支进入肺泡膈，包绕肺泡壁形成肺泡毛细血管网。故本题选D。

8. 【答案】B。解析：流行性乙型脑炎是经蚊传播的血液传疾病，故应做好防蚊灭蚊的工作。故本题选B。

9. 【答案】A。解析： PaO_2 显著下降伴 $PaCO_2$ 明显增强主要见于COPD所致的呼吸衰竭。故本题选A。

10. 【答案】D。解析：由暗处到亮处，特别是强光下，最初一瞬间会感到光线刺眼发眩，几乎看不清外界事物，几秒钟之后逐渐看清物品，这种现象叫做明适应。故本题选D。

11. 【答案】E。解析：治疗癫痫时应先用一种药，从小剂量开始，如果无法控制癫痫再换一种药，以剂量足够控制癫痫发作而不出现毒性反应为准，须两者兼顾。因此E项说法错误。故本题选E。

12. 【答案】C。解析：患者高烧持续不退，白细胞升高，胸腔有积液，是脓胸继发于肺炎球菌肺炎的表现。故本题选C。

13. 【答案】D。解析：主动脉关闭不全导致动脉内收缩压增高，舒张压降低，脉压差增大所致的周围血管扩张或存在分流引起脉搏骤起骤落，犹如潮水涨落，称为水冲脉。故本题选D。

14. 【答案】B。解析：肥皂水内含有氨，给肝性脑病患者灌肠或者导泻可加重肝性脑病。故本题选B。

15. 【答案】B。解析：PH 7.18 为酸中毒， HCO_3^- 大于正常值， PaCO_2 正常，表现为呼吸性酸中毒。故本题选 B。

16. 【答案】B。解析：疾病的三级预防包括：(1) 一级预防：又称病因预防，是在疾病尚未发生时针对病因而采取的措施，也是预防、控制和消灭疾病的根本措施。加强对病因的研究，减少对危险因素的接触，是一级预防的根本。(2) 二级预防：是在疾病的潜伏期为了阻止或减缓疾病的发展而采取的措施。其措施包括：早发现、早诊断、早治疗。可采用普查、筛检、定期健康检查、高危人群重点项目检查以及设立专科门诊等措施。(3) 三级预防：又称临床预防，是在疾病的临床期为了减少疾病的危害而采取的措施，可以防止伤残和促进功能恢复，提高生命质量，延长寿命，降低死亡率。三级预防包括对症治疗和康复治疗。故本题选 B。

17. 【答案】A。解析：甲型流感病毒为常见流感病毒，是最容易发生变异的呼吸道病毒。故本题选 A。

18. 【答案】D。解析：脆弱拟杆菌为专性厌氧菌，吸入性肺脓肿合并厌氧菌感染，一般用青霉素治疗，但脆弱拟杆菌对青霉素不敏感，对林可霉素、克林霉素和甲硝唑敏感。故本题选 D。

19. 【答案】D。解析：肠管损伤中以小肠损伤多见，并且往往发生在空肠上段或回肠下端，因系膜短而固定，移动性小，故易受损伤。故本题选 D。

20. 【答案】A。解析：中性粒细胞增多见于急性和化脓性感染（疖痈、脓肿、肺炎、阑尾炎、丹毒、败血症、内脏穿孔、猩红热等），各种中毒（酸中毒、尿毒症、铅中毒、汞中毒等），组织损伤、恶性肿瘤、急性大出血、急性溶血等。故本题选 A。

21. 【答案】C。解析：脑复苏脱水以渗透性利尿为主，快速利尿药（如速尿）为辅，最常选用 20% 甘露醇，0.5~1.0g/kg 静滴，每天 4~6 次，必要时加用速尿 20~40mg。脱水治疗应持续 5~7 日。故本题选 C。

22. 【答案】D。解析：行胸腔穿刺术时嘱患者取坐位面向背椅，两前臂置于椅背上，前额伏于前臂上，不能起床患者可取半坐位，患者前臂上举抱于枕部。故本题选 D。

23. 【答案】A。解析：患者因急性低位肠梗阻出现少尿、不口渴的临床表现，最可能是等渗性缺水。故本题选 A。

24. 【答案】B。解析：脑血栓最常见的病因是动脉粥样硬化，会导致动脉粥样硬化性脑梗死，常伴高血压病。故本题选 B。

25. 【答案】E。解析：生理盐水为等渗溶液，含钠离子和氯离子相等，当机体发生等渗性脱水时，肾血流受阻，排氯功能受阻，大量输入生理盐水可导致氯离子积聚过多引起高氯血症。故本题选 E。

26. 【答案】D。解析：急性梗阻性化脓性胆管炎是在胆道梗阻的基础上伴发胆管急性化脓性感染、积脓和胆道高压，最关键的治疗是紧急胆总管切开引流。故本题选 D。

27. 【答案】D。解析：急性再生障碍性贫血起病急，贫血呈进行性加重，常伴有严重的感染和内脏出血，患者突然出现头痛、头晕、视物模糊、呼吸急促，为脑部症状，应考虑为颅内出血。故本题选 D。

28. 【答案】B。解析：患者和其母亲为同种属，不同的个体，其移植叫做同种异体移植。故本题选 B。

29. 【答案】B。解析：直肠指诊发现前列腺硬结时，属于前列腺穿刺活检的指征。故本题选 B。

加展鸿医考张老师微信 (15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试试面资料

30. 【答案】A。解析：MRI 不仅可了解脊髓受压程度，还可观察脊髓信号强度、脊髓信号改变的范围和脊髓萎缩情况等，是诊断脊髓损伤最有价值的检查。故本题选 A。

31. 【答案】A。解析：骨折早期的并发症有休克、脂肪栓塞综合征、重要内脏器官损伤、重要周围组织损伤和筋膜室综合征；晚期并发症有坠积性肺炎、褥疮、下肢静脉血栓、感染、损伤性骨化、创伤性关节炎、关节僵硬、急性骨萎缩、缺血性骨坏死和缺血性肌痉挛。故本题选 A。

32. 【答案】E。解析：淋巴结结核是由于结核杆菌侵犯淋巴结所引起的一种慢性特异性感染。故本题选 E。

33. 【答案】B。解析：下肢浅静脉曲张多见于从事持久体力劳动或站立工作的人员。故本题选 B。

34. 【答案】A。解析：肛瘘是发生在肛门直肠周围的脓肿破溃或切口引流的后遗病变。故本题选 A。

35. 【答案】E。解析：切口愈合可分为甲、乙、丙三级愈合。甲级愈合：愈合优良，无不良反应的初期愈合；乙级愈合：愈合欠佳，如红肿、硬结、血肿、积液；丙级愈合：切口化脓。故本题选 E。

36. 【答案】E。解析：腰椎管狭窄症有间歇性跛行表现，腰椎间盘突出症无此表现，是两者区分的主要鉴别点。故本题选 E。

37. 【答案】C。解析：Thomas 征阳性表现为患肢随之翘起而不能伸直平放于床面上，提示患侧髋关节有屈曲挛缩畸形。故本题选 C。

38. 【答案】C。解析：丹毒前驱症状有突然发热、寒战、不适和恶心。数小时到 1 天后出现红斑，并进行性扩大，界限清楚。患处皮温高、紧张，并出现硬结和非凹陷性水肿，受累部位有触痛、灼痛，常见近卫淋巴结肿大，伴或不伴淋巴结炎。也可出现脓疱、水疱或小面积的出血性坏死。因此 C 项说法正确。故本题选 C。

39. 【答案】C。解析：烧伤后第一个 8h 渗液最快，首个 8h 输入第一个 24 小时补液总量的 1/2，其余在后 16h 输入。故本题选 C。

40. 【答案】B。解析：若过度应用袪利尿剂会导致水与电解质紊乱，表现为低血容量、低血钾、低血钠、低钾性碱血症，长期应用还可引起低血镁。故本题选 B。

41. 【答案】A。解析：解析：目前国内常用的糖耐量试验及妊娠糖尿病的诊断标准为：(1) 空腹静脉血浆血糖 $\geq 5.1 \text{ mmol/L}$ ；(2) 口服葡萄糖 75g，1 小时后 $\geq 10.0 \text{ mmol/L}$ ；(3) 2 小时 $\geq 8.5 \text{ mmol/L}$ ；(4) 3 小时 $\geq 8.0 \text{ mmol/L}$ 。其中两项符合就考虑糖尿病。题干中糖耐量试验均为正常。故本题选 A。

42. 【答案】C。解析：WHO 规定女性青春期开始的重要标志为第一次月经来潮。故本题选 C。

43. 【答案】D。解析：阴道内正常存在的乳酸杆菌对维持阴道正常菌群起着关键的作用，可使阴道局部形成弱酸性环境，抑制其他寄生菌的过度生长。故本题选 D。

44. 【答案】C。解析：多囊卵巢综合征的内分泌特点包括月经周期不规律、不孕、多毛和(或)痤疮，黄体生成素/卵泡刺激素 (LH/FSH) 比值增大等。故本题选 C。

45. 【答案】C。解析：妊娠早期，雌激素由妊娠黄体产生；妊娠 10 周后，黄体萎缩，胎盘开始分泌雌激素和孕激素。其中，雌激素由胎儿胎盘单位分泌，孕激素和人绒毛膜促性腺激素由胎盘合体滋养层细胞分泌。故本题选 C。

46. 【答案】E。解析：二尖瓣狭窄伴肺动脉高压会导致右心衰竭，需在妊娠 12 周前行人工流产术。故本题选 E。

47. 【答案】E。解析：IDU 即宫内节育器，放置和取出时间一般选择在月经干净第 3~7 日。故本题选 E。

48. 【答案】E。解析：妊娠母体巨细胞病毒感染可通过胎盘侵袭胎儿引起先天性感染，少数造成早产、流产、死产或生后死亡。故本题选 E。

49. 【答案】C。解析：妊娠早期羊水来源是母体血清的透析物质和胎儿血浆；妊娠中期羊水主要来自胎儿尿液；母体与羊水的交换主要是通过胎膜；胎儿胃肠道可以吞咽较多的羊水，从而取得羊水量的平衡；妊娠晚期胎儿的尿液、呼吸系统、胃肠道、脐带、胎盘表面等，可称为羊水的来源，但肝脏不参与羊水的生成。因此 C 项说法正确。故本题选 C。

50. 【答案】B。解析：Turner 综合征又叫做先天性卵巢发育不全，临床特点为身矮、生殖器与第二性征不发育和一组躯体的发育异常，可引起原发性闭经。故本题选 B。

51. 【答案】B。解析：小儿各年龄阶段需接种的疫苗：

出生：卡介苗、乙肝疫苗；2 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、乙肝疫苗；3 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、白百破混合制剂；4 个月：脊髓灰质炎三价混合疫苗、白百破混合制剂；5 个月：百白破混合制剂；6 个月：乙肝疫苗；8 个月：麻疹活疫苗；1 岁半至 2 岁：白百破混合制剂；4 岁：脊髓灰质炎三价混合疫苗；7 岁：卡介苗、麻疹活疫苗、吸附精制白喉、破伤风二联类毒素；12 岁：卡介苗。故本题选 B。

52. 【答案】D。解析：小儿生理性腹泻镜检大便无或偶见少量白细胞。因此 D 项说法错误。故本题选 D。

53. 【答案】A。解析：正常足月新生儿，生后具有觅食反射、吸吮反射、握持反射、拥抱反射等原始反射，腹壁反射偶可出现。故本题选 A。

54. 【答案】E。解析：肢体震颤多见于帕金森综合征、小脑疾病、酒精戒断等，不出现在小儿缺铁性贫血中。故本题选 E。

55. 【答案】D。解析：新生儿期先天性甲状腺功能减退症可有暂时性低体温、低心率、极少哭、少动、喂养困难、易呕吐和呛咳、多睡、淡漠、哭声嘶哑、胎便排出延迟、顽固性便秘、生理性黄疸期延长、体重不增或增长缓慢、腹大，常有脐疝、肌张力减低等表现。其中最早引起注意的临床表现是生理性黄疸时间延长。故本题选 D。

56. 【答案】A。解析：新生儿 Apgar 评分指标肌张力、皮肤颜色、呼吸、心率和对刺激的反应。故本题选 A。

57. 【答案】A。解析：小儿先天性肥厚型幽门狭窄的呕吐物为黏液或乳汁，在胃内潴留时间较长则吐出凝乳，不含胆汁。因此 A 选项错误。故本题选 A。

58. 【答案】A。解析：妊娠满 28 周至不足 37 周娩出的胎儿为早产儿，出生体重大部分在 2500g 以下。凡因胎盘功能不足等因素而出生体重减轻到该胎龄正常体重第 10 百分位以下或较平均数低两个标准差以下者称为小于胎龄儿。故本题选 A。

59. 【答案】B。解析：癌是指起源于上皮组织的恶性肿瘤，是恶性肿瘤中最常见的一类。相对应的，起源于间叶组织的恶性肿瘤统称为肉瘤。故本题选 B。

60. 【答案】D。解析：手术时无菌操作规则为穿好手术衣后，双手半伸置于胸前，避免触碰周围的

加展鸿医考张老师微信 (15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

人或物。不可将手置于腋下、上举过肩或下垂低于腰部，因此D项错误。故本题选D。

二、判断题

61. 【答案】A。解析：高血压脑病，脑卒中是我国高血压病最常见的并发症。故本题说法正确。

62. 【答案】B。解析：消化性溃疡可有穿孔、出血、幽门梗阻和癌变等并发症，其中最常见的是出血。故本题说法错误。

63. 【答案】B。解析：手术治疗适用于绝大多数非手术治疗无效以及反复发作的粘连性肠梗阻患者。故本题说法错误。

64. 【答案】B。解析：孕激素生理功能：减低对缩宫素的敏感性；抑制输卵管收缩；促进腺泡发育，促进水钠排泄。故本题说法错误。

65. 【答案】B。解析：抑郁症的首要症状是情绪低落、兴趣下降以及乐趣丧失。故本题说法错误。

66. 【答案】A。解析：阴道毛滴虫不但寄生于缺氧的阴道内，并可侵入尿道和尿道旁腺，甚至上行至输尿管及肾盂。最适宜于毛滴虫生长的pH值是5.5~6。故本题说法正确。

67. 【答案】B。解析：被动免疫是指机体被动接受抗体、致敏淋巴细胞或其产物所获得的特异性免疫力。注射麻疹疫苗属于主动免疫。故本题说法错误。

68. 【答案】B。解析：儿童免疫系统发育不成熟的原因主要是无免疫记忆反应。故本题说法错误。

69. 【答案】A。解析：假肥大型肌营养不良症是最常见的一类进行性肌营养不良症。主要是男孩发病，女孩为致病基因的携带者。故本题说法正确。

70. 【答案】A。解析：妊娠剧吐发生于妊娠早期至妊娠16周之间，多见于年轻初孕妇。严重呕吐可引起失水及电解质紊乱，并动用体内脂肪，使其中间产物丙酮聚积，引起代谢性酸中毒。故本题说法正确。