

展鸿《临床医学》模拟卷（三）

单项选择题（本大题共 100 小题，每小题 1 分，共 100 分。请从备选答案中选择一个最佳答案，错选、多选或未选均不得分。）

1. 患者，男，36 岁。乏力，晕厥史 3 天，心电图 P 波与 QRS 波无关系，P 波频率 90 次/分，QRS 波 32 次/分，因首选哪种治疗方法（ ）。

- A. 含化硝酸甘油
- B. 立即同步电复律
- C. 静脉注射西地兰
- D. 静脉注射普萘洛尔
- E. 安装临时起搏器

2. 患者，男，51 岁，间歇性上腹痛 10 年，持续性并逐渐加重 1 年，伴食欲不振，腹胀，腹泻，为糊状便 1~3 次/日，一年下来体重下降 5kg，入院检查：血压、心肺未见异常，腹软，上腹偏左压痛，余未见明显异常，辅助检查，尿糖（-），尿淀粉酶正常，血糖 11.1mmol/L，血淀粉酶正常，大便苏丹 III 染色（+）。B 超检查：胆囊多发结石，胰腺回声不均，胰腺实质内可见 0.5cm×0.3cm 强回声光团，伴声影，肝脾未见异常。下列疾病可能性最大的是（ ）。

- A. 功能性消化不良
- B. 糖尿病
- C. 慢性胰腺病
- D. 胰腺癌
- E. 胰高血糖素瘤综合征

3. 患者，男性，70 岁，因胸骨后闷痛一小时入院，心电图示急性广泛心肌梗塞。住院当日夜间，病人反应迟钝，面色苍白，皮肤湿冷，脉搏细速，应首先考虑（ ）。

- A. 急性肺水肿
- B. 心源性休克
- C. 脑梗塞
- D. 肺部感染
- E. 心肌梗塞后综合征

4. 男，26 岁，有“糖尿病”史 5 年，自行停用胰岛素后改用“糖尿病中药”治疗一周，今出现恶心呕吐，血白细胞 $15.0 \times 10^9/L$ ，血糖 21.5mmol/L，尿酮体阳性，血 pH7.2，可能的诊断为（ ）。

- A. 糖尿病合并阑尾炎
- B. 糖尿病合并急性胃炎
- C. 糖尿病合并急性肠炎
- D. 糖尿病酮症酸中毒
- E. 糖尿病酮症

5. 患者，女，20 岁，心尖部听到一个舒张中期出现的先递减后递增型的隆隆样杂音，伴有第一心音增强，心律表现为节律不规则，第一心音强弱不一致，心率大于脉率现象。提示该患者的风湿性心脏瓣膜病是（ ）。

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 二尖瓣狭窄并关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄并心房颤动
- E. 二尖瓣关闭不全并心房颤动

6. 男，72 岁。乏力、走路不稳 3 个月。查体：肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性。

该患者最可能的病变部位是（ ）。

- A. 小脑
- B. 皮层运动区
- C. 脑干
- D. 基底神经节
- E. 脊髓

7. 男，45岁，右利手。因头痛和言语障碍6月余就诊。头颅MRI显示左侧中央前回底部前方有占位性病变，脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是（ ）。

- A. 失写
- B. 失读
- C. 感觉性失语
- D. 传导性失语
- E. 运动性失语

8. 男，25岁。头痛，全身痛，乏力伴发热3天，于8月15日来诊。发病前曾割水稻多日。查体：T 39℃，P 110次/分，神志清，球结膜充血，腹股沟淋巴结肿大，腓肠肌压痛。此患者所患疾病的病原特点是（ ）。

- A. 菌体纤细，有12~18个螺旋，镀银染色呈黑色
- B. 革兰染色阴性双球菌，裂解释放内毒素致命
- C. 革兰染色阴性杆菌，在含胆汁培养基生长更好
- D. 革兰染色阴性杆菌，有菌毛，无鞭毛及荚膜
- E. 革兰染色阴性弧菌，形态弯曲

9. 男，62岁。进食哽噎1月余，胃镜检查：距门齿30~32cm处食管后壁肿物，黏膜表面破溃，距门齿38~40cm处黏膜粗糙、隆起，两处活检均为高分化鳞癌。心、肺及肝功能正常。未见其他部位转移征象。最佳治疗方案是（ ）。

- A. 二线药物化疗
- B. 静脉营养支持
- C. 食管癌放射治疗
- D. 食管癌根治术
- E. 胃造瘘肠内营养

10. 男，62岁。咳嗽、胸闷、气促2周。高血压病史10年。查体：BP 150/90mmHg，气管左移，右胸叩诊实音，右肺呼吸音消失。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 冠心病
- B. 胸腔积液
- C. 肺炎
- D. 心力衰竭
- E. 肺血栓栓塞

11. 女，42岁。双下肢水肿1月余，进行性呼吸困难半个月。2个月前因腰椎间盘突出卧床休息。查体：BP 120/80mmHg，双肺呼吸音清，心率93次/分，P2>A2。超声心动图提示肺动脉高压。该患者呼吸困难的最可能原因是（ ）。

- A. 左心衰竭
- B. 慢性阻塞性肺疾病
- C. 肺血栓栓塞
- D. 全心衰竭
- E. 冠心病

12. 女，17岁。反复发作咳嗽、咳痰10年。近3年反复咯血，最多一次量约200ml，现胸部CT示左下叶肺萎缩，可见囊柱状支气管扩张影像，最佳治疗方案是（ ）。

- A. 吸氧、止血治疗
- B. 抗炎治疗
- C. 解痉、化痰
- D. 左肺下叶切除
- E. 体位排除

13. 女, 41 岁。1 周前受凉后干咳、胸闷, 接触冷空气后明显, 无发热, 自服“阿奇霉素”无效。既往皮肤常出现瘙痒并起风团, 服用“扑尔敏”症状可好转。查体: 双肺呼吸音清。胸部 X 线未见异常。为明确诊断首选的检查是 ()。

- A. 血 IgE
- B. 肺功能
- C. 皮肤过敏原试验
- D. 胸部 CT
- E. 痰涂片嗜酸性粒细胞计数

14. 男, 35 岁。面容变丑 10 年, 鞋子号码从 42 增加到 44。近半年明显出汗和体力欠佳, 并有明显口渴、多饮、勃起功能障碍。查体: BP 160/100mmHg。为明确诊断首选的检查是 ()。

- A. T3、T4、TSH
- B. FSH、LH
- C. 胰岛素低血糖兴奋试验
- D. 葡萄糖生长激素抑制试验
- E. OGTT 试验

15. 男, 35 岁。体检发现血压 150/120mmHg, 血钾 2.8mmol/L。腹部 CT 检查发现右肾上腺 1.0cm 的低密度占位病变, 拟手术治疗。术前准备首选的药物是 ()。

- A. 托拉塞米
- B. 呋塞米
- C. 氨苯蝶啶
- D. 螺内酯
- E. 氢氯噻嗪

16. 男, 62 岁。双下肢水肿 2 个月。年轻时曾有尿常规异常。高血压 10 年, 糖尿病 5 年, 查体: BP 175/100mmHg。双下肢中度水肿, 尿沉渣镜检 RBC 30~40/HP, 80%为变形红细胞。尿蛋白 2.3g/d, Scr 125 $\mu\text{mol/L}$, 血糖 7.2mmol/L, 抗中性粒细胞包浆抗体 (-)。眼科检查示视网膜动脉硬化, 最有可能的临床诊断是 ()。

- A. 原发性小血管炎肾损伤
- B. 肾淀粉样变性病
- C. 高血压肾损伤
- D. 慢性肾小球肾炎
- E. 糖尿病肾病

17. 女, 25 岁。6 月下旬来诊, 腹泻、呕吐伴轻度腹痛 1 天。共腹泻 6 次, 开始为黄稀便, 继之水样便。呕吐 1 次, 为胃内容物, 无发热。粪便检查动力试验 (+), 碱性蛋白胨水培养有细菌生长。最有可能的诊断是 ()。

- A. 变形杆菌肠炎
- B. 霍乱
- C. 空肠弯曲菌肠炎
- D. 沙门菌食物中毒
- E. 细菌性痢疾

18. 男, 45 岁。发热、血 ALT 升高 (ALT 42~78U/L) 1 个月。身高 170cm, 体重 90kg。各项病毒学指标及自身免疫抗体均阴性。腹部 B 超示: 肝脏回声增强, 后部衰减, 最佳的治疗措施是 ()。

- A. 应用降脂药
- B. 休息并减少体力活动
- C. 应用保肝药物
- D. 抗肝纤维化治疗
- E. 调整生活方式并减轻体重

19. 男, 64 岁。上腹部不适、隐痛 2 个月。逐渐加重, 有胀满感, 食欲下降, 曾服多种药物治疗无好转。无胃病史。查体: 略消瘦, 腹部未见阳性体征, 化验血 Hb 100g/L, 粪隐血 (+), 首先考虑的诊断是 ()。

- A. 慢性胃炎 B. 胃溃疡 C. 胃黏膜脱垂 D. 胃癌
E. 急性胃黏膜病变

20. 男, 25 岁。腹痛、脓血便、发热 2 个月, 大便 10 次/日, 体温 39℃。粪镜检及培养未见病原体。结肠镜检查示结肠弥漫分布的糜烂及浅溃疡。病理学提示重度慢性炎症。左氧氟沙星联合甲硝唑治疗 1 周症状无缓解。最适宜的治疗药物是 ()。

- A. 泼尼松 B. 柳氮磺吡啶 C. 硫唑嘌呤 D. 美沙拉嗪
E. 美沙拉嗪联合美沙拉嗪栓

21. 女, 50 岁。纳差 5 年, 面色苍白、乏力半年。胃镜检查见胃体黏膜苍白、变薄、血管透见明显。最可能的实验室检查结果是 ()。

- A. 基础胃酸分泌增加 B. 正细胞正色素性贫血
C. 血胃酸水平升高 D. 血促胃液素水平降低
E. 血维生素 B12 水平降低

22. 男, 19 岁。拔牙后出血不止 2 天。查体: 心肺及肺部未见异常。实验室检查: Hb 115g/L, WBC $5.4 \times 10^9/L$, PLT $130 \times 10^9/L$, PT 11s (正常对照 13s), APTT 65s (正常对照 38s), TT 16s (正常对照 17s)。该患者出血最可能的原因是 ()。

- A. 纤维蛋白原缺乏 B. 维生素 K 缺乏
C. 凝血因子 X 缺乏 D. 凝血酶原缺乏
E. 凝血因子 IX 缺乏

23. 男, 35 岁。因患慢性再生障碍性贫血 4 个月入院。血常规: Hb 45g/L, WBC $3.5 \times 10^9/L$, 拟输血治疗, 鉴于该患者需反复输血, 为防止输血不良反应, 应选用的最佳血液成分是 ()。

- A. 悬浮红细胞 B. 洗涤红细胞
C. 辐照红细胞 D. 去除白细胞的红细胞
E. 浓缩红细胞

24. 女, 67 岁。5 年来出现进行性乏力、纳差, 逐渐加重, 且不能耐受饥饿。既往有肺结核病史。查体: BP 90/60mmHg, 肤色黑, 掌纹处明显, 双肺呼吸音清, 心率 90 次/分, 腹软, 无明显压痛。该患者最可能的诊断是 ()。

- A. 黑棘皮病 B. Addison 病 C. 肺结核 D. 肝硬化
E. Nelson 综合征

25. 男, 38 岁。口干、多饮、多尿 3 个月。查体: 唇肥厚, 下颌前突, 咬合困难, 手脚粗大肥厚。实验室检查: 空腹血糖 7.2mmol/L, TG 3.0mmol/L。尿比重 1.020。最可能的诊断是 ()。

- A. 尿崩症 B. 糖尿病
C. 高甘油三脂血症 D. 肢端肥大症
E. 甲状腺功能减退症

26. 女, 34 岁。突发右下胸痛、少量咯血 2 天。已婚, 自然流产 2 次。查体: T 37.5℃, P 85 次/分, 右下肺叩诊呈浊音, 呼吸音减弱, 右下肢轻度肿胀。血常规: WBC $8.8 \times 10^9/L$, Hb 124g/L, Plt $64 \times 10^9/L$ 。胸部 X 线片示右侧少量胸腔积液。该患者最可能的诊断是 ()。

加展鸿医考张老师微信 (15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

- A. 肺血管炎
- B. 支气管肺癌
- C. 肺血栓栓塞症
- D. 肺炎旁胸腔积液
- E. 肺结核

27. 女, 67 岁。劳力性呼吸困难 4 年, 加重 2 天, 4 年前开始出现体力活动后呼吸困难, 休息状态下症状消失。2 天前呼吸困难加重后夜间不能平卧。高血压病史 20 年。查体: BP 160/100mmHg, 端坐呼吸, 双肺底可闻及湿啰音, 心率 102 次/分, P2 亢进, 可闻及 S3 奔马律。该患者不宜立即使用的药物是 ()。

- A. 硝普钠
- B. 硝酸甘油
- C. 吗啡
- D. 呋塞米
- E. 美托洛尔

28. 男, 59 岁。头痛、头晕 1 周。感恶心、未呕吐。既往有支气管哮喘、痛风病史。查体: BP 160/80mmHg, 心率 55 次/分, 律齐。该患者宜首选的降压药是 ()。

- A. 美托洛尔
- B. 氨氯地平
- C. 维拉帕米
- D. 卡维地洛
- E. 氢氯噻嗪

29. 男, 24 岁。因体检发现心律不齐 1 周就诊。平素无心悸和头晕。既往体健, 查体: BP 110/60mmHg, 心界不大, 心率 60 次/分, 律不齐, 可闻及早搏 2 次/分。心电图示室性期前收缩。超声心动图提示心脏结构正常。该患者最适宜的处理措施是 ()。

- A. 继续随访, 暂不予药物治疗
- B. 口服 I C 类抗心律失常药物
- C. 口服 β 受体拮抗剂
- D. 口服 III 类抗心律失常药物
- E. 口服 I B 类抗心律失常药物

30. 男, 68 岁, 间断咳嗽 5 年, 近 1 年来自觉长距离行走时感气短, 休息后可好转。否认呼吸系统疾病及心脏病史。查体未见明显异常, 血常规及胸部 X 线检查大致正常。为明确诊断应首先进行的检查是 ()。

- A. UCG
- B. 胸部 CT
- C. 肺功能
- D. 动脉血气分析
- E. D—二聚体

31. 女, 62 岁。间断咳嗽、咳少量白黏痰 10 年。查体: 双肺呼吸音粗, 未闻及干湿性啰音。血常规正常, 胸部 X 线片示肺纹理增粗紊乱, 肺功能示 FEV1 占预计值 83%, FEV1/FVC 67% (舒张后)。该患者最可能的诊断是 ()。

- A. 支气管哮喘
- B. 支气管结核
- C. 支气管扩张
- D. 慢性阻塞性肺疾病
- E. 特发性肺纤维化

32. 女, 28 岁, 咳嗽、流涕 2 周, 心悸 2 天, 无发热及胸痛, 既往体健。查体: BP 100/60mmHg, 心界不大, 心率 108 次/分, 可闻及早搏 4 次/分, 心尖部可闻及 2/6 级收缩期杂音, 柔和, 未闻及心包摩擦音。实验室检查: 血肌钙蛋白 I 升高。心电图示房性期前收缩。该患者最可能的诊断是 ()。

- A. 感染性心内膜炎
- B. 急性心包炎
- C. 扩张性心肌病
- D. 风湿性心脏瓣膜病
- E. 病毒性心肌炎

加展鸿医考张老师微信 (15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

33. 男, 59 岁。反复胸痛 3 天, 劳累时发作, 休息 15 分钟或含服硝酸甘油 1 分钟后可缓解, 每天发作 3~5 次, 既往糖尿病病史 10 年, 不适宜立即进行的检查是 ()。

- A. 心电图负荷试验
- B. 冠状动脉造影
- C. 动态心电图
- D. 静息心电图
- E. 超声心电图

34. 女, 30 岁。腹痛、腹泻伴里急后重 3 天。最初为稀便, 2 天后为黏液脓血便, 偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是 ()。

- A. 纤维索性炎
- B. 变质性炎
- C. 出血性炎
- D. 浆液性炎
- E. 化脓性炎

35. 男, 57 岁。反复咳嗽、咳痰 10 余年, 加速伴喘憋 3 余年。吸烟 10 年, 20 支/日。查体: 桶状胸, 双肺呼吸音低, 叩诊过清音, 未闻及干湿啰音。动脉血气分析: PH 7.39, PaO₂ 65mmHg, PaCO₂ 43mmHg。肺功能检查: FEV₁ 占预计值 52%, FEV₁/FVC 51%, 造成该患者通气功能障碍的主要病理生理机制是 ()。

- A. 肺内功能性分流减少
- B. 持续气流受限
- C. 肺弥散面积增大
- D. 肺脏非弹性阻力减少
- E. 肺脏无效腔减少

36. 男, 62 岁。上腹痛 10 天。既往高血压病史 10 余年, 反复心前区疼痛发作 2 个月, 口服阿司匹林 100mg/日、降压药物、他汀类降脂药等治疗。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心率齐, 腹软, 无压痛。上消化道 X 线钡剂造影: 胃角切迹壁外龛影。13C 尿素呼气试验阴性。最适宜的治疗药物是 ()。

- A. 氢氧化铝
- B. 雷尼替丁
- C. 枸橼酸铋钾
- D. 多潘立酮
- E. 奥美拉唑

37. 男, 45 岁。右上腹胀痛伴间断发热 4 个月。1 年前曾因“菌痢”住院治疗缓解。粪便中发现有叶状伪足的滋养体。腹部 B 超示右叶单发直径 10cm 囊肿。此病原体从肠道感染至肝的途径是 ()。

- A. 从腹腔经淋巴系统入肝
- B. 从结肠经门静脉入肝
- C. 从小肠经门静脉入肝
- D. 从胆道上行入肝
- E. 从胃经门静脉入肝

38. 男, 62 岁。上腹胀、隐痛 2 个月, 伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体: 消瘦, 浅表淋巴结无肿大, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱, 可见直径 3.5cm 不规则充盈缺损, 胃壁僵直。其最常见的扩散转移途径是 ()。

- A. 直接浸润
- B. 腹腔内种植
- C. 胃肠道内转移
- D. 淋巴结转移
- E. 血行转移

39. 女, 21 岁, 关节疼痛、口腔溃疡 4 个月, 双手遇冷变白、变紫 2 个月, 发热、下肢水肿 2 周。实验室检查: 血 Hb 89g/L, WBC 2.3×10⁹/L, Plt 80×10⁹/L, 尿蛋白 (++) , 尿红细胞 (++)。最可能的诊断是 ()。

- A. 再生障碍性贫血
- B. 肾结核
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 急性肾小球炎

加展鸿医考张老师微信 (15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

E. 类风湿性关节炎

40. 女，21岁。腹痛、呕吐3小时。进食生冷食物后出现上腹痛伴恶心、剧烈呕吐，呕吐物初为胃内容物，后为少量鲜血。引起呕血最可能的原因是（ ）。

- A. 急性糜烂出血性胃炎
- B. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- C. 应激性溃疡
- D. 十二指肠合并出血
- E. 反流性食管炎合并出血

41. 男，55岁。间断少尿、腹胀1年，腹痛、低烧1周。既往肝炎肝硬化病史15年。查体：T 37.5℃，P 84次/分，R 18次/分，BP 90/60mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心律齐，腹膨隆，全腹轻压痛，无反跳痛，移动性浊音阳性。腹水常规：比重1.017，蛋白28g/L，细胞总数 $920 \times 10^9/L$ ，白细胞数 $800 \times 10^9/L$ ，多形核细胞0.80。最可能的诊断是（ ）。

- A. 肝肾综合征
- B. 自发性腹膜炎
- C. 原发性肝癌
- D. 门静脉血栓形成
- E. 结核性腹膜炎

42. 男，32岁。发热、乏力、纳差、腹胀2个月。体温最高T 37.9℃。查体：T 37.5℃，P 80次/分，R 18次/分，BP 120/80mmHg，双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，律齐，腹壁柔韧感，移动性浊音阳性。实验室检查：血沉60mm/h，腹水比重1.025，蛋白35g/L，白细胞 $850 \times 10^9/L$ ，单核0.80，多核0.20，首先考虑的诊断是（ ）。

- A. 结核性腹膜炎
- B. Budd-Chiari综合征
- C. 肝硬化合并原发性腹膜炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 腹膜转移癌

43. 男，21岁。患急性白血病半个月，化疗期间出现皮肤瘀斑。血常规：Hb 70g/L，RBC $2.4 \times 10^{12}/L$ ，WBC $2.6 \times 10^9/L$ ，Plt $10 \times 10^9/L$ ，给予输注机采血小板1个治疗量。输注完毕后，患者出现严重吸气性呼吸困难伴喘鸣。查体：T 36.8℃，P 115次/分，R 25次，BP 85/50mmHg。该患者最可能发生的输血不良反应是（ ）。

- A. 严重过敏反应
- B. 急性溶血性输血反应
- C. 输血低血压
- D. 输血相关移植物抗宿主病
- E. 输血相关循环超负荷

44. 患者，男，30岁，高处坠落致颅脑损伤，呈深昏迷状态，对该患者体格检查的描述，正确的是（ ）。

- A. 角膜反射减弱
- B. 瞳孔对光反射消失
- C. 吞咽反应存在
- D. 对疼痛刺激出现痛苦表情

45. 患者，男，19岁，运动时突然出现右上腹伴腰背部疼痛，剧烈难忍，并向下腹部放射，伴恶心、呕吐，呕吐物为胃内容物。查体：右侧腹壁紧张，压痛，并向腹股沟区放射，右肾区叩痛明显。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性胆囊炎
- B. 急性阑尾炎
- C. 输尿管结石
- D. 急性胃炎

46. 男性，65岁，进行性吞咽困难2个月，现仅能进流质食物。查体：消瘦，锁骨上未触及肿大淋

加展鸿医考张老教师微信（15336535813），回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

巴结，食管 X 线钡餐透视显示：食管中段黏膜破坏，充盈缺损，管腔狭窄。如病人出现声音嘶哑，提示肿瘤已侵犯（ ）。

- A. 声带 B. 气管隆突 C. 迷走神经 D. 喉返神经
E. 喉上神经

47. 女，50 岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查：可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞称为（ ）。

- A. 镜影细胞 B. L&H 型细胞 C. 陷窝细胞 D. Paget 细胞
E. 多核瘤巨细胞

48. 男，35 岁。搬重物时突然出现腰背部疼痛伴右下肢放射痛 2 小时。查体：下腰部压痛，右下肢直腿抬高试验(+)，右侧足背外侧感觉减弱，右足趾跖屈肌力减弱，右侧跟腱反射减弱，Babinski 征(-)。该患者疾病可能受累的节段是（ ）。

- A. L1~L5 B. L5~S1 C. L2~L3 D. L1~L3
E. L3~L5

49. 男，62 岁。进行性排尿困难 1 年。直肠指检前列腺稍增大，左侧叶有 1 枚黄豆大小硬结。PSA 15ng/ml。MRI 见前列腺增大，边界清，左侧外周带有低信号病灶，精囊形态正常。前列腺穿刺诊断为前列腺癌，Gleason 分级评分 3+4=7。其余检查未见异常。首选的治疗方法是（ ）。

- A. 根治性前列腺切除术 B. 全身化疗
C. 经尿道前列腺切除术 D. 前列腺冷冻治疗
E. 内分泌治疗

50. 男，50 岁。散步时突然倒地。查体：意识丧失，大动脉搏动消失，抽泣样呼吸，随即消失。应首先采取的措施是（ ）。

- A. 舌下含服硝酸甘油 B. 开放气道
C. 人工呼吸 D. 按压人中
E. 胸外按压

51. 男，35 岁。右上臂外伤 6 小时。查体：压痛、畸形，伴异常活动，垂腕。最可能的诊断是（ ）。

- A. 肱骨外科颈骨折合并腋神经损伤 B. 肱骨外科颈骨折合并肌皮神经损伤
C. 肱骨干骨折合并桡神经损伤 D. 肱骨干骨折合并尺神经损伤
E. 肱骨干骨折合并正中神经损伤

52. 男，76 岁。无排便 7 天，腹痛、呕吐 2 天。平素便秘。查体：肠鸣音亢进，最有可能的诊断是（ ）。

- A. 急性胃炎 B. 急性腹膜炎 C. 急性阑尾炎 D. 急性胰腺炎
E. 急性肠梗阻

53. 女，30 岁。平素体健，甲状腺腺瘤切除术后换药，切口无红肿，手术切口拆线时间段应是术后（ ）。

- A. 6~7 天 B. 2~3 天 C. 10~12 天 D. 7~9 天
E. 4~5 天

54. 男, 45 岁。左下肢疼痛发凉半年。既往有左下肢血栓性浅静脉炎病史, 无高血压、糖尿病病史, 吸烟 20 年, 20 支/天。查体: 右下肢正常, 左足苍白, 皮温明显降低, 左足背动脉搏动消失, 左股、腘动脉可触及搏动, Buerger 试验阳性。最有可能的诊断是左下肢 ()。

- A. 急性动脉栓塞
- B. 血栓闭塞性脉管炎
- C. 原发性下肢静脉曲张
- D. 动脉硬化性闭塞症
- E. 深静脉血栓形成

55. 男, 45 岁。左腿车轮碾压伤 2 小时。查体: T 37.2℃, P 145 次/分, R 28 次/分, BP 89/55mmHg。神情淡漠, 面色苍白, 口唇干燥, 两肺呼吸音清。腹软, 无压痛, 左小腿中部开放性外伤, 伤口近端在院外已用止血带缚扎 30 分钟, 伤口无明显渗血。足背动脉搏动弱, 此时该患者处理措施中错误的是 ()。

- A. 补充血容量
- B. 放开止血带, 以免远端肢体缺血
- C. 做好术前准备, 急诊手术
- D. 备血
- E. 中心静脉置管

56. 男, 45 岁。胃镜检查提示十二指肠球部溃疡, 经药物治疗 3 个月仍反复发作。行胃大部切除毕 II 式吻合术, 术后并发症属于远期并发症的是 ()。

- A. 输入袢梗阻
- B. 早期倾倒综合征
- C. 输出袢梗阻
- D. 胃排空障碍
- E. 十二指肠残端破裂

57. 男, 64 岁。上腹疼痛 5 小时。胆囊多发结石病史 5 年。查体: T 38.3℃, P 100 次/分, BP 85/60mmHg, 皮肤、巩膜黄染, 右上腹肌紧张, 压痛 (+), 为明确诊断, 首选的检查是 ()。

- A. 经内镜逆行胰胆管造影
- B. 腹部 B 超
- C. 腹部 CT
- D. 胆道镜检查
- E. 经皮肝穿刺胆管造影

58. 男, 59 岁, 外伤致右腹部疼痛、肿胀 1 小时。既往体健, 无糖尿病史。查体: T 36.8℃, P 70 次/分, R 18 次/分, BP 110/60mmHg, 心肺腹未见异常, 右腕部疼痛、肿胀、活动受限。X 线片检查: 桡骨下端骨皮质不连续, 对位线良好, 并有嵌插。最恰当的治疗措施是 ()。

- A. 皮牵引
- B. 手法复位外固定
- C. 骨牵引
- D. 切开复位内固定
- E. 重要活血化瘀

59. 女, 62 岁。尿频、尿急、尿痛 1 天, 尿中可见血丝, 伴排尿时下腹痛, 无发热。不宜采用的检查方法是 ()。

- A. 尿细菌培养+药物敏感试验
- B. 尿常规检查
- C. 尿菌落计数
- D. 静脉尿路造影
- E. 膀胱镜检查

60. 女, 21 岁。右大腿下端肿痛 2 个月。查体: T 36.9℃, P 18 次/分, BP 110/60mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无压痛, 未触及包块。右大腿下端肿胀、压痛。X 线检查示股骨下端有界限不清的骨质破坏区, 骨膜增生及放射状阴影。最可能的诊断是 ()。

加展鸿医考张老师微信 (15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

- A. 骨转移瘤 B. 骨肉瘤 C. 骨巨细胞瘤 D. 骨结核
E. 骨髓瘤

61. 女, 28 岁, 进行性肾痛半年, 下肢乏力, 食欲减退, 查体: T 37.8°C, P 90 次/分, R 18 次/分, BP 110/60mmHg, 未见皮疹, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 腹软, 无肌紧张, 移动性浊音阴性, 胸椎后凸, 有叩痛, X 线片示: 第 6、7 胸椎间隙变窄, 椎旁软组织阴影增宽, 实验室检查: 血常规: Hb 118g/L, WBC $7.0 \times 10^9/L$, L 0.40, Plt $122 \times 10^9/L$, ESR 60mm/h。最可能的诊断是 ()。

- A. 腰椎间盘突出 B. 化脓性脊椎炎
C. 胸椎结核 D. 胸椎血管瘤
E. 胸椎转移癌

62. 男, 45 岁。右足底外伤 5 小时, 伤口深, 及时彻底清创后, TAT (破伤风抗毒素) 皮试阳性。首先考虑给予注射 ()。

- A. 人体破伤风免疫球蛋白 B. 破伤风抗毒素 (脱敏注射)
C. 青霉素 D. 破伤风类毒素
E. 百喉、百日咳、破伤风三联疫苗

63. 男, 45 岁。餐后突发右上腹阵发性绞痛伴恶心 2 天, 尿色呈浓茶样, 既往有类似发作。查体: 急性病容, 巩膜黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 右上腹深压痛, 无肌紧张。最可能的诊断是 ()。

- A. 急性胰腺炎 B. 胆道蛔虫病 C. 急性胆囊炎 D. 胆总管结石
E. 胆总管囊肿

64. 女, 55 岁, 寒战, 发热, 右上腹痛 15 天, 体温每日高达 39.8°C 左右, CT 提示肝内两个脓肿, 最大直径达 6cm, 其治疗方法应首选 ()。

- A. 全身大剂量应用抗生素 B. 右半肝切除术
C. 经皮穿刺置管引流术 D. 脓腔内注入抗生素
E. 支持治疗

65. 男, 45 岁。不明原因发热半个月。查体: T 38°C, 两侧颈部、腋窝和腹股沟区均可触及淋巴结肿大, 最大者 3cm×2cm, 均质韧。活动无压痛, 肝肋下 2cm, 脾肋下 4cm。颈部淋巴结活检诊断为非霍奇金淋巴瘤。要确定该患者的临床分期, 所需的辅助检查不包括 ()。

- A. 腹部 B 超 B. 骨髓细胞学检查
C. 浅表淋巴结 B 超 D. 盆腔 CT
E. 胸部 CT

66. 女, 28 岁。阴道分泌物增多 5 天, 有不洁性交史。检查: 右侧大阴唇可见 1.0cm×1.0cm、硬韧、无痛隆起物。本例最可能的诊断是 ()。

- A. 巨细胞病毒感染 B. 淋病
C. 生殖器疱疹 D. 尖锐湿疣
E. 梅毒

67. 男, 55 岁。右上腹疼痛 3 个月, 呈持续性钝痛, 向右肩部放射, 伴乏力, 发病以来体重减轻 6kg。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 巩膜无黄染, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 肝肋下 3cm, 质地稍硬, 有结节感。实验室检查: AFP 800 μg/L, CEA 正常。腹部 B 超: 肝右叶 8cm×6cm 占位性病变, 向外生长, 周边血流量增强, 门静脉正常。最理想的治疗方法是()。

- A. 肿瘤切除加放疗
- B. 姑息性肝切除术
- C. 根治性肝切除术
- D. 局部射频治疗
- E. 经肝动脉化疗栓塞

68. 女, 55 岁。上腹胀痛 8 个月, 突发剧痛 2 小时。查体: T 36.5℃, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80mmHg, 消瘦、贫血貌, 左锁骨上淋巴结肿大 1.8cm×1.5cm, 质硬, 无压痛。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 全腹肌紧张, 上腹明显压痛、反跳痛。立位腹部 X 线平片可见膈下游离气体。下一步治疗最合理的术式为()。

- A. 姑息性胃大部切除术
- B. 胃造瘘
- C. 胃癌根治术
- D. 穿孔修补术
- E. 胃空肠吻合术

69. 男, 62 岁。全麻下腹膜后肿瘤切除术后 3 日, 晨起剧烈咳嗽后觉腹部切口剧痛。查体: 生命体征平稳, 切口敷料湿透。检查切口更换敷料发现小肠自伤口膨出。在病房中的紧急处理措施正确的是()。

- A. 局麻下全层缝合伤口
- B. 立即还纳小肠
- C. 无菌盐水清洗后还纳小肠
- D. 局麻下分层缝合伤口
- E. 无菌敷料覆盖小肠及伤口

70. 男, 55 岁。上腹胀痛伴恶心 3 天, 右下腹痛阵发加剧、腹胀半天, 既往体健。查体: T 38.3℃, P 120 次/分, BP 150/90mmHg。全腹压痛(+), 右下腹明显, 有肌紧张。肝浊音界存在, 未闻及肠鸣音。实验室检查: 血 WBC $13.0 \times 10^9/L$, N 0.88, 右下腹穿刺抽出黄色混浊液体 2ml, 镜检脓细胞(++)。最可能的诊断是()。

- A. 阑尾炎穿孔并弥漫性腹膜炎
- B. 伤寒肠穿孔并弥漫性腹膜炎
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 消化性溃疡穿孔并弥漫性腹膜炎
- E. 重症急性胰腺炎

71. 女, 28 岁, 妊娠 28 周。2 小时糖耐量试验血糖水平依次为 50、95、100 及 85mg/dl, 1 周后早餐后 2 小时血糖为 87mg/dl, 患者系初次妊娠, 既往无糖尿病史。诊断为()。

- A. 糖耐量正常
- B. 妊娠期糖耐量减低
- C. 妊娠期糖尿病
- D. 糖尿病合并妊娠

72. 女, 25 岁。妊娠 26 周。颈部增粗伴憋气 1 个月。查体: P 110 次/分, BP 110 /70mmHg。甲状腺 III 度肿大, 气管左偏。实验室检查: T3、T4 高于正常。首选的治疗方法是()。

- A. 口服甲状腺素片
- B. 同位素 ^{131}I 治疗

加展鸿医考张老师微信 (15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

- C. 外放射治疗
- D. 口服丙硫氧嘧啶
- E. 手术治疗

73. 女, 45 岁, 同房后阴道出血 3 个月, G5P1。妇科检查: 宫颈中度糜烂状, 下唇息肉状赘生物, 直径 2cm, 三合诊宫颈旁组织无异常。取宫颈赘生物送病理, 提示宫颈鳞癌, 首选的治疗方案是()。

- A. 筋膜外子宫切除术
- B. 宫颈锥形切除术
- C. 子宫颈切除+盆腔淋巴结切除术
- D. 广泛性子宫切除+盆腔淋巴结切除术
- E. 根治性放疗

74. 女, 30 岁, 妊娠 34 周。血压升高伴头痛 1 周, 抽搐, 昏迷 3 小时, 查体: BP 160/110mmHg, 尿蛋白(++), 该患者最可能的诊断是()。

- A. 子痫
- B. 脑出血
- C. 瘧症
- D. 脑血栓形成
- E. 癫痫

75. 女, 30 岁, 初产妇, 妊娠 41 周, 规律宫缩 10 小时, 已破膜, 产科检查: LOT, 羊水黄绿色, 胎心率 100 次/分, 宫口 9cm, 胎头 S=0, 该患者正确的处理措施是()。

- A. 旋转胎头后自然娩出
- B. 尽快剖腹产
- C. 催产素促进产程
- D. 尽快胎头吸引
- E. 尽快产钳助娩

76. 女, 30 岁, 初孕妇, 未临产, 妊娠 35 周, 恶心、呕吐、乏力伴皮肤黄染、瘙痒 1 周, 结合化验检查诊断为妊娠合并乙型病毒性肝炎(重型), 除保肝治疗外, 应采取的措施是()。

- A. 尽快利凡诺尔腔内引产
- B. 尽快使用子宫动脉栓塞术
- C. 尽快行剖宫产术
- D. 尽快用催产素促进宫颈成熟
- E. 继续妊娠至 37 周

77. 初产妇, 23 岁, 妊娠 40 周, 临产 8 小时后出现烦躁不安, 呼吸加快, 下腹疼痛, 拒按, 胎心听不清, 查体见下腹部近肚下方一环形凹陷, 导为血尿。该患者最可能的诊断是()。

- A. 急性阑尾炎
- B. 重型胎盘早剥
- C. 先兆子宫破裂
- D. 子宫破裂
- E. 羊水栓塞

78. 女, 23 岁。停经两个月, 腹痛伴大量阴道流血一天。心率 100 次/分。妇科检查见宫口有组织物排出, 子宫如两个月妊娠大小。该患者的处理措施不包括()。

- A. 肌注黄体酮
- B. 给予输液及止血药物
- C. 查血常规
- D. 查血 β -hCG
- E. 立即行清宫术

79. 女, 23 岁。妊娠 28 周, 尿糖阳性, OGTT 空腹血糖正常, 餐后 1 小时血糖升高。应该首先给予的治疗是()。

- A. 加强营养
- B. 控制饮食

加展鸿医考张老师微信(15336535813), 回复岗位, 免费领取更多考编笔试面试资料

- C. 胰岛素治疗
D. 口服降糖药物
E. 观察

80. 患儿，4岁，平素健康，随父母到云南旅游被蚊虫叮咬，2周后突发高热，寒战明显，继之大汗后热退，精神如常，无其他不适，未进行特殊处理，此后隔日同一时间出现同样症状来院就诊，查体无其他阳性体征，该患儿最可能的诊断是（ ）。

- A. 败血症
B. 疟疾
C. 黑热病
D. 上呼吸道症状

81. 女孩，1岁，未接种过卡介苗，其父患活动性肺结核，时有咳血，目前小儿与父母生活在一起，但无任何症状，小儿胸部X线片未见异常，PPD试验(+)，除隔离父亲外，宜对小儿采取的措施是（ ）。

- A. 继续观察，暂不做任何处理
B. 立即接种卡介苗
C. 口服利福平，疗程1年
D. 口服异烟肼，疗程6~9个月
E. 口服利福平+异烟肼，疗程1年

82. 男孩，10岁，体重超过同性别、同身高体重均值的30%，不正确的处理是（ ）。

- A. 控制饮食
B. 药物治疗
C. 监测体重
D. 心理辅导
E. 增加运动

83. 男婴10个月，经常出现夜惊，近1周加重，多汗烦闷，该患儿生后一直母乳不足，混合喂养，未添加辅食，此患儿体格检查最可能发现的阳性体征为（ ）。

- A. 面色苍白
B. 方颅，乳牙未萌出
C. 肌张力增高
D. 皮下脂肪明显减少
E. 皮肤弹性差

84. 女孩，1岁，智力低下伴经常便秘来诊。查体：身高65cm，头发干燥，面黄，塌鼻梁折，舌体厚大，腹胀，脐部膨出。最可能的诊断是（ ）。

- A. 先天性甲状腺功能衰退
B. 黏多糖病
C. 先天性巨结肠
D. 21-三体综合征
E. 苯丙酮尿症

85. 男孩，3岁。眼睑及面部水肿2周。查体：全身高度水肿，凹陷性。实验室检查：血白蛋白25g/L。总胆固醇6.2mmol/L，尿常规蛋白(++++)，WBC 1~2HP。为有利于该疾病的临床分型，首选的检查是（ ）。

- A. 血沉
B. 补体C3
C. ASO
D. 血电解质
E. 免疫球蛋白

86. 男婴，3个月。高热伴频繁呕吐2天，嗜睡1天，惊厥2次。查体：精神差，双眼凝视，前囟隆起，脑膜刺激征阴性。实验室检查：血WBC $15.0 \times 10^9/L$ ，N 0.88，L 0.12。最可能的诊断是（ ）。

- A. 结核性脑膜炎
B. 化脓性脑膜炎
C. 热性惊厥
D. 病毒性脑炎
E. 中毒性脑病

87. 男婴，三天。出生后不吃、不哭、不动，少尿，体温不升。胎龄32周早产。查体：T 34.0℃，呼吸不规则，反应低下，皮肤黄染，肺部呼吸音低，心音低钝，腹胀，面颊、臀部、双下肢皮肤硬肿，

加展鸿医考张老教师微信(15336535813)，回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

压之凹陷，手足凉。最可能的诊断是（ ）。

- A. 新生儿黄疸
- B. 新生儿肺炎
- C. 新生儿心肌炎
- D. 新生儿水肿
- E. 新生儿寒冷损伤综合症

88. 男婴，10个月。4天前无明显诱因出现发热，体温持续在38~39.6℃，应用退热药后可短暂下降，1天前体温恢复正常，皮肤出现皮疹。查体：T 36.5℃，颜面、颈部及躯干可见小红色斑丘疹，咽红。其最可能的诊断是（ ）。

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红热

89. 男孩，4岁。咳嗽3个月，痰不多，常于夜间咳醒，活动后加重，无发热，使用抗生素无明显好转。既往有湿疹史。查体：T 36.5℃，P 100次/分，R 20次/分，双肺呼吸音粗，未闻及干湿性啰音，腹软，无压痛。最可能的诊断是（ ）。

- A. 喘息性支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 咳嗽变异型哮喘
- D. 支气管异物
- E. 支气管炎

90. 患儿，2岁，因“呕吐、腹泻六天”代主诉入院，家长诉近两日尿量偏少。查体：体温正常，呼吸40次/分，心率130次/分，体重11kg，神志清，精神反应可，测血压偏低，皮肤弹性稍差，粘膜较干燥，哭时少泪，腹部及神经系统查体正常。查电解质，血钾3.7mmol/l，血钠127mmol/l，该患儿最可能的诊断是（ ）。

- A. 急性腹泻病伴轻度低渗性脱水
- B. 急性腹泻病伴中度低渗性脱水
- C. 急性腹泻病伴中度等渗性脱水
- D. 急性腹泻病伴重度低等性脱水

91. 患者，男性，18岁，高考落榜后性情大变，平素非常理智的他变得固执、蛮不讲理，经常和父母大动干戈，爱钻牛角尖。患者出现的上述心理反应是（ ）。

- A. 焦虑
- B. 偏执
- C. 抑郁
- D. 恐惧

92. 患者感到普通人说话声“震耳欲聋”，轻微的皮肤接触“疼痛难忍”，这属于（ ）的症状。

- A. 感觉减退
- B. 感觉过敏
- C. 错觉
- D. 幻觉

93. 女，26岁。近1个月出现失眠、难以入睡、食欲较差。体重减轻2kg，自觉无用、孤独，没有人关心自己，对未来也不抱任何希望。偶尔出现生不如死的想法。目前此患者存在的突出症状是（ ）。

- A. “三自”症状
- B. 睡眠障碍
- C. “三无”症状
- D. 思维迟缓
- E. 消极观念

94. 女，26岁。大学文化，3天前听到自己丈夫在空难中死亡的噩耗后，突然表现动作减少，目光呆滞，表情漠然。言语迟缓，对问话的回答只字片语，该患者的精神症状属于（ ）。

- A. 亚木僵状态
- B. 谵妄状态
- C. 抑郁状态
- D. 偏执状态
- E. 痴呆状态

95. 男，45岁。因焦虑症接受心理治疗，在治疗过程中患者多次约治疗师看电影，并多次打电话叮

加展鸿医考张老师微信（15336535813），回复岗位，免费领取更多考编笔试面试资料

嘱治疗师“可能下雨要带雨伞”或者“气温下降要添加衣服”等。患者的这种表现是（ ）。

- A. 象征
- B. 移情
- C. 认同
- D. 阻抗
- E. 投射

96. 男，28岁。1个月来3次无明显诱因突发心悸、胸闷、窒息感，浑身冷汗，感觉自己快不行了，极度紧张害怕，持续10余分钟，每次去医院急诊，除心电图是窦性心动过速外，余无异常，事后总担心下次再发作。该患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 恐惧性障碍
- C. 分离转换性障碍
- D. 惊恐障碍
- E. 心脏病所致焦虑障碍

97. 男，35岁，诊断为酒精所致精神障碍。入院后感到身体表面有许多虫子在皮肤上爬行，骚痒难忍，焦躁不安，此症状最可能是（ ）。

- A. 幻触
- B. 本体幻觉
- C. 感觉过敏
- D. 感觉倒错
- E. 错觉

98. 女，68岁。进行性记忆力下降5年。近半年多次因忘记关天然气而引起厨房失火，想不起常用日用品的名称。整日在家找东西，将家里弄得乱七八糟，并怀疑儿媳偷东西。既往体健，家族无类似疾病者，查体无阳性体征。辅助检查：头部CT示脑萎缩。Hachinski缺血指数数量表(HIS)评分3分。患者最可能的诊断是（ ）。

- A. 阿尔茨海默病
- B. 假性痴呆
- C. 妄想性障碍
- D. 血管性痴呆
- E. 精神分裂症

99. 男，25岁，活动时突感右胸部撕裂样痛。查体：大汗淋漓惊恐状，气促，气管左偏，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失。该患者最可能的诊断为（ ）。

- A. 胸腔积液
- B. 大叶性肺炎
- C. 干性胸膜炎
- D. 右侧张力性气胸
- E. 肺气肿

100. 女性，35岁，婚后5年未孕，2年来经血量增多，伴经期腹痛加重；妇科检查：后穹窿可及黄豆大小数个触痛性结节，子宫后位，略大，质中等，活动差，子宫右侧可及5cm×6cm×4cm包块，质韧，不活动，压痛。此病人最可能的诊断是（ ）。

- A. 子宫浆膜下肌瘤
- B. 子宫腺肌瘤
- C. 子宫内膜异位症，伴右卵巢巧克力囊肿
- D. 右侧卵巢畸胎瘤
- E. 结核性盆腔包块

展鸿《临床医学》模拟卷（三）

参考答案及解析

1. 【答案】E。解析：患者心电图 P 波与 QRS 波无关系，P 波频率 90 次/分，QRS 波 32 次/分，为三度房室传导阻滞的心电图表现，应首选安装临时起搏器。故本题选 E。
2. 【答案】C。解析：患者间歇性上腹痛 10 年，为慢性腹部疾病，尿糖阴性，可排除糖尿病，B 超检查胆囊多发结石，胰腺回声不均，胰腺实质内可见 0.5cm×0.3cm 强回声光团，伴声影，肝脾未见异常，可考虑为慢性胰腺炎。故本题选 C。
3. 【答案】B。解析：心源性休克可见于急性广泛心肌梗塞，患者反应迟钝，面色苍白，皮肤湿冷，脉搏细速是心源性休克中期的临床表现。故本题选 B。
4. 【答案】D。解析：患者出现呕吐症状，血白细胞增高，血糖升高，尿酮体阳性，可判断为糖尿病酮症酸中毒。故本题选 D。
5. 【答案】D。解析：舒张中期出现的先递减后递增型的隆隆样杂音是二尖瓣狭窄的典型体征；第一心音增强，心律表现为节律不规则，第一心音强弱不一致，心率大于脉率现象是心房颤动的典型表现。故本题选 D。
6. 【答案】A。解析：小脑对大脑皮层和脊髓活动进行调节，可协调机体随意运动，使运动能够准确、平稳和顺利地进行。患者走路不稳，肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性，最可能的病变部位是小脑。故本题选 A。
7. 【答案】E。解析：中央前回底部前方是 Broca 三角区，此区损伤易导致运动型失语症。故本题选 E。
8. 【答案】A。解析：根据患者的临床表现，考虑为钩端螺旋体病，其致病菌为钩体，呈细长丝状，圆柱形，螺旋盘绕细致，有 12~18 个螺旋，规则而紧密，状如未拉开弹簧表带样，镀银染色呈黑色。故本题选 A。
9. 【答案】D。解析：根据患者临床表现及未见其他部位转移征象，考虑为早期食管癌，早期食管癌的最佳治疗方案是根治手术。故本题选 D。
10. 【答案】B。解析：患者表现为咳嗽、胸闷、气促，查体气管左移，右胸叩诊实音，考虑为胸腔积液。胸腔积液的典型临床表现为胸闷、咳嗽、气促，气管移向健侧，患侧局部叩诊浊音，呼吸的声音减低。故本题选 B。
11. 【答案】C。解析：患者进行性呼吸困难，P₂>A₂，超声心动图提示肺动脉高压，应考虑为肺血拴栓塞。故本题选 C。
12. 【答案】D。解析：患者反复发作咳嗽、咳痰 10 年，近 3 年反复咯血，胸部 CT 示左下叶肺萎缩，可见囊柱状支气管扩张影像，考虑为肺癌，最有效的治疗方法是行左肺下叶切除术。故本题选 D。
13. 【答案】B。解析：患者 1 周前受凉后干咳、胸闷，接触冷空气后明显，既往皮肤常出现瘙痒并起风团，服用“扑尔敏”症状可好转，考虑为支气管哮喘，为明确诊断应检查肺功能。故本题选 B。
14. 【答案】D。解析：患者鞋号增大，面容变丑，近半年明显出汗和体力欠佳，有明显口渴、多饮、勃起功能障碍，是肢端肥大症的典型表现，与生长激素分泌过多有关，应做葡萄糖生长激素抑制试验以明确诊断。故本题选 D。
15. 【答案】D。解析：患者高血压合并低血压，腹部 CT 检查发现右肾上腺 1.0cm 的低密度占位病变，诊断为原发性醛固酮增多症，术前应准备的药物是螺内酯，可保钾利尿降低血压。故本题选 D。

16. 【答案】E。解析：患者糖尿病 5 年，尿沉渣镜检 RBC 30~40/HP，80%为变形红细胞，提示肾小球病变，最可能的诊断为糖尿病肾病。故本题选 E。

17. 【答案】B。解析：患者腹泻、呕吐伴轻度腹痛、腹泻，开始为黄稀便，继之水样便，粪便检查动力试验阳性，碱性蛋白胨水培养有细菌生长，提示为霍乱。故本题选 B。

18. 【答案】E。解析：患者身高 170cm，体重 90kg，可推断体型为肥胖，血 ALT 升高 1 个月，肝脏回声增强，后部衰减，考虑为脂肪性肝病所致的肝损害，为减轻肝损伤，最佳的治疗措施是调整生活方式并减轻体重。故本题选 E。

19. 【答案】D。解析：早期胃癌多数病人无明显症状，少数人有恶心、呕吐或是类似溃疡病的上消化道症状。疼痛与体重减轻是进展期胃癌最常见的临床症状。该患者上腹部不适、隐痛 2 个月，逐渐加重，有胀满感，食欲下降，略消瘦，应首先考虑为胃癌。故本题选 D。

20. 【答案】A。解析：根据患者的临床表现和实验室检查可考虑为溃疡性结肠炎急性加重期，应选用泼尼松进行治疗，轻中度溃疡性结肠炎可选用柳氮磺吡啶、美沙拉嗪等治疗。故本题选 A。

21. 【答案】E。解析：患者面色苍白、乏力半年，胃体黏膜苍白、变薄、血管透见明显，是维生素 B12 降低的表现。故本题选 E。

22. 【答案】D。解析：患者 PT、TT 接近正常值，APTT 明显延长，应考虑为凝血酶原缺乏所致的出血。故本题选 D。

23. 【答案】D。解析：患者为慢性再生障碍性贫血，需要反复输血，易产生抗白细胞抗体，从而引起输血不良反应。为防止输血不良反应的发生，应选用去除白细胞的红细胞。故本题选 D。

24. 【答案】B。解析：肤色黑是肾上腺皮质功能减退症的主要表现，肾上腺皮质功能减退又称 Addison 病。故本题选 B。

25. 【答案】D。解析：患者唇肥厚，下颌前突，咬合困难，手脚粗大肥厚，为肢端肥大症的典型表现，是由生长激素过多导致血糖代谢紊乱出现的内分泌与代谢性疾病。糖尿病不会表现为下颌前突，咬合困难，手脚粗大肥厚。故本题选 D。

26. 【答案】C。解析：患者突发右下胸痛、咯血，右下肺叩诊呈浊音，呼吸音减弱，右下肢轻度肿胀，胸部 X 线片示右侧少量胸腔积液，考虑为血栓脱落引起的肺血栓，进而导致肺梗死所致。故本题选 C。

27. 【答案】E。解析：根据患者临床表现，首先考虑为高血压伴急性左心衰，不宜使用 β 受体阻滞剂，否则会加重病情。故本题选 E。

28. 【答案】B。解析：支气管哮喘禁用美托洛尔；痛风禁用氢氯噻嗪；患者心率较慢，禁用维拉帕米、卡维地洛。故本题选 B。

29. 【答案】A。解析：患者经检查无器质性心脏病，可认为其室性期前收缩是良性的，无需治疗，继续随访即可。故本题选 A。

30. 【答案】A。解析：患者长距离行走时感气短，休息后可好转，考虑为心力衰竭，明确心力衰竭应首选超声心动图检查。故本题选 A。

31. 【答案】D。解析：患者肺功能示 FEV1 占预计值百分比 $\geq 80\%$ ，FEV1/FVC $< 70\%$ ，提示不可逆的受阻，为轻度慢性阻塞性肺疾病，此检查是慢性阻塞性肺疾病最有价值的检查。故本题选 D。

32. 【答案】E。解析：患者咳嗽、流涕、心悸，心尖部可闻及收缩期杂音，血肌钙蛋白 I 升高，心电图示房性期前收缩，最可能的诊断是病毒性心肌炎。故本题选 E。

33. 【答案】A。解析：患者心绞痛每天发作 3~5 次，发作较频繁，心电图负荷试验会加重发作，诱发心梗，不适宜作此检查。故本题选 A。

34. 【答案】A。解析：患者腹痛、腹泻伴里急后重 3 天，最初为稀便，2 天后为黏液脓血便，偶见片状灰白色膜状物排出，该片状灰白色膜状物为纤维素、白细胞和坏死的黏膜上皮混合在一起形成的假膜，最可能为纤维索性炎病变。故本题选 A。

35. 【答案】B。解析：患者反复咳嗽、咳痰 10 余年，加速伴憋喘 3 余年，吸烟 10 年，桶状胸，双肺呼吸音低，叩诊过清音，FEV1 占预计值 52%，FEV1/FVC 51%，为中度慢性阻塞性肺气肿，造成该患者通气功能障碍的主要病理生理机制是持续气流受限。故本题选 B。

36. 【答案】E。解析：患者上腹痛 10 天，上消化道 X 线钡剂造影显示胃角切迹壁外龛影，考虑为胃溃疡，应首选质子泵抑制剂奥美拉唑治疗。故本题选 E。

37. 【答案】B。解析：患者右上腹胀痛伴间断发热 4 个月，粪便中发现有叶状伪足的滋养体，腹部 B 超示右叶单发直径囊肿，考虑为阿米巴肝脓肿。阿米巴肝脓肿病原体是从结肠经门静脉进入肝导致肝脓肿。故本题选 B。

38. 【答案】D。解析：患者上腹胀、隐痛 2 个月，伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑，上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱，可见不规则充盈缺损，胃壁僵直，考虑为胃癌。胃癌最常见的扩散转移途径是淋巴结转移。故本题选 D。

39. 【答案】C。解析：患者关节疼痛、口腔溃疡 4 个月，双手遇冷变白、变紫，白细胞计数减少，血小板减少，尿内出现红细胞和蛋白尿，首先考虑为系统性红斑狼疮。故本题选 C。

40. 【答案】B。解析：一般根据各种原因所致剧烈呕吐，继之呕血、黑便的病史均应考虑食管贲门黏膜撕裂综合征，尤其是有饮酒、饱餐或食管裂孔疝的患者。故本题选 B。

41. 【答案】B。解析：患者既往肝炎肝硬化病史 15 年，腹膨隆，全腹压痛，移动性浊音阳性，腹水内有大量白细胞，应首先考虑为自发性腹膜炎。故本题选 B。

42. 【答案】A。解析：患者发热、乏力、纳差、腹胀 2 个月，腹壁柔韧感，移动性浊音阳性，有腹水，血沉增速，白细胞计数增高，首先考虑为结核性腹膜炎。其中腹壁柔韧感是结核性腹膜炎的典型临床特征。故本题选 A。

43. 【答案】A。解析：患者输血后出现严重吸气性呼吸困难伴喘鸣，首先考虑为输血后严重过敏反应。故本题选 A。

44. 【答案】B。解析：深昏迷的临床表现为对任何刺激均无反应，无自发活动，全身肌肉松弛，眼球固定，瞳孔散大，各种反射消失，生命体征发生明显变化，如呼吸不规则、心律紊乱、血压波动等。故本题选 B。

45. 【答案】C。解析：根据题干中的临床表现，推断患者最可能的诊断是输尿管结石。

(1) 急性胆囊炎的临床表现：①突发性右上腹持续性绞痛，向右肩胛下区放射，伴有恶心、呕吐。②发冷、发热、纳差、腹胀。③10%病人可有轻度黄疸。④过去曾有类似病史，脂餐饮食易诱发。⑤右上腹肌紧张，压痛或反跳痛，莫菲(Murphy)征阳性。30%~50%病人可触及肿大胆囊有压痛。

(2) 急性阑尾炎的临床表现：转移性右下腹痛及阑尾点压痛、反跳痛为其常见临床表现，持续阵发性加剧的右下腹痛、恶心、呕吐，多数病人白细胞和嗜中性粒细胞计数增高。右下腹阑尾区(麦氏点)压痛，则是该病重要体征。

(3) 急性胃炎的临床表现：急性胃炎主要表现为上腹疼痛、不适，食欲下降，恶心呕吐，有时伴腹泻，严重的急性胃炎还会引起呕血、便血等症状，由不同病因引起的胃粘膜急性炎症。

故本题选 C。

46. 【答案】D。解析：肿瘤压迫喉返神经或者单侧损伤可造成声音嘶哑，双侧损伤可造成窒息。故本题选 D。

47. 【答案】D。解析：乳头湿疹样癌患者临床表现多见乳头表皮脱屑，乳头有少量分泌物并结痂，揭去痂皮，可见鲜红的糜烂面。细胞学检查可见大而异型、胞质透明的 Paget 细胞，也称作乳房 Paget 病。故本题选 D。

48. 【答案】B。解析：根据患者临床表现，可考虑为腰椎间盘突出症，腰椎间盘突出症以 L4~L5、L5~S1 多见，L4~L5 受累表现为小腿外侧足背内侧，伸足拇肌力下降；L5~S1 受累小腿后侧足底部感觉减退，跟腱反射减退，符合该患者的表现。故本题选 B。

49. 【答案】A。解析：早期前列腺癌可采用根治性前列腺切除术，需满足以下4个条件：①PSA $<10\sim 20$ ng/ml；②Gleason评分 ≤ 7 ；③临床分期T1~T2c；④预期寿命 ≥ 10 年的患者。符合该患者的表现。故本题选A。

50. 【答案】E。解析：患者意识丧失，大动脉搏动消失，提示心脏骤停，应立即行胸外按压进行抢救。故本题选E。

51. 【答案】C。解析：上臂桡神经损伤会导致各伸肌广泛瘫痪，包括肱三头肌、肱桡肌、桡侧腕长伸肌、旋后肌、伸指总肌、尺侧腕伸肌及示指、小指固有伸肌瘫痪，会出现前臂有旋前畸形，拇指内收畸形，垂腕。故本题选C。

52. 【答案】E。解析：患者为老年男性，腹痛、呕吐2天，平素便秘，肠鸣音亢进，最可能的诊断为急性肠梗阻。故本题选E。

53. 【答案】E。解析：手术切口拆线时间应根据切口部位、局部血液供应情况、病人年龄、营养状况等来决定，一般头、面、颈部在术后4~5日拆线，下腹部、会阴部在术后6~7日拆线，胸部、上腹部、背部、臀部手术7~9日拆线，四肢手术10~12日拆线（近关节处可适当延长），减张缝线14日拆线。患者甲状腺腺瘤切除术后切口无红肿，可在术后4~5日拆线。故本题选E。

54. 【答案】B。解析：患者既往有左下肢血栓性浅静脉炎病史，左足背动脉搏动消失，左股、腘动脉可触及搏动，Buerger试验阳性，可考虑为血栓闭塞性脉管炎。故本题选B。

55. 【答案】B。解析：采用止血带压迫止血时，应每隔1小时左右松开止血带10~15分钟，以免远端肢体缺血。故本题选B。

56. 【答案】B。解析：胃十二指肠溃疡手术早期并发症包括术后出血、术后胃瘫、术后胃肠壁缺血坏死、吻合口破裂或漏、十二指肠残端破裂、术后肠梗阻包括输入袢梗阻、输出袢梗阻及吻合口梗阻；远期并发症包括倾倒综合征、碱性反流性胃炎、溃疡复发、营养性并发症、残胃癌等。故本题选B。

57. 【答案】B。解析：根据患者的症状和体征，考虑为急性梗阻性化脓性胆管炎，首选腹部B超确诊，能及时了解胆道梗阻部位、肝内外胆管扩张情况及病变性质。故本题选B。

58. 【答案】B。解析：患者X线片检查桡骨下端骨皮质不连续，对位线良好，有嵌插，说明是稳定性骨折且没有严重的畸形和移位，应首选手法复位外固定。故本题选B。

59. 【答案】E。解析：患者尿频、尿急、尿痛，尿中可见血丝，伴排尿时下腹痛，无发热，考虑为泌尿系统感染，无需做膀胱镜检查。故本题选E。

60. 【答案】B。解析：患者为青少年女性，右大腿下端肿胀、压痛，X线检查示股骨下端有界限不清的骨质破坏区，骨膜增生以及放射状阴影，应考虑为骨肉瘤。故本题选B。

61. 【答案】C。解析：患者椎间隙变窄，椎旁软组织阴影增宽，淋巴细胞升高，应考虑为胸椎结核。故本题选C。

62. 【答案】B。解析：患者破伤风抗毒素皮试阳性，应首先考虑给予注射破伤风抗毒素进行预防。故本题选B。

63. 【答案】D。解析：急性胰腺炎往往在暴饮暴食或极度疲劳之后发生，多为突然发作，位于上腹正中或偏左，排除A项；胆道蛔虫病表现为剑突下突发性剧烈绞痛、疼痛持续时间不等，排除B项；急性胆囊炎主要症状为右上腹痛、恶心、呕吐与发热，右上腹有压痛、肌紧张及反跳痛，排除C项；胆总管结石最典型的临床表现是上腹绞痛和对穿性背痛，寒战、高热和随后发生的黄疸三大症状，D项正确；胆总管囊肿为先天性胆道畸形，以腹痛、黄疸及腹部包块为特征，排除E项。故本题选D。

64. 【答案】C。解析：对于较大的肝脓肿，应首选经皮穿刺置管引流术，尽可能吸尽脓液后注入抗生素至脓腔内，待脓肿缩小，无脓液引出后再拔出引流管。故本题选C。

65. 【答案】C。解析：确定非霍奇金淋巴瘤的临床分期所需的辅助检查不包括浅表淋巴结B超。故本题选C。

66. 【答案】E。解析：患者阴道分泌物增多，有不洁性交史，右侧大阴唇可见1.0cm \times 1.0cm、硬韧、

无痛隆起物，首先考虑为梅毒。故本题选 E。

67. 【答案】C。解析：患者右上腹疼痛 3 个月，呈持续性钝痛，向右肩部放射，肝肋下 3cm，质地稍硬，有结节感。实验室检查 AFP>400 μg/L，腹部 B 超显示肝右叶 8cm×6cm 占位性病变，向外生长，考虑为肝癌，最理想的治疗方法是根治性肝切除术。故本题选 C。

68. 【答案】A。解析：患者上腹胀痛 8 个月，左锁骨上淋巴结肿大，质硬，全腹肌紧张，上腹明显压痛、反跳痛，立位腹部 X 线平片可见膈下游离气体，考虑为胃癌。为了减轻由于梗阻、穿孔、出血等并发症引起的症状应采取姑息性胃大部切除术。故本题选 A。

69. 【答案】E。解析：更换切口敷料发现小肠自伤口膨出，在病房中应立即用无菌敷料覆盖小肠及伤口，避免小肠和伤口感染。故本题选 E。

70. 【答案】A。解析：患者上腹胀痛伴恶心 3 天，右下腹痛阵发加剧、腹胀，有肌紧张，未闻及肠鸣音，血白细胞计数升高，中性粒细胞比例升高，右下腹穿刺抽出黄色浑浊液体，镜检多量脓细胞，首先考虑为阑尾炎穿孔并发弥漫性腹膜炎。故本题选 A。

71. 【答案】A。解析：解析：目前国内常用的糖耐量试验及妊娠糖尿病的诊断标准为：（1）空腹静脉血浆血糖≥5.1mmol/L；（2）口服葡萄糖 75g，1 小时后≥10.0mmol/L；（3）2 小时≥8.5mmol/L；（4）3 小时≥8.0mmol/L。其中两项符合就考虑为糖尿病。题干中糖耐量试验均为正常。故本题选 A。

72. 【答案】D。解析：根据患者的临床表现，可诊断患者为妊娠期甲状腺功能亢进症，首选的治疗方式为抗甲状腺药物治疗，常用的药物为丙硫氧嘧啶。故本题选 D。

73. 【答案】D。解析：根据患者临床表现，考虑为宫颈癌，首选的治疗方法是广泛性子宫切除+盆腔淋巴结切除术。故本题选 D。

74. 【答案】A。解析：患者妊娠 34 周，出现高血压、抽搐、昏迷、蛋白尿，最可能的诊断是子痫。故本题选 A。

75. 【答案】B。解析：患者规律宫缩 10 小时，宫口开大 9cm，提示为第二产程，羊水呈黄绿色，胎心率 100 次/分（正常 110~160 次/分），提示羊水污染和胎儿窘迫。需尽快结束分娩，立即行剖宫产。故本题选 B。

76. 【答案】C。解析：妊娠合并重型肝炎患者应尽快行剖宫产术终止妊娠。故本题选 C。

77. 【答案】C。解析：患者临产 8 小时后出现烦躁不安、呼吸加快、下腹疼痛，拒按，出现病理性缩复环和血尿，最可能的诊断是先兆子宫破裂。故本题选 C。

78. 【答案】A。解析：患者停经 2 个月，腹痛伴阴道流血，妇科检查见宫口有组织物排出，子宫大小与停经周数相符，可诊断为难免流产。肌注黄体酮适用于月经失调，如闭经和功能性子官出血、黄体功能不足、先兆流产和习惯性流产（因黄体不足引起者）、经前期紧张综合症的治疗，不能用于难免流产。故本题选 A。

79. 【答案】B。解析：患者妊娠 28 周，尿糖阳性，OGTT 空腹血糖正常，餐后 1 小时血糖升高，为妊娠糖尿病，应首先给予的治疗是控制饮食。理想的饮食控制目标是既能保证和提供妊娠期间热量和营养需要，又能避免餐后高血糖或饥饿酮症出现，保证胎儿正常生长发育。对饮食治疗不能控制的糖尿病，胰岛素是主要的治疗药物。故本题选 B。

80. 【答案】B。解析：根据题干中患儿被蚊虫叮咬和出现的临床症状，推断最可能的诊断是疟疾。故本题选 B。

81. 【答案】D。解析：患儿未接种过卡介苗，PPD 试验阳性，说明其体内有新的结核病灶，因胸部 X 线片未见异常，可采取预防性抗结核治疗，口服异烟肼，疗程 6~9 个月。故本题选 D。

82. 【答案】D。解析：患儿体重超重，应指导控制饮食，增加运动，每天监测体重，可进行药物治疗。未提及该患儿有心理问题，无需进行心理辅导。故本题选 D。

83. 【答案】B。解析：患儿经常出现夜惊，多汗烦闷，生后一直母乳不足，混合喂养，未添加辅食，考虑为维生素 D 缺乏佝偻病，常见的阳性体征是方颅，乳牙未萌出。故本题选 B。

84. 【答案】A。解析：患儿智力低下伴经常便秘，头发干燥，面黄，塌鼻梁折，舌体厚大，腹胀，脐部膨出，是小儿先天性甲状腺功能减退症的典型临床表现。故本题选 A。

85. 【答案】B。解析：患者眼睑及面部水肿，查体全身高度凹陷性水肿，白蛋白低于 30g/L，总胆固醇升高，大量蛋白尿，出现血尿，首先考虑为肾病综合征。为利于肾病综合征的分型，首选的检查是血电解质。故本题选 B。

86. 【答案】B。解析：患者高热伴频繁呕吐 2 天，嗜睡 1 天，惊厥 2 次，精神差，双眼凝视，前囟隆起，脑膜刺激征阴性，白细胞总数及中性粒细胞明显增加，最可能的诊断是化脓性脑膜炎。故本题选 B。

87. 【答案】E。解析：患儿出生后不吃、不哭、不动，体温低且不升，呼吸不规则，反应低下，皮肤黄染。肺部呼吸音低，心音低钝，腹胀、面颊、臀部、双下肢皮肤硬肿，压之凹陷，是新生儿寒冷损伤综合征的典型表现。故本题选 E。

88. 【答案】A。解析：患儿为 2 岁以下幼儿，突发高热，无其他系统症状，热退时出现红色皮疹，应首先考虑为幼儿急诊。故本题选 A。

89. 【答案】C。解析：患儿咳嗽 3 个月，常于夜间咳醒，活动后加重，使用抗生素无明显好转，既往有湿疹史，应首先考虑为咳嗽变异型哮喘。故本题选 C。

90. 【答案】A。解析：患儿呕吐、腹泻 6 天，考虑为急性腹泻。低渗性脱水是指水和钠同时缺失，但缺水少于缺钠，血清钠低于正常范围，细胞外液呈低渗性。低渗性脱水的临床表现及分度：（1）轻度：患者有疲乏感，头晕、手足麻木、口渴不明显，皮肤弹性稍差，哭时少泪，血压偏低，血清钠在 135mmol/L 以下，尿量偏少，尿中钠减少；（2）中度：除轻度低渗性脱水的症状外，常有恶心，呕吐，脉搏细速，血压不稳定，视力模糊，尿量少，血清钠在 130mmol/L 以下；（3）重度：患者神志不清、肌腱反射减弱或消失，出现木僵，甚至昏迷，常发生休克，血清钠在 120mmol/L 以下。故本题选 A。

91. 【答案】B。解析：患者固执、蛮不讲理，经常和父母大动干戈，爱钻牛角尖，是偏执的心理反应。故本题选 B。

92. 【答案】B。解析：患者表现为轻微刺激即表现出强烈反应，此为感觉过敏。故本题选 B。

93. 【答案】C。解析：患者自觉无用、孤独，对未来不抱任何希望，偶尔出现生不如死的现象，表现为典型的“三无症状”，即无望、无助、无用。故本题选 C。

94. 【答案】A。解析：患者表现动作减少，目光呆滞，表情漠然。言语迟缓，对问话的回答只字片语，该精神症状属于亚木僵状态。故本题选 A。

95. 【答案】B。解析：患者表现为对治疗师产生了强烈的情感，将自己过去对生活中某些重要人物的情感投射到治疗师的身上，患者的这种表现是移情。故本题选 B。

96. 【答案】D。解析：惊恐障碍是以反复出现显著的心悸、出汗、震颤等自主神经症状，伴以强烈的濒死感或失控感，害怕产生不幸后果的惊恐发作为特征的一种急性焦虑障碍。综合患者临床表现，应考虑为惊恐障碍。故本题选 D。

97. 【答案】A。解析：幻触是指患者感到皮肤或黏膜上有某种异样的感觉，如虫爬感、针刺感等，也可有性接触感。故本题选 A。

98. 【答案】A。解析：患者表现为进行性记忆力下降，并怀疑儿媳偷东西，头部 CT 示脑萎缩。Hachinski 缺血指数数量表（HIS）评分 3 分，最可能的诊断是阿尔茨海默病。故本题选 A。

99. 【答案】D。解析：患者突发右胸痛，气促，首先考虑为气胸，叩诊右胸空瓮音，右侧呼吸音消失，最可能为右侧张力性气胸。故本题选 D。

100. 【答案】C。解析：子宫内膜异位症妇科检查时可发现在子宫直肠凹陷、子宫骶韧带或宫颈后壁，触及一个或数个硬性小结节，如绿豆或黄豆大小，触痛明显。子宫右侧可及 5cm×6cm×4cm 包块考虑为子宫内膜异位囊肿。典型情况下，陈旧性血液聚集在囊内形成咖啡色粘稠液体，似巧克力样，俗称为“卵巢巧克力囊肿”。故本题选 C。

