

2023年5月27日17点10分编辑，初版

一、判断题

1. 护理.....不可。
A. 正确
B. 错误
2. 家属的.....病的信心。
A. 正确
B. 错误
3. 病人.....病人
A. 正确
B. 错误
4. 端坐.....困难。
A. 正确
B. 错误
5. 医务.....毒双手。
A. 正确
B. 错误
6. 昏迷.....起恶心。
A. 正确
B. 错误
7. 热型.....类的。
A. 正确
B. 错误
8. 测量.....数 1min。
A. 正确
B. 错误
9. 微量.....下降。
A. 正确
B. 错误
10. 乙醇、.....盖瓶中。
A. 正确
B. 错误
11. 氧气.....呼吸道。
A. 正确
B. 错误
12. 滴管.....下降。
A. 正确
B. 错误
13. 作生.....时采集。
A. 正确
B. 错误

14.磷化.....酸铜。

A.正确

B.错误

15.交接班.....形式。

A.正确

B.错误

16.烧伤.....供给。

A.正确

B.错误

17.发生青.....早出现。

A.正确

B.错误

18.为病.....血型。

A.正确

B.错误

19.低盐.....克以下。

A.正确

B.错误

20.用 0.1%.....硝酸钠。

A.正确

B.错误

二、单项选择题

21.服毒.....洗胃

A.12 小时

B.10 小时

C.8 小时

D.6 小时

22.一急性.....是

A.心电监护

B.静脉注射西地兰

C.胸外心脏按压

D.肌内注射肾上腺素

23.上消化.....是因为

A.食管胃底静脉曲张破裂出血

B.胃癌出血

C.胆道出血

D.十二指肠球后溃疡出血

24.肺炎.....常为

A.稽留热

- B.弛张热
- C.间歇热
- D.波状热

25.下列.....的是

- A.冷觉
- B.热觉
- C.平衡觉
- D.触觉

26.慢性肾.....的是

- A.高热量
- B.优质低蛋白
- C.高钙
- D.高磷

27.疟疾的主要传播途径是

- A.飞沫传播
- B.粪口传播
- C.虫媒传播
- D.直接接触传播

28.关于急.....误的是

- A.右下腹体征典型
- B.穿孔率高
- C.病情发展快
- D. 病情重

29.当结石.....联征的是

- A.腹痛
- B.呃逆
- C.寒战
- D.高热

30.肛管手.....括约肌

痉挛的护理措施是

- A.保持大便通畅
- B.早期适当活动
- C.温水肛门坐浴
- D.保持局部清洁

31.反常.....生于

- A.单根肋骨骨折
- B.多根肋骨单处骨折

C.多根肋骨多处骨折

D.单根肋骨单处骨折

32.灭菌.....的是

A.检查包装的完整性，若有破损应在 12 小时内立即使用

B.若灭菌包包布沾有液体，晾干后可正常使用

C.查包指示胶带变色情况

D.不得与未灭菌物品混放

33.腹部手.....此时应考虑

A.切口感染

B.切口裂开

C.腹腔内继发出血

D.切口血肿

34.某病人.....起的是

A.疼痛像针刺样

B.疼痛像刀割样

C.疼痛像烧灼样

D.疼痛像牵拉性

35.慢支肺.....廓呈

A.鸡胸

B.扁平胸

C.桶状胸

D.漏斗胸

36.急性心.....区别是

A.心肌梗死疼痛程度重，持续 30 分钟以上

B.心绞痛.....钟以上

C.疼痛的性质不同

D.疼痛的部位不同

37.胃溃.....规律是

A.午夜痛

B.空腹痛

C.进餐时痛

D.餐后 1~2 小时痛

38.下列.....并发症

A.动脉粥样硬化

B.视网膜病变

C.淋巴腺病

D.肾炎

39.夜间.....常见于

- A.右心功能不全
- B.肺炎
- C.房间隔缺损
- D.左心功能不全导致肺淤血

40.肥胖 2....., 不包括

- A.蛋白总量不超过 25%
- B.糖类占 60%
- C.三餐热量分配为 1 / 5、2 / 5、2 / 5
- D.少食粗纤维食物

41.风湿.....症状是

- A.呼吸困难
- B.二尖瓣面容
- C.心尖区舒张期隆隆样杂音
- D.肺动脉瓣区第二心音进

42.以下不.....的是

- A.呕吐、腹痛、腹泻
- B.流涎
- C.气管痉挛及分泌物增加
- D.肌纤维颤动

43.溃疡病.....目的是

- A.补充血容量
- B.收缩血管
- C.升高血压
- D.解除痉挛

44.日射.....给予

- A.喝白开水
- B.喝含盐饮料
- C.冰袋敷头部
- D.氯丙嗪

45.不协调.....原则是

- A.导尿及皮肤准备
- B.镇静，休息，恢复其节律性
- C.禁食，纠酸，静脉补液
- D.积极完善术前准备

46.初孕妇.....间是

- A.14~16 周
- B.15~18 周
- C.18~20 周
- D.20~24 周

47.产后 4 天.....原因是

- A.进食少
- B.卧床休息不活动
- C.未给新生儿早吸吮多吸吮
- D.未及早按摩，热敷乳房

48.产后腹部.....产后的

- A.第 2~3 天
- B.第 4~6 天
- C.第 8~9 天
- D.第 10~14 天

49.患儿男，.....况是

- A.母亲有结核病
- B.出生时接种过卡介苗
- C.近 2 周内接种过卡介苗
- D.体内有活动性结核灶

50.社区评.....意事项

- A.一个问题可以多问几件事情，以调查更多的结果
- B.适当以诱导的方式提问，以调查更多的结果
- C.慎重处理敏感与隐私问题
- D.问题的顺序可以不必拘泥

51.患者，75 岁，.....糖尿病社区管理的

- A.0 级预防
- B.一级预防
- C.二级预防
- D.三级预防

52.护理重症哮喘患者时，错误的是

- A.守护在床边，加强心理护理
- B.安排舒适的半卧位或坐位
- C.给予低流量鼻导管吸氧
- D.限制水的摄入，勿勉强进食

53.患儿男，18.....的特征是

- A.与父母建立良好的依赖关系
- B.具有丰富的想象力及进取心
- C.能较好地发展勤奋的个性

D.表现出明显的自主性

54.为终止癫痫.....观察

- A.意识状态
- B.瞳孔
- C.呼吸
- D.脉搏

55.除按医嘱.....理措施为

- A.鼻饲高热量富含维生素的流质饮食
- B.遵医嘱给予对症药物
- C.按休克原则处理好体位、保暖、吸氧、静脉输液等问题
- D.注意观察生命体征、神态、瞳孔、尿量等变化

56.女性，48岁，.....措施是

- A.高蛋白、高维生素饮食
- B.舒适体位、卧床休息
- C.保护病变关节功能位
- D.常规服用强的松

57.血液.....本的

- A.大多取肘静脉血
- B.一般取 0.5ml
- C.拔出头后隔离空气立即送验
- D.选用 1ml 干燥注射器

58.患者出.....错误的

- A.处理床单位
- B.通知病员在出院处办理出院手续
- C.停止患者一切医嘱和各项记录
- D.医疗文件立即送病案室保存

59.下列哪.....内容

- A.口腔护理
- B.皮肤护理
- C.测血压
- D.更换床单

60.鼻导管吸.....度为

- A.70%
- B.60%
- C.50%
- D.30%

61.病室的相.....出现

- A.肌肉紧张
- B.咽干、口渴
- C.闷热、不适
- D.头晕、倦怠

62.用平车.....项不妥

- A.用平车上垫木板
- B.宜用四人搬运法
- C.上坡时头在前
- D.使用挪动法

63.患者女性，.....的办法是

- A.高床活动时将导尿管末端固定在腹部
- B.维持尿道口清洁
- C.多饮水
- D.集尿袋及时倾倒

64.患者逝世后，.....正确的是

- A.取下丢弃
- B.装入口中
- C.去下浸泡在冷水中
- D.取下交给死者家属

65.作 12 小.....防腐剂

- A.甲醛
- B.乙醇
- C.来苏尔
- D.新洁尔灭

66.不宜作.....人是

- A.高热惊厥者
- B.患肛裂者
- C.慢性痢疾患者
- D.阿米巴痢疾患者

67.皮内注.....同点是

- A.不用碘酒消毒皮肤
- B.注药前不抽血
- C.拔针后不用棉签按压
- D.持针方法

68.应用呼吸.....式是

- A.呼气末正压

- B.压力支持
- C.同步间歇指令通气
- D.控制通气

69.肺炎胸.....累及

- A.患侧肺的下叶
- B.肋胸膜
- C.脏层胸膜
- D.壁层胸膜**

70.较为可靠.....位是

- A.耳轮皮肤
- B.面颊、皮肤黏膜
- C.颈部皮肤及舌面
- D.脸结膜、指甲、口唇**

71.最严重.....是

- A.过敏反应
- B.心脏负荷过重的反应
- C.发热反应
- D.空气栓塞**

72.须执行.....病是

- A.甲型肝炎
- B.破伤风
- C.斑疹伤寒
- D.狂犬病**

73.与患者.....的是

- A.与交谈者经常保持目光接触
- B.交谈过程中适当沉默
- C.用复述强调患者陈述的关键内容
- D.交谈过程中随意改换话题**

74.擦洗棉.....渍用

- A.酒精
- B.草酸
- C.过氧乙酸
- D.过氧化氢**

75.湿热敷.....一项

- A.降低痛觉神经的兴奋性
- B.增加深部组织充血**
- C.可使痉挛的肌肉松弛
- D.可改善血液循环

76.用紫外.....项错误

- A.灯管用无水乙醇纱布擦净
- B.消毒过程用纱布遮盖病人
- C.双眼灯亮 5min 开始计时
- D.使用超过 2000h 的灯管应更换

77.颈外静.....刺点在

- A.下颌角与锁骨上缘中点连线下 1 / 3 处
- B.下颌角与锁骨下缘中点连线下 1 / 3 处
- C.下颌角与锁骨下缘中点连线上 1 / 3 处
- D.下颌角与锁骨上缘中点连线上 1 / 3 处

78 可放置.....位是

- A.枕部、肘窝
- B.颈部、腹部
- C.腋窝、胸部
- D.头顶、腹股沟

79.用玻璃.....法不对

- A.测量时间口腔 3mm, 腋下 10min, 直肠 3min
- B.发现口腔温度与病情不相符时, 改测腋下温度
- C.昏迷者、患儿、口鼻手术者不测口腔温度
- D.患者不慎咬破体温计, 首先应清除口腔内的玻璃碎屑

80.应避免.....是

- A.磺胺合剂
- B.棕色合剂
- C.1%稀盐酸
- D.氢氧化铝凝胶

81.在人际.....馈的是

- A.使用图示或摇头表达不贊同意见
- B.听到意见后, 作出“啊噢嗯”的反应
- C.微笑或点头表达意见
- D.因未听见, 而没有反应

82.幽门.....表现是

- A.上腹疼痛
- B.呕吐宿食
- C.消瘦、脱水
- D.上腹肿块

83.在传染....., 除了

- A.在工作中接触染病病原体的
- B.在工作中可能接触传染病病原体的
- C.从事传染病医疗的
- D.从事传染病教学的**

84.应用社.....依据是

- A.社区卫生
- B.社区动员
- C.社区诊断**
- D.社区评价

85.关于患者.....误的是

- A.公民有生命健康权
- B.患者都应一视同仁
- C.患者的需求应得到完全满足**
- D.患者享有的医疗保健权在实现时时受条件限制的

86.以下关于.....正确的是

- A.医疗机构根据病人的病情决定是否需要转诊，病人可自主决定是否需要转诊
- B.如患者坚持转诊，而医疗机构认为不宜，患者必须签署转诊申请书
- C.对于危重病人，医疗机构必须积极履行转诊义务
- D.如医疗机构对危重患者缺乏治疗条件，不应作任何处理而立即转诊**

87.急性胰.....的是

- A.防止呕吐
- B.减少腹胀
- C.减轻腹痛
- D.减轻胰腺负担**

88.颅内高压.....特征是

- A.清晨醒来发作较多
- B.与颅内高压不成正比
- C.与病灶部位并不完全一致
- D.咳嗽、喷嚏时加重**

89.因抢救生.....医疗措施;

- A.经治医生批准
- B.所在临床科室的主任批准
- C.医疗机构负责人或者授权的负责人批准**
- D.医疗机构职工代表大会批准

90.法律规定应.....时，应当

- A.只能向患者的配偶说明
- B.向患者的近亲属说明**

- C.向患者的单位领导说明
- D.向患者所在街道办事处说明

三、多选题

91.压疮第.....现为

- A.表皮水泡扩大破溃
- B.表皮有水泡
- C.皮肤表面呈紫红色
- D.真皮层有黄色渗液

92.保持肝性.....施有

- A.可用生理盐水灌肠
- B.可用 0.1%肥皂水灌肠
- C.弱酸性溶液灌肠
- D.乳果糖加水各半灌肠

93.麻痹.....表现

- A.阵发性绞痛
- B.全腹胀
- C.大小肠普遍胀气
- D.溢出样呕吐

94.现场救.....包括

- A.现场需心肺复苏者应置于复苏体位
- B.毒蛇咬伤时应放低患肢
- C.脚扭伤应抬高患肢
- D.咯血者向患侧卧位

95.严重气道.....为

- A.咳嗽无声、不能说话或呼吸
- B.发绀、呼吸困难加重以及吸气时伴有高调喘鸣
- C.用手抓住颈部，显示出息的常见症状、严重者出现意识丧失。
- D.大声呼叫，渴求他人前来救助

四、案例分析

案例：患者男，35岁。患.....诊呼
吸音消失。

96.患者发生了

- A.阻塞性饰气肿
- B.肺不张
- C.自发性气胸
- D.左心衰竭

97.对该患者.....施是

- A.给予高浓度吸氧
- B.协助患者取半卧位
- C.开放气道
- D.立即排气减压，以解除气急，使肺复张

案例：患者，女，76岁，因.....布湿性啰音及哮鸣音。

98.护士应.....吸氧方法是

- A.持续低流量吸氧
- B.间断低流量吸氧
- C.高流量吸氧
- D.高流量+20%酒精湿化吸氧

99.应用洋地.....不妥的是

- A.嘱患者按时服药
- B.如果漏服药物，需要及时补服
- C.嘱患者低盐饮食
- D.给药前数患者的心率

100.给予患者.....疗有效

- A.心率减慢
- B.呼吸困难减轻或消除
- C.血压下降
- D.伴右心衰竭时水肿消退、尿量增多

101.该患者.....的休息方式

- A.活动没有任何限制
- B.避免重体力活动
- C.充分休息，增加睡眠时间
- D.绝对卧床休息

案例：患儿，女性，9个月.....嘱：ORS液口服。

102.ORS液中.....度为

- A.0.1%
- B.0.15%
- C.0.2%
- D.0.3%

103.若患儿.....应如何处理

- A.继续服用ORS液

- B. 使用利尿剂
- C. 加大 ORS 液量
- D. 停止服用 ORS 液

案例：张女士，30岁，G1P1，因查体.....楚，活动好，囊性。

104. 该病例.....病是
- A. 子宫内膜异位症
 - B. 子宫肌瘤
 - C. 慢性盆腔炎
 - D. 右侧卵巢肿瘤

105. 为进一步.....检查是
- A. 阴道镜检查
 - B. 宫腔镜检查
 - C. 激素测定
 - D. B 超检查